

Boy 198

# BIBLIOTHÈQUE

## PHYSICO - ÉCONOMIQUE,

## INSTRUCTIVE ET AMUSANTE.

14^e. ANNÉE,

*Ou Année 1795, vieux style.*

TOME SECOND.

# BIBLIOTHÈQUE
## PHYSICO-ÉCONOMIQUE,
## INSTRUCTIVE ET AMUSANTE.

### 14e. Année,

*Ou Année 1795, vieux style.*

*Contenant des Mémoires, Observations Pratiques sur l'Économie rurale; —les nouvelles Découvertes les plus intéressantes dans les Arts utiles & agréables; —la Description & la Figure des nouvelles Machines, des Instrumens qu'on peut y employer, d'après les expériences des Auteurs qui les ont imaginées; —des Recettes, Pratiques, Procédés, Médicamens nouveaux, externes ou internes, qui peuvent servir aux Hommes & aux Animaux; —les moyens d'arrêter & de prévenir les accidens, d'y remédier, de se garantir des fraudes; —de nouvelles Vues sur plusieurs points d'Économie domestique, & en général sur tous les objets d'Utilité & d'Agrément dans la vie civile & privée*, &c. &c. On y a joint des Notes que l'on a cru nécessaires à plusieurs articles.

Recueillie & mise en ordre par les Citoyens
Parmentier & Deyeux.

## TOME SECOND.

*A PARIS,*

Chez Buisson, Libraire, rue Hautefeuille, n°. 20

L'An III de la République.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

# BIBLIOTHÈQUE
## PHYSICO-ÉCONOMIQUE,
## INSTRUCTIVE ET AMUSANTE.

---

## ANNUAIRE DU CULTIVATEUR,

POUR LA TROISIÈME ANNÉE DE LA RÉPUBLIQUE,

Présenté le 30 Pluviôse de l'An IIe

A LA CONVENTION NATIONALE,

Qui en a décrété l'impression et l'envoi, pour servir aux Écoles de la République;

Par *G. Romme*, *Représentant du Peuple.*

---

Les Citoyens qui ont concouru à ce travail, en communiquant les vérités utiles qu'ils doivent à leur expérience et à leurs méditations, sont : *Cels*, *Vilmorin*, *Thouin*, *Parmentier*, *Dubois*, *Desfontaines*, *Lamark*, *Préaudaux*, *Lefevre*, *Boutier*, *Chabert*, *Flandrin*, *Gilbert*, *Daubenton*, *Richard* et *Molard.*

---

Décret de la Convention Nationale, du 30 Pluviôse, l'an IIe de la République, une et indivisible, relatif à un Ouvrage intitulé ; *Annuaire du Cultivateur.*

UN membre fait hommage à la Convention nationale d'un ouvrage intitulé : *Année* 1795 (. v st.) *Tome II.*

*Annuaire du Cultivateur*, que le comité d'instruction publique a jugé digne d'être placé parmi les livres élémentaires destinés aux écoles nationales. La Convention nationale accepte l'hommage, et, sur la proposition du même membre, décrète :

ART. I. L'Annuaire du Cultivateur sera imprimé à Paris, sous la surveillance du comité d'instruction publique, au nombre de deux mille exemplaires, pour être distribués aux représentans du peuple et aux corps administratifs de la République.

II. L'ouvrage sera réimprimé dans le chef-lieu de chaque département, sous la surveillance de l'administration, pour être envoyé à chaque commune.

III. Les noms des citoyens qui ont concouru à l'Annuaire du Cultivateur, seront imprimés dans le titre de l'ouvrage, comme un hommage dû au zèle, au dévouement qu'ils ont montrés en communiquant les vérités utiles qu'une longue expérience leur a fait acquérir.

*Visé par l'inspecteur.* Signé *S. E. MONNEL.*

Collationné à l'original, par nous secrétaires de la Convention. A Paris, le 24 ventôse, l'an second de la République, une et indivisible. *Signés* BELLEGARDE et CHARLES COCHON, *secrétaires.*

# INSTRUCTION

## SUR

# L'ANNUAIRE RÉPUBLICAIN.

Les Romains comptoient les années depuis la fondation de Rome; les Tyriens depuis le recouvrement de leur liberté : les Européens comptent depuis l'établissement du christianisme; les François compteront désormais depuis la fondation de la République, c'est-à-dire, de la liberté, de l'égalité, qui a eu lieu le lendemain de l'abolition de la royauté, le 22 septembre 1792, (vieux style) jour où le soleil est arrivé à l'équinoxe d'automne, en entrant dans le signe de la Balance.

L'ère vulgaire est abolie.

L'année présente est la 1795^e^ pour les peuples esclaves, c'est la troisième de la République Françoise. Depuis 1564, par ordre d'un roi fanatique et cruel, Charles IX, l'année commençoit au premier janvier, onze jours après le solstice d'hiver; elle commencera à l'avenir à minuit, avec le jour de l'équinoxe vrai d'automne pour l'observatoire de Paris.

L'année étoit partagée en douze mois inégaux

de 28, 30 et 31 jours ; elle est maintenant composée de douze mois de 30 jours chacun, suivis de 5 jours qui la complètent. La semaine ne divisoit exactement ni le mois, ni l'année, ni les lunaisons ; on compte aujourd'hui par décade composée de 10 jours, qui divise le mois en trois parties égales.

Le jour étoit divisé en 24 heures, comptées de 12 en 12 ; l'heure en 60 minutes ; la minute en 60 secondes : cette division rendoit les calculs difficiles.

Le jour sera désormais divisé en 10 heures, chaque heure en dixièmes, chaque dixième en centièmes.

Ainsi l'année sera composée de 12 mois 5 jours,
Ou de 36 décades et demie,
Ou 365 jours,
Ou 3650 heures,
Ou 36500 dixièmes d'heure,
Ou 365000 centièmes d'heure.

Tous les quatre ans on ajoutoit un jour au mois de février ; l'année étoit de 366 jours : telles ont été les années 1784, 1788, 1792, qui étoient bissextiles, et cependant l'année civile ne s'accordoit pas avec les mouvemens célestes.

Tous les quatre ans on ajoutera un jour à la fin de l'année, à commencer de la troisième de la République, autant que cela sera nécessaire pour que l'année républicaine s'accorde avec les mouvemens célestes.

Les noms des jours de la semaine étoient pris des noms des corps célestes, dans un ordre que l'ignorance et la superstition des astrologues avoient imaginé ; les noms des jours de la décade sont pris de l'ordre même qu'ils occupent.

Ainsi le premier jour est appellé . . *Primedi.*
Le deuxième . . . . . *Duodi.*
Le troisième . . . . . *Tridi.*
Le quatrième . . . . . *Quartidi.*
Le cinquième. . . . . *Quintidi.*
Le sixième. . . . . *Sextidi.*
Le septième. . . . . *Septidi.*
Le huitième. . . . . *Octidi.*
Le neuvième . . . . . *Nonidi.*
Le dixième. . . . . *Decadi.*

Les noms des mois étoient pris des noms des divinités, des cérémonies religieuses des Romains ou de leurs tyrans ; une partie des mois, comme septembre, octobre, etc. étoient comptés de mars, quoique depuis plus de 2000 ans mars ne fût plus le premier mois de l'année ; les noms des mois républicains indiquent les quatre saisons, ainsi que les productions ou les phénomènes les plus propres à chacun. Les cinq derniers jours de l'année sont dits *Sanculotides* ; quatre années formeront une période appellée *Franciade.* L'année qui tous les quatre ans aura 366 jours, sera appellée *Sextile* ; elle aura six Sanculotides, et terminera chaque Franciade : le jour ajouté sera consacré à célébrer la Révolution Françoise, qui

après quatre ans d'efforts et de combats contre la tyrannie, a conduit le Peuple François au règne de l'égalité.

La manière la plus courte, la plus simple d'écrire une date, est celle-ci : 3 nivôse, 14 germinal, 27 fructidor, l'an 3^e. de la République, ou le 1^er., 2, 3 des sanculotides.

L'annuaire qui suit cette instruction, présente le lever, le coucher du soleil et de la lune pour le 1^er. de chaque décade, ou le 1^er., le 11 et le 21 de chaque mois, exprimés en heures, dixièmes et centièmes d'heure, suivant la nouvelle division. Chaque lunaison est d'environ 29 jours et demi, c'est-à dire, un demi-jour de moins que le mois républicain; on peut avoir aisément le jour de la lune, quand on le connoît pour le premier de l'an.

Au commencement de la troisième année, la lune avoit 27 jours; à ce nombre ajoutez autant de demi-jours qu'il s'est écoulé de mois, et ensuite le quantième du mois; de cette somme retranchez 29 jours et demi, et vous aurez le jour de la lune.

Veut-on le connoître pour le 13 germinal? il s'est écoulé six mois : j'ajoute donc 3 et 13, quantième du mois, à 27, âge de la lune au premier de l'an, ce qui fait 43; je retranche 29 et demi; reste 13 et demi, c'est le jour de la lune.

Chaque heure de la nouvelle division vaut 2

heures 24 minutes de l'ancienne, ou près de 2 heures et demie.

Chaque dixième de la nouvelle heure vaut 14 minutes 24 secondes anciennes, ou près d'un quart-d'heure.

Deux dixièmes valent une demi-heure ancienne, moins une minute et 12 secondes.

Quatre dixièmes valent 57 minutes 36 secondes, ou une heure ancienne, moins 2 minutes 24 secondes.

Douze dixièmes et demi font juste 3 heures anciennes.

Vingt-cinq dixièmes font juste 6 heures anciennes.

Cinquante dixièmes, ou 5 heures nouvelles valent 12 heures anciennes.

---

*Nota.* Les petites majuscules H. D. C. placées presque au haut des deux dernières colonnes de chaque mois, signifient *heures*, *dixièmes*, *centièmes*.

*N. B.* Quand la somme des heures, au coucher de la lune, est inférieure à celle qui se trouve à son lever, c'est une preuve que la lune se couche le jour suivant de son lever.

Par exemple : le 21 vendémiaire, elle se lève à 8 h. 4 d. 2 c. ; et elle se couche, le 22, à 4 h. 3 d. 8 c.

## *Automne.* FRIMAIRE. III.e Mois.

*Le 1.er répond au 21 Novembre* (v. style).

| J. du Mois. | NOMS des JOURS. | Product. naturelles et instrumens ruraux. | | LEVER | | | COUCHER. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H. | D. | C. | H. | D. | C. |
| 1 | Primedi | Raiponce. | Au 1.er | | | | | | |
| 2 | Duodi | Turneps. | Du Soleil. | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 3 | Tridi | Chicorée. | | | | | | | |
| 4 | Quartidi | Nêfle. | De la Lune | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 |
| 5 | *Quintidi* | COCHON. | | | | | | | |
| 6 | Sextidi | Mâche. | | | | | | | |
| 7 | Septidi | Chou-fleur. | | | | | | | |
| 8 | Octidi | Miel. | | | | | | | |
| 9 | Nonidi | Genièvre. | | | | | | | |
| 10 | DECADI | PIOCHE. | | | | | | | |
| 11 | Primedi | Cire. | Au 11. | | | | | | |
| 12 | Duodi | Raifort. | Du Soleil. | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 13 | Tridi | Cèdre. | | | | | | | |
| 14 | Quartidi | Sapin. | De la Lune | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | *Quintidi* | CHEVREUIL. | | | | | | | |
| 16 | Sextidi | Ajonc. | | | | | | | |
| 17 | Septidi | Cyprès. | | | | | | | |
| 18 | Octidi | Lierre. | | | | | | | |
| 19 | Nonidi | Sabine. | | | | | | | |
| 20 | DECADI | HOYAU. | | | | | | | |
| 21 | Primedi | Erable à sucre | Au 21. | | | | | | |
| 22 | Duodi | Bruyère. | Du Soleil. | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 23 | Tridi | Roseau. | De la Lune | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| 24 | Quartidi | Oseille. | | | | | | | |
| 25 | *Quintidi* | GRILLON. | | | | | | | |
| 26 | Sextidi | Pignon. | N. L. le 2 à .. | | | | 6 | 8 | 0 |
| 27 | Septidi | Liège. | P. Q. le 10 à .. | | | | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Octidi | Truffe. | P. L. le 16 à .. | | | | 8 | 7 | 0 |
| 29 | Nonidi | Olive. | D. Q. le 24 à .. | | | | 3 | 1 | 1 |
| 30 | DECADI | PELLE. | | | | | | | |

*Hiver.* NIVÔSE. IV.e Mois.

*Le 1.er répond au 21 Décembre* (v. style).

| J. du Mois. | NOMS des JOURS. | Product. naturelles et instrumens ruraux. | | LEVER | | | COUCHER. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H. | D. | C. | H. | D. | C. |
| 1 | Primedi | Tourbe. | Au 1.er | | | | | | |
| 2 | Duodi | Houille. | | | | | | | |
| 3 | Tridi | Bitume. | Du Soleil. | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 4 | Quartidi | Soufre. | De la Lune | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 5 | *Quintidi* | CHIEN. | | | | | | | |
| 6 | Sextidi | Lave. | | | | | | | |
| 7 | Septidi | Terre végétale. | | | | | | | |
| 8 | Octidi | Fumier. | | | | | | | |
| 9 | Nonidi | Salpêtre. | | | | | | | |
| 10 | DECADI | FLÉAU. | | | | | | | |
| 11 | Primedi | Granit. | Au 11. | | | | | | |
| 12 | Duodi | Argille. | | | | | | | |
| 13 | Tridi | Ardoise. | Du Soleil. | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 14 | Quartidi | Grès. | De la Lune | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 15 | *Quintidi* | LAPIN. | | | | | | | |
| 16 | Sextidi | Silex. | | | | | | | |
| 17 | Septidi | Marne. | | | | | | | |
| 18 | Octidi | Pierre à chaux. | | | | | | | |
| 19 | Nonidi | Marbre. | | | | | | | |
| 20 | DECADI | VAN. | | | | | | | |
| 21 | Primedi | Pierre à plâtre. | Au 21. | | | | | | |
| 22 | Duodi | Sel. | Du Soleil. | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 23 | Tridi | Fer. | De la Lune | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 |
| 24 | Quartidi | Cuivre. | | | | | | | |
| 25 | *Quintidi* | CHAT. | N. L. le 2, à . . | | | | 3 | 8 | 4 |
| 26 | Sextidi | Etain. | P. Q. le 9, à . . | | | | 5 | 6 | 5 |
| 27 | Septidi | Plomb. | P. L. le 16, à . . | | | | 4 | 0 | 4 |
| 28 | Octidi | Zinc. | D. Q. le 24, à . . | | | | 2 | 0 | 8 |
| 29 | Nonidi | Mercure. | Solstice d'hiver le | | | | | | |
| 30 | DECADI | CRIBLE. | 1.er à . . . . . | | | | 5 | 6 | 4 |

## *Hiver.* PLUVIÔSE. V.e Mois.

*Le 1.er répond au 20 Janvier* (v. style).

| J. du Mois. | NOMS des JOURS. | Product. naturelles et instrumens ruraux. | | LEVER | | | COUCHER. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primedi | Lauréole. | Au 1.er | H. | D. | C. | H. | D. | C. |
| 2 | Duodi | Mousse. | | | | | | | |
| 3 | Tridi | Fragon. | Du Soleil. | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 4 | Quartidi | Perce-neige. | De la Lune | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | *Quintidi* | TAUREAU. | | | | | | | |
| 6 | Sextidi | Laurier-thym. | | | | | | | |
| 7 | Septidi | Amadouvier. | | | | | | | |
| 8 | Octidi | Mezereum. | | | | | | | |
| 9 | Nonidi | Peuplier. | | | | | | | |
| 10 | DECADI | COIGNÉE. | | | | | | | |
| 11 | Primedi | Hellébore. | Au 11. | | | | | | |
| 12 | Duodi | Brocoli. | | | | | | | |
| 13 | Tridi | Laurier. | Du Soleil. | 3 | 0 | 7 | 6 | 9 | 4 |
| 14 | Quartidi | Avelinier. | De la Lune | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 15 | *Quintidi* | VACHE. | | | | | | | |
| 16 | Sextidi | Buis. | | | | | | | |
| 17 | Septidi | Lichen. | | | | | | | |
| 18 | Octidi | If. | | | | | | | |
| 19 | Nonidi | Pulmonaire. | | | | | | | |
| 20 | DECADI | SERPETTE. | | | | | | | |
| 21 | Primedi | Thlaspi. | Au 21. | | | | | | |
| 22 | Duodi | Thymelée. | Du Soleil. | 2 | 9 | 6 | 7 | 0 | |
| 23 | Tridi | Chiendent. | De la Lune | 9 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 |
| 24 | Quartidi | Trainasse. | | | | | | | |
| 25 | *Quintidi* | LIEVRE. | N. L. le 2 à . . | | | | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Sextidi | Guède. | P. Q. le 8 à . . | | | | 8 | 8 | |
| 27 | Septidi | Noisettier. | P. L. le 16 à . . | | | | 0 | 2 | 8 |
| 28 | Octidi | Cyclamen. | D. Q. le 24 à . . | | | | 0 | 9 | |
| 29 | Nonidi | Chélidoine. | Eclip. du Sol. invis. à Pa. le | | | | | | |
| 30 | DECADI | TRAINEAU. | Eclip. de L. visib. à Pa. Commence le 15 à 9 h. 6 d. 3 c. | | | | | | |
| | | | Finit le 16 à 0 h. 8 d. 1 c. | | | | | | |

## *Hiver.* VENTÔSE. VI.e Mois.

*Le 1.er répond au 19 Février* (v. style).

| J. du Mois. | NOMS des JOURS. | Product. naturelles et instrumens ruraux. | | LEVER | | | COUCHER. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H. | D. | C. | H. | D. | C. |
| 1 | Primedi | Tussilage. | Au 1.er | | | | | | |
| 2 | Duodi | Cornouiller. | | | | | | | |
| 3 | Tridi | Violier. | Du Soleil. | 7 | 8 | 47 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Quartidi | Troêne. | De la Lune | 7 | 9 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | *Quintidi* | BOUC. | | | | | | | |
| 6 | Sextidi | Azaret. | | | | | | | |
| 7 | Septidi | Alaterne. | | | | | | | |
| 8 | Octidi | Violette. | | | | | | | |
| 9 | Nonidi | Marsault. | | | | | | | |
| 10 | DECADI | BECHE. | | | | | | | |
| 11 | Primedi | Narcisse. | Au 11. | | | | | | |
| 12 | Duodi | Orme. | | | | | | | |
| 13 | Tridi | Fumeterre. | Du Soleil. | 7 | 7 | 27 | 2 | 2 | 8 |
| 14 | Quartidi | Velar. | De la Lune | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 |
| 15 | *Quintidi* | CHEVRE. | | | | | | | |
| 16 | Sextidi | Epinard. | | | | | | | |
| 17 | Septidi | Doronic. | | | | | | | |
| 18 | Octidi | Mouron. | | | | | | | |
| 19 | Nonidi | Cerfeuil. | | | | | | | |
| 20 | DECADI | CORDEAU. | | | | | | | |
| 21 | Primedi | Mandragore. | Au 21 | | | | | | |
| 22 | Duodi | Persil. | Du Soleil | 7 | 6 | 07 | 4 | 1 | |
| 23 | Tridi | Cochléaria. | De la Lune | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| 24 | Quartidi | Paquerette. | N. L. le 1 à . . | | | | 5 | 5 | 1 |
| 25 | *Quintidi* | THON. | P. Q. le 8 à . . | | | | 2 | 1 | 7 |
| 26 | Sextidi | Pissenlit. | P. L. le 15 à . . | | | | 7 | 1 | 9 |
| 27 | Septidi | Sylvie. | D. Q. le 23 à . . | | | | 8 | 9 | 4 |
| 28 | Octidi | Capillaire. | N. L. le 30 à . . | | | | 9 | 9 | 4 |
| 29 | Nonidi | Frêne. | | | | | | | |
| 30 | DECADI | PLANTOIR. | | | | | | | |

Equinoxe de Printemps le 30 à 6 h. 2 d. 6 c.

*Printemps.* GERMINAL. VII.^e Mois.

*Le 1.^er répond au* 21 *Mars* (v. style).

| J. du Mois. | NOMS des JOURS. | Product. naturelles et instrumens ruraux. | | LEVER | | | COUCHER. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H. | D. | C. | H. | D. | C. |
| 1 | Primedi | Primevère. | Au 1.er | | | | | | |
| 2 | Duodi | Platane. | Du Soleil. | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 3 | Tridi | Asperge. | | | | | | | |
| 4 | Quartidi | Tulipe. | De la Lune | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 |
| 5 | *Quintidi* | POULE. | | | | | | | |
| 6 | Sextidi | Blette. | | | | | | | |
| 7 | Septidi | Bouleau. | | | | | | | |
| 8 | Octidi | Jonquille. | | | | | | | |
| 9 | Nonidi | Aulne. | | | | | | | |
| 10 | DECADI | COUVOIR. | | | | | | | |
| 11 | Primedi | Pervenche. | Au 11. | | | | | | |
| 12 | Duodi | Charme. | | | | | | | |
| 13 | Tridi | Morille. | Du Soleil. | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 14 | Quartidi | Hêtre. | De la Lune | 5 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 |
| 15 | *Quintidi* | ABEILLE. | | | | | | | |
| 16 | Sextidi | Laitue. | | | | | | | |
| 17 | Septidi | Mélèse. | | | | | | | |
| 18 | Octidi | Ciguë. | | | | | | | |
| 19 | Nonidi | Radis. | | | | | | | |
| 20 | DECADI | RUCHE. | | | | | | | |
| 21 | Primedi | Gainier. | Au 21. | | | | | | |
| 22 | Duodi | Romaine. | | | | | | | |
| 23 | Tridi | Marronnier. | Du Soleil. | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 |
| 24 | Quartidi | Roquette. | De la Lune | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 25 | *Quintidi* | PIGEON. | | | | | | | |
| 26 | Sextidi | Lilas. | | | | | | | |
| 27 | Septidi | Anemone. | P. Q. le 7 à . . . | | | | 5 | 0 | 5 |
| 28 | Octidi | Pensée. | P. L. le 15 à . . . | | | | 4 | 2 | 8 |
| 29 | Nonidi | Myrtille. | D. Q. le 23 à . . . | | | | 5 | 5 | 3 |
| 30 | DECADI | GREFFOIR. | N. L. le 30 à . . . | | | | 3 | 5 | 1 |

*Printemps.* FLORÉAL. VIII.^e Mois.

*Le 1.^er répond au* 20 *Avril* ( v. style ).

| J. du Mois. | NOMS des JOURS. | Product. naturelles et instrumens ruraux. | | LEVER | | | COUCHER. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H. | D. | C. | H. | D. | C. |
| 1 | Primedi | Rose. | Au 1.er | | | | | | |
| 2 | Duodi | Chêne. | | | | | | | |
| 3 | Tridi | Fougère. | Du Soleil. | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 4 | Quartidi | Aubépine. | De la Lune | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| 5 | *Quintidi* | ROSSIGNOL. | | | | | | | |
| 6 | Sextidi | Ancolie. | | | | | | | |
| 7 | Septidi | Muguet. | | | | | | | |
| 8 | Octidi | Champignon. | | | | | | | |
| 9 | Nonidi | Hyacinthe. | | | | | | | |
| 10 | DECADI | RATEAU. | | | | | | | |
| 11 | Primedi | Rhubarbe. | Au 11. | | | | | | |
| 12 | Duodi | Sainfoin. | | | | | | | |
| 13 | Tridi | Bâton-d'or. | Du Soleil. | 1 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2 |
| 14 | Quartidi | Chamérisier | De la Lune | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 15 | *Quintidi* | VER-A-SOIE. | | | | | | | |
| 16 | Sextidi | Consoude. | | | | | | | |
| 17 | Septidi | Pimprenelle. | | | | | | | |
| 18 | Octidi | Corbeille-d'or. | | | | | | | |
| 19 | Nonidi | Arroche. | | | | | | | |
| 20 | DECADI | SARCLOIR. | | | | | | | |
| 21 | Primedi | Statice. | Au 21. | | | | | | |
| 22 | Duodi | Fritillaire. | | | | | | | |
| 23 | Tridi | Bourrache. | Du Soleil. | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 |
| 24 | Quartidi | Valériane. | De la Lune | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 25 | *Quintidi* | CARPE. | | | | | | | |
| 26 | Sextidi | Fusain. | | | | | | | |
| 27 | Septidi | Civette. | P. Q. le 7 à . . | | | | 0 | 7 | 3 |
| 28 | Octidi | Buglose. | P. L. le 15 à . . | | | | 1 | 1 | 9 |
| 29 | Nonidi | Senevé. | D. Q. le 23 à . . | | | | 0 | 4 | 0 |
| 30 | DECADI | HOULETTE. | N. L. le 29 à . . | | | | 6 | 6 | 5 |

*Printemps.* PRAIRIAL. IX^e. Mois.

*Le 1.^er répond au* 20 *Mai* ( v. style ).

| J. du Mois. | NOMS des JOURS. | Product. naturelles et instrumens ruraux. | | LEVER | | | COUCHER. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H. | D. | C. | H. | D. | C. |
| 1 | Primedi | Luzerne. | Au 1.er | | | | | | |
| 2 | Duodi | Hémerocule. | | | | | | | |
| 3 | Tridi | Trèfle. | Du Soleil. | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 4 | Quartidi | Angélique. | De la Lune | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 |
| 5 | *Quintidi* | CANARD. | | | | | | | |
| 6 | Sextidi | Mélisse. | | | | | | | |
| 7 | Septidi | Fromental. | | | | | | | |
| 8 | Octidi | Martagon. | | | | | | | |
| 9 | Nonidi | Serpolet. | | | | | | | |
| 10 | DECADI | FAULX. | | | | | | | |
| 11 | Primedi | Fraise. | Au 11. | | | | | | |
| 12 | Duodi | Bétoine. | | | | | | | |
| 13 | Tridi | Pois. | Du Soleil. | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 14 | Quartidi | Acacia. | De la Lune | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | *Quintidi* | CAILLE. | | | | | | | |
| 16 | Sextidi | Œillet. | | | | | | | |
| 17 | Septidi | Sureau. | | | | | | | |
| 18 | Octidi | Pavot. | | | | | | | |
| 19 | Nonidi | Tilleul. | | | | | | | |
| 20 | DECADI | FOURCHE. | | | | | | | |
| 21 | Primedi | Barbeau. | Au 21. | | | | | | |
| 22 | Duodi | Camomille. | | | | | | | |
| 23 | Tridi | Chèvre-feuille. | Du Soleil. | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 24 | Quartidi | Caille lait. | De la Lune | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 25 | *Quintidi* | TANCHE. | | | | | | | |
| 26 | Sextidi | Jasmin. | | | | | | | |
| 27 | Septidi | Verveine. | P. Q. le 6 à . . | | | | 6 | 1 | 7 |
| 28 | Octidi | Thym. | P. L. le 14 à . . | | | | 7 | 5 | 4 |
| 29 | Nonidi | Pivoine. | D. Q. le 22 à . . . | | | | 3 | 7 | 1 |
| 30 | DECADI | CHARRIOT. | N. L. le 28 à . . | | | | 9 | 7 | 0 |

*Été.* MESSIDOR. X.e Mois.

*Le 1.er répond au 19 Juin* (v. style).

| J. du Mois. | NOMS des JOURS. | Product. naturelles et instrumens ruraux. | | LEVER | COUCHER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primedi | Seigle. | Au 1.er | H. D. C. | H. D. C. |
| 2 | Duodi | Avoine. | | | |
| 3 | Tridi | Oignon. | Du Soleil. | 1 6 5 | 8 3 5 |
| 4 | Quartidi | Véronique. | De la Lune | 2 7 5 | 9 2 8 |
| 5 | *Quintidi* | MULET. | | | |
| 6 | Sextidi | Romarin. | | | |
| 7 | Septidi | Concombre. | | | |
| 8 | Octidi | Echalote. | | | |
| 9 | Nonidi | Absinthe. | | | |
| 10 | DECADI | FAUCILLE. | | | |
| 11 | Primedi | Coriandre. | Au 11. | | |
| 12 | Duodi | Artichaut. | | | |
| 13 | Tridi | Giroflée. | Du Soleil. | 1 6 5 | 8 3 5 |
| 14 | Quartidi | Lavande. | De la Lune | 7 2 4 | 0 8 9 |
| 15 | *Quintidi* | CHAMOIS. | | | |
| 16 | Sextidi | Tabac. | | | |
| 17 | Septidi | Groseille. | | | |
| 18 | Octidi | Gesse. | | | |
| 19 | Nonidi | Cerise. | | | |
| 20 | DECADI | PARC. | | | |
| 21 | Primedi | Menthe. | Au 21. | | |
| 22 | Duodi | Cumin. | Du Soleil. | 1 6 5 | 8 3 1 |
| 23 | Tridi | Haricot. | De la Lune | 0 0 0 | 4 9 7 |
| 24 | Quartidi | Orcanette. | P. Q. le 6 à.. | | 2 2 9 |
| 25 | *Quintidi* | PINTADE. | P. L. le 14 à.. | | 3 2 8 |
| 26 | Sextidi | Sauge. | D. Q. le 21 à.. | | 6 0 2 |
| 27 | Septidi | Ail. | N. L. le 28 à.. | | 3 1 9 |
| 28 | Octidi | Vesce. | Solst. d'Eté le 3 à | | 7 9 9 |
| 29 | Nonidi | Bled. | | | |
| 30 | DECADI | CHALÉMIE. | Eclipse de Soleil invisible à Paris le 28. | | |

## *Été.* THERMIDOR. XI.e Mois.

*Le 1.er répond au 19 Juillet* (v. style).

| J. du Mois. | NOMS des JOURS. | Product. naturelles et instrumens ruraux. | | LEVER H. D. C. | COUCHER H. D. C. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primedi | Epeautre. | Au 1.er | | |
| 2 | Duodi | Bouillon blan | | | |
| 3 | Tridi | Melon. | Du Soleil. | 1 7 5 | 8 2 4 |
| 4 | Quartidi | Ivraie. | De la Lune | 3 1 7 | 9 0 7 |
| 5 | *Quintidi* | BELIER. | | | |
| 6 | Sextidi | Prêle. | | | |
| 7 | Septidi | Armoise. | | | |
| 8 | Octidi | Carthame. | | | |
| 9 | Nonidi | Mûre. | | | |
| 10 | DECADI | ARROSOIR. | | | |
| 11 | Primedi | Panis. | Au 11. | | |
| 12 | Duodi | Salicot. | | | |
| 13 | Tridi | Abricot. | Du Soleil. | 1 8 3 | 8 1 6 |
| 14 | Quartidi | Basilic. | De la Lune | 7 5 2 | 0 8 0 |
| 15 | *Quintidi* | BREBIS. | | | |
| 16 | Sextidi | Guimauve. | | | |
| 17 | Septidi | Lin. | | | |
| 18 | Octidi | Amande. | | | |
| 19 | Nonidi | Gentiane. | | | |
| 20 | DECADI | ECLUSE. | | | |
| 21 | Primedi | Carline. | Au 21. | | |
| 22 | Duodi | Caprier. | Du Soleil. | 1 9 3 | 8 0 6 |
| 23 | Tridi | Lentille. | De la Lune | 9 8 8 | 5 6 5 |
| 24 | Quartidi | Aunée. | | | |
| 25 | *Quintidi* | LOUTRE. | P. Q. le 5 à . . | | 1 2 |
| 26 | Sextidi | Myrte. | P. L. le 13 à . . | | 3 3 5 |
| 27 | Septidi | Colsa. | D. Q. le 20 à . . | | 7 8 9 |
| 28 | Octidi | Lupin. | N. L. le 27 à . . | | 7 5 1 |
| 29 | Nonidi | Coton. | Eclipse de Lune visible à Pa- | | |
| 30 | DECADI | MOULIN. | Commenc. le 13 à 7 h. 9 d. 2 c. Finira à 8 h. 6 d. 0 c. | | |

## *Été.* FRUCTIDOR. XII.e Mois.

*Le 1.er répond au* 18 *Août* (v. style).

| J. du Mois. | NOMS des JOURS. | Product. naturelles et instrumens ruraux. | | LEVER H. D. C. | COUCHER. H. D. C. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primedi | Prune. | Au 1.er | | |
| 2 | Duodi | Millet. | Du Soleil. | 2 0 4 | 7 9 5 |
| 3 | Tridi | Lycoperde. | De la Lune | 3 6 2 | 8 7 6 |
| 4 | Quartidi | Escourgeon. | | | |
| 5 | *Quintidi* | SAUMON. | | | |
| 6 | Sextidi | Tubéreuse. | | | |
| 7 | Septidi | Suction. | | | |
| 8 | Octidi | Apocyn. | | | |
| 9 | Nonidi | Réglisse. | | | |
| 10 | DECADI | ECHELLE. | | | |
| 11 | Primedi | Pastèque. | Au 11. | | |
| 12 | Duodi | Fenouil. | | | |
| 13 | Tridi | Epine-vinette | Du Soleil. | 2 1 6 | 7 8 3 |
| 14 | Quartidi | Noix. | De la Lune | 7 1 9 | 8 0 8 |
| 15 | *Quintidi* | TRUITE. | | | |
| 16 | Sextidi | Citron. | | | |
| 17 | Septidi | Cardière. | | | |
| 18 | Octidi | Nerprun. | | | |
| 19 | Nonidi | Targette. | | | |
| 20 | DECADI | HOTTE. | | | |
| 21 | Primedi | Eglantier. | Au 21. | | |
| 22 | Duodi | Noisette. | | | |
| 23 | Tridi | Houblon. | Du Soleil. | 2 2 8 | 7 7 2 |
| 24 | Quartidi | Sorgho. | De la Lune | 9 9 9 | 6 2 7 |
| 25 | *Quintidi* | ECREVISSE. | | | |
| 26 | Sextidi | Bigarade. | | | |
| 27 | Septidi | Verge-d'or. | P. Q. le 5 à . . | | 5 4 9 |
| 28 | Octidi | Maïs. | P. L. le 13 à . . | | 1 8 2 |
| 29 | Nonidi | Marron. | D. Q. le 20 à . . | | 0 0 9 |
| 30 | DECADI | PANIER. | N. L. le 27 à . . | | 2 9 4 |

*Eté.* LES SANCULOTIDES. Derniers jours de l'année.

*Le 1.er répond au 17 Septembre* (v. style).

| JOURS. | NOMS des JOURS. | FÊTES. | | LEVER | | | COUCHER. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H. | D. | C. | H. | D. | C. |
| 1 | Primedi | *De la Vertu.* | Au 1.er | | | | | | |
| 2 | Duodi | *Du Génie.* | Du Soleil | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 3 | Tridi | *Du Travail.* | De la Lune | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 4 | Quartidi | *De l'Opinion.* | | | | | | | |
| 5 | *Quintidi* | *Des Récomp.* | P. Q. le 5 à . . | 4 | 0 | 5 | | | |
| 6 | Sextidi | *Franciade.* | | | | | | | |

# ANNUAIRE DU CULTIVATEUR.

## VENDÉMIAIRE, Ier. MOIS.

*Mois des Vendanges.*

*RAISIN*, fruit à grappe de la vigne; arbrisseau sarmenteux, originaire d'Asie, cultivé dans les climats chauds et tempérés. Il existe un grand nombre d'espèces et de variétés de raisins, qui diffèrent de forme, de grosseur, de couleur, de saveur, de précocité : les uns sont bons pour la table, d'autres pour la *cuve*. Le raisin se conserve frais, suspendu, séparé, dans un lieu sec, obscur, bien clos; peut se transporter au loin dans des vaisseaux de bois remplis de millet; sec, se conserve mieux; égrappé ou non, suivant sa maturité, mis dans une cuve, écrasé en 1.

I. venant de la vigne, son jus est le *moût*, *vin doux*, qui fermente, s'échauffe, bouillonne, se colore plus ou moins, devient du *vin*, se perfectionne dans le *tonneau*, se conserve en bouteille. Le vin tiré de la cuve, on pressure le *marc*, on fait un *second vin*; le *marc* arrosé d'eau donne la *piquette*. Le marc est un engrais pour les terres, fait des couches chaudes pour les jardins, offre aux animaux une nourriture qu'on conserve en la salant; il sert de chauffage, sa cendre est recherchée. Le *pepin* donne de l'huile, et son charbon est préféré en Perse pour la poudre à tirer. Le vin dépose au fond du tonneau une boue ou *lie* qui est employée dans la chapellerie, et sur les *parois* une matière saline, couleur de la lie, friable : c'est le *tartre*, qui dissous dans l'eau, purifié, fait la crême de tartre; ou brûlé, donne la cendre gravelée. On retire du vin, de la lie, du marc, par la distillation, *l'eau-de-vie*, qui, rectifiée, donne l'esprit-de-vin plus ou moins ardent. Le vin, la lie, retravaillés sur la rafle du raisin, donnent le vinaigre qu'on rend plus fort par la gelée. Des lames de cuivre disposées par couches, avec

des rafles de raisin, dans des pots placés dans des lieux humides, se changent en verd-de-gris pour le commerce. Du moût on fait du *vin cuit*; on y met différens fruits. Avec du raisin sec et de l'eau, on fait du vin. Le vin reçoit sa couleur dans la cuve, de la peau du raisin. Les raisins préférés pour la table, frais, secs ou confits, sont, le *précoce*, le *corinthe*, le *malvoisie*, l'*olivet*, le *chasselas* (précoce, doré, musqué, violet), le *ciotat*, le *cornichon*, le *muscat* (doré, noir, violet, d'Alexandrie). Le *bourdelas* donne le verjus pour assaisonnement, un sirop et des confitures. On préfère pour la cuve, le *meunier*, le *morillon*, le *bourguignon*, le *sanmoireau*, le *fromenteau*, le *gamet*, le *meslier*, le *noireau*, etc. 1.

Les vins de France, très-variés, très-abondans et fort recherchés de toute l'Europe, font une branche importante de commerce.

*SAFRAN D'AUTOMNE*, plante vivace, *bulbeuse*. Cultivé en grand dans plusieurs départemens; celui du cidevant *Gâtinois* est très-estimé. Du milieu de la fleur s'élève un *pistil* blanchâtre, divisé à son extrêmité en trois parties de couleur orangée, 2.

qui forment le *stigmate ;* il est seul
2. odorant, seul recherché. On coupe la fleur encore peu ouverte; sa récolte est longue ; on en détache soigneusement le stigmate, qui séché à une chaleur douce, se conserve enfermé dans un lieu sec. Un arpent peut donner par an 15 livres de safran séché ; il sert à la peinture, la teinture ; colore, assaisonne les alimens, les boissons, les liqueurs. On change le safran de terrein tous les quatre ou cinq ans, en messidor ; il est moins sujet aux maladies dans les terres légères.

3. *CHATAIGNE*, semence à coque épineuse du châtaignier, grand arbre des pays montagneux, chauds, tempérés. On compte beaucoup de variétés. La châtaigne est une nourriture saine pour les hommes, les animaux ; fraîche, se mange rôtie, bouillie à l'eau, au lait. Pour l'avoir plus agréable, on ôte la première peau ; on la jette dans l'eau chaude pour enlever la seconde, en remuant à l'aide d'un bâton branchu ; on la fait cuire ensuite sans eau dans un vase bien couvert ; séchée, elle se conserve plusieurs années ; pelée, réduite en farine, fait bouillie, gâteau, galette,

galette, tient lieu de pain. On peut en faire une boisson fermentée. La première peau peut, dans la teinture, remplacer la noix de galle pour les noirs. 3.

*COLCHIQUE*, *Tue-Chien*, plante vivace, *bulbeuse*, des prairies, nuisible aux hommes, aux animaux. Ses feuilles, son fruit ou capsule, paroissent ensemble dès l'hiver; elle est sans feuilles lorsqu'elle fleurit en automne. Sa racine contient une *fécule* nutritive quand elle est bien lavée. 4.

*CHEVAL*, quadrupède à sabot entier, de plaine, originaire d'Asie; sauvage, domestique, perfectionné par l'éducation. C'est le plus bel animal, par l'éclat de sa robe, l'élégance de ses formes, la cadence, l'harmonie de ses mouvemens: c'est le plus vîte, le plus fort des animaux de même masse, pour porter et tirer. Il est courageux, ardent, docile, sobre, sensible aux bons traitemens, s'irrite des injustices, en conserve le souvenir; dans sa colère, frappe la terre du pied droit de devant; se bat des pieds de derrière. Ami de son semblable, il l'appelle par son hennissement; ami de l'homme, il le sert dans ses travaux, ses voyages, aux 5.

5. combats. Les chevaux fins sont difficiles à élever. Le cheval varie beaucoup dans ses couleurs; sa hauteur est depuis deux pieds et demi jusqu'à six : son poil est ras ou frisé; quelquefois sans poil : les espèces pures n'ont point de poils longs aux jambes. Les climats chauds produisent les plus parfaits. Le cheval croît ordinairement jusqu'à cinq ans, est formé à neuf; vit au-delà de trente-cinq ans; se nourrit d'herbes, de foin, de grains, de racines, est redoutable aux jeunes arbres, dont il mange l'écorce, les jeunes pousses; pâture plus près que le bœuf, mange moins que la *jument*; peut parcourir, dans une marche forcée, cinquante lieues d'un midi à l'autre, et jusqu'à trente lieues de suite. Les allures qu'il préfère sont le pas, le trot. La jument est plus basse du devant; elle porte onze mois; son lait très-séreux, fournit aux Tartares une boisson fermentée, dont ils retirent de l'eau-de-vie, appellée *konmouisch*. Les Orientaux mangent la chair du cheval : on retire une huile à brûler de toutes ses parties graisseuses; sa chair nourrit quelques animaux. Les arts emploient ses crins, sa peau : la corne de ses pieds peut

faire de la *colle-forte;* elle entre dans la fabrication du bleu de Prusse. 5.

*BALSAMINE*, plante annuelle, originaire de l'Inde; fleur simple ou double, blanche carnée, rose, rouge, violette ou panachée; sa capsule mûre lance, en se contractant, les graines qu'elle contient. 6.

*CAROTTE*, plante bisannuelle, sauvage, des lieux arides, perfectionnée par la culture : sa racine longue, cassante, sucrée, est jaune, rouge ou blanche; elle nourrit les hommes, les animaux, parfume les alimens; séchée, réduite en poudre, très-utile aux voyageurs : elle craint les grands froids, demande une terre douce, divisée, profonde; sa graine aromatique se sème avec avantage parmi les grains du printemps. On cultive une petite carotte jaune, pâle, hâtive, et une petite rouge plus hâtive. 7.

*AMARANTHE*, *Passe-velours*, plante annuelle, originaire de Chine, cultivée dans les jardins; ses fleurs sont cramoisies, cerises ou jaunes. 8.

*PANAIS*, plante bisannuelle, sauvage, dans les pâturages; cultivée en grand, résiste au froid : sa feuille fait un bon fourrage. Sa racine longue, charnue, blanchâtre, savou- 9.

reuse, très-nourrissante pour les hommes, les animaux, donne une fécule abondante; supplée en Irlande à l'orge pour la bière; sa graine aromatique réussit bien dans les terres fraîches, et peut être semée parmi les chanvres.

9.

10. *CUVE*, grand vase destiné à recevoir la vendange, de forme ronde, ovale ou carrée, de pierre, de ciment ou de bois; celle-ci préférable; rétrecie dans le haut, elle est plus solide, plus favorable à la fermentation. Le vin se fait mieux lorsqu'on rassemble beaucoup de vendange dans une même cuve. Dans les années abondantes, la cuve sert de tonneau, en la couvrant d'un second fond.

11. *POMME DE TERRE*, plante vivace originaire du Pérou; en France depuis la fin du 16e. siècle : ses racines nombreuses, traçantes, sont chargées de tubercules ou pommes de terre. Plusieurs variétés recherchées, de grosseurs, de formes différentes, blanches, rouges, violettes ou jaunes. La plante porte un fruit rond, rempli de semences qu'on cueille en brumaire, lorsque le feuillage jaunit : on le conserve dans du sable, ou suspendu. On arrache ensuite la plante

avec la charrue, une fourche ou la main : on sépare les petites pommes de terre pour la plantation, et les grosses pour l'usage; elles craignent le froid, l'humidité. On les conserve dans des lieux fermés, secs, dans des creux bien couverts, faits sur des lieux élevés, en terre sèche, ou enfin exprimées par un pressoir, mises en pain et séchées. La pomme de terre est d'une grande ressource pour les hommes, les animaux; le feuillage frais sert de fourrage; on la mange cuite sous la cendre ou à la vapeur de l'eau bouillante dans des vases couverts, ou même sans eau, avec ou sans assaisonnement; cuite à grande eau, à découvert, perd de sa qualité; blanchie dans l'eau salée, séchée, broyée, fait galettes pour les voyages d'outre-mer, et n'est point attaquée des insectes; rapée crue, broyée dans l'eau, donne trois onces par livre d'une fécule blanche, fine, légère, agréable cuite au bouillon, au lait. La grosse blanche à points rouges, en fournit plus. Les terres légères, élevées, donnent des pommes de terre tendres, farineuses, sèches; elles sont grasses, de mauvais goût dans les lieux humides. Au printemps,

11. après avoir fumé, labouré, hersé, on plante les petites pommes de terre entières, ou les grosses coupées par morceaux séchés à l'air. La plante grande, on sarcle, on butte, on marcotte. Deux setiers au plus par arpent, en produisent cinquante à cent. Cette culture est utile dans les défrichemens, les terres vagues; elle ameublit la terre, détruit les herbes. On en sème la graine pour multiplier les variétés; les plus hâtives se récoltent en messidor. La pomme de terre gelée est encore bonne en la dégelant dans l'eau froide; on fait de bonne colle avec la fécule.

12. *IMMORTELLE* : trois espèces de plantes de ce nom, qui leur vient de la durée de leurs fleurs : la première, fleurs en tête aplatie, couleur blanche ou purpurine; la seconde, originaire de l'Inde, fleurs en tête arrondie, un peu conique, couleur violette ou blanche; toutes les deux annuelles; la troisième, originaire d'Afrique, vivace, toujours verte, cotonneuse, fleurs en tête ronde, jaunes.

13. *POTIRON*, plante annuelle, cultivée en grand, craint le froid; elle porte des fleurs femelles et des fleurs mâles séparées sur le même pied. Si

l'on coupe celles-ci trop tôt, on rend les premières stériles ; son voisinage peut faire perdre au melon et autres plantes semblables, leurs bonnes qualités ; son fruit est le plus gros connu, de forme ronde, applati de la tête à la queue; il sert de nourriture aux hommes, aux animaux, aux poissons : crud et rapé ou cuit, pêtri avec de la farine, il augmente la masse du pain et le jaunit : ses semences donnent une huile très-douce, et entrent dans l'orgeat : on cultive une variété moins grosse, hâtive. 13.

*RÉSÉDA ODORANT*, plante bisannuelle, originaire d'Egypte, odeur suave et fugace ; il parfume les jardins. 14.

*ANE*, quadrupède à sabot entier, originaire d'Arabie, sauvage ou domestique ; tête grosse, oreille longue, jambe sèche, croupe applatie, queue nue, garnie à l'extrêmité, poil gris, rouge ou brun, raie noire sur le dos, traversée d'une autre sur le garrot. Il a le pied sûr, va ordinairement l'amble, change difficilement d'allure, se détourne pour éviter l'eau, la boue. Il a l'œil bon, l'ouie, l'odorat fins ; son braiement s'entend de loin, est désagréable. Il est sobre, se contente des 15.

15. herbes que les autres animaux dédaignent, s'accommode de tout, est délicat pour l'eau, qu'il préfère claire, coulante ; vit à peu de frais, dort peu et debout. Il est laborieux : si on le surcharge, il incline la tête, baisse les oreilles ; il porte plus qu'aucun animal de sa taille. Jeune, il est gai, léger ; âgé, il est lent, têtu ; il vit autant que le cheval, peut produire à deux ans : il est ardent, furieux dans le plaisir ; est attaché à sa progéniture. La femelle porte douze mois un petit nommé *ânon* ; elle peut être couverte peu de jours après. L'âne avec la jument produit les grands mulets ; le cheval avec l'ânesse produit les petits mulets. L'âne est moins fort dans les pays froids ; les plus vigoureux sont dans l'Asie mineure, l'Espagne ; en France, ceux des départemens de l'ouest sont les plus beaux. La peau de l'âne est dure, élastique, sert à faire des cribles, des tambours, des tablettes de poche pour écrire, en l'enduisant de plâtre et de céruse : le gaînier l'emploie sous le nom de *chagrin* (*sagri*) : on se sert de la bourre, des os, de la corne des pieds. Cet animal qui sert utilement l'homme, en est trop méprisé ; son espèce pourroit être perfectionnée.

*BELLE-DE-NUIT*, plante vivace, originaire d'Amérique, racine charnue; ses fleurs s'ouvrent en l'absence du soleil, d'où lui vient son nom. On en cultive deux espèces dans les jardins, l'une odorante, fleur blanche, tube très-long; l'autre plus commune, fleur blanche, jaune, rouge, panachée; toutes les deux craignent le froid. 16.

*CITROUILLE*, plante annuelle, ressemblant au potiron; son fruit aussi gros est oblong, ses couleurs plus variées; sa chair moins abondante, moins délicate, sert à la nourriture des hommes, des animaux. Ce qui a été dit des semences, des fleurs du potiron et de son effet sur les mélons, s'applique à la citrouille : elle craint aussi le froid. 17.

*SARRASIN*, *Bled noir*, plante rameuse, annuelle, originaire d'Asie; craint le froid, vient dans les mauvaises terres, peut se semer après une première récolte, croît vîte; verte, sert de fourrage. Ses fleurs blanches ou roses, en bouquet, sont recherchées des abeilles, qui en tirent un *miel* peu estimé. Sa graine noire, anguleuse, contient une farine blanche qu'on peut séparer sur une feuille de tôle chauffée; on en fait gruau, bouillie, ga- 18.

lette, pain : elle excite les poules à
18. pondre, les engraisse, rend leur chair délicate, tient lieu d'avoine aux chevaux. La plante enfouie par le labour avant la floraison, sert d'engrais à la terre.

On préfère le sarrasin de Tartarie qui supporte le froid, donne un grain plus gros et mûrit plutôt.

19. *TOURNESOL, Maurelle*, plante annuelle, commune dans le midi de la France : le suc en est exprimé dans un moulin, lorsqu'elle est encore fraîche ; on en imbibe des toiles grossières, qu'on expose ensuite à la vapeur d'une lessive d'alun, de chaux, d'urine en ébullition ; ces toiles se colorent en bleu foncé : c'est le *tournesol en drapeau*, que les Hollandois nous enlèvent pour le mettre en *pain* et nous le revendre ensuite. Leur procédé est encore ignoré. On emploie le tournesol en pain dans plusieurs arts, au lieu d'indigo ; sa couleur est peu solide ; il sert à faire reconnoître les substances acides.

20. *PRESSOIR A VIN*, machine destinée à exprimer du marc de raisin fermenté ou non, le vin ou le moût qu'il contient. Le pressoir à *bascule*, avec ou sans vis, qu'on appelle aussi

à *pierre*, à *tesson*, à *cage*, demande un grand emplacement, est coûteux, exige dix à douze hommes, casse souvent, est d'un effet lent. Le pressoir à *étiquet*, mis en mouvement par des leviers ou avec une roue horizontale ou verticale, ce qui vaut mieux, prend peu d'espace, est peu coûteux, occupe quatre hommes, est d'un plus grand effet que le précédent. Dans l'un et l'autre on taille le marc à chaque *serre*, ce qui fait passer dans le vin la saveur âcre de la grappe. 20.

Le pressoir *à coffre simple ou double*, est le meilleur de tous; les parties principales qui le composent, sont :

1°. Le *bâtis*, qui fait la base de la machine;

2°. La *maie* de bois; carré long, creusé dans toute son étendue pour former le bassin, un peu plus profond dans son pourtour que vers le milieu;

3°. Un *coffre* fixé sur des chevrons dans le bassin de la maie, formé d'un fond carré, sur lequel s'élèvent solidement trois planches épaisses, formant trois côtés du coffre; l'un est le *dossier*, contre lequel se fait la pression; les deux autres sont les *flasques*, qui sont percées de trous; le quatrième

20. côté du coffre, vis-à-vis le *dossier*; est fait d'une pièce carrée mobile, de même largeur, de même hauteur; c'est le *mulet*. Le marc ou la *pressée* est mis dans le coffre, dont la capacité est plus ou moins grande, suivant qu'on avance ou qu'on recule le *mulet*;

4°. Le *mouton*, pièce de bois placée derrière le *mulet*, qui reçoit et transmet l'action de la vis;

5°. L'écrou, de bois dur, fixé solidement à l'entrée du coffre pour recevoir la vis;

6°. La vis en bois dur, placée horizontalement;

7°. La roue taillée en rochet, enarbrée sur le milieu de la vis, mise en mouvement par un levier à double cliquet;

8°. Planches taillées comme des lames de couteau, placées dans la partie supérieure du coffre, destinées à glisser les unes entre les autres au-dessous d'une traverse fixe, à mesure que le *mulet* avance, afin que la serre se fasse en-dessus comme sur toutes les autres faces du cube;

9°. Second coffre semblable au premier, et placé symmétriquement;

10°. *Tablier* de voliges de bois blanc,

placé devant les trous des flasques pour empêcher le jaillissement du vin. 20.

Deux hommes suffisent pour servir ce pressoir. On serre dans un des coffres, et pendant que le vin s'écoule, on pousse la vis dans l'autre coffre.

On place, dans l'opération, des coins entre le mouton et le mulet dont ils empêchent le retour. La vis doit peu sortir de l'écrou, afin qu'elle ne se torde pas.

On sépare le vin des dernières serres, comme moins bon. On ne taille pas le marc.

La pressée, d'abord de 7 pieds, est réduite à 18 pouces. On obtient de la même quantité de marc un 15.e de vin de plus que dans les autres pressoirs: il permet par jour six maies par coffre, quinze poinçons de vin par maie, ou cent quatre-vingts poinçons en tout. Le pressoir à étiquet fait vingt fois moins d'ouvrage.

*CHANVRE*, plante annuelle, originaire de Perse, distinguée en *mâle* et *femelle*: le premier porte des fleurs sans graine; le second des fleurs et une graine appellée *chenevis*. On appelle improprement chânvre mâle celui qui porte la graine, et chanvre femelle 21.

21. celui qui ne porte que des fleurs. Il se sème après les gelées dans des terres légères, meubles, fraîches ou *nouvellement desséchées*; craint le froid, les oiseaux. Le *mâle* mûrit et se cueille le premier; on sème en même temps à sa place des navets, des turneps, des panais. La femelle cueillie, on la met en bottes qu'on rassemble dans un creux, la graine en bas, on les butte de terre pour achever de mûrir la graine et en faciliter la séparation. La femelle dépouillée de sa graine et le mâle sont portés au rouissage. On rouit, 1°. dans l'eau courante ou tranquille; 2.° en étendant le chanvre sur les prés; 3.° en le mettant debout dans une fosse humide couverte. La première méthode donne rarement un chanvre blanc, corrompt l'air et l'eau, tue le poisson qui s'y trouve et les animaux qui en boivent. Si l'eau du *rouitoir* est dormante, elle devient un bon engrais. La seconde méthode n'est point nuisible; elle est lente et rouit inégalement; l'herbe de dessous en végète mieux. Quelques cultivateurs croient la troisième préférable aux deux autres (1). Le rouissage

(1) Bral suit à Amiens une méthode

ramollit, nettoie la *filasse*, lui donne de la souplesse, facilite sa séparation de la *chenevotte*. On sèche le chanvre au soleil; on le serre dans un lieu sec, aéré; on le teille, broye, foule en hiver; la filasse sert à faire des cordes; peignée avec plus ou moins de soin, filée à la quenouille ou au rouet, sert à faire des toiles plus ou moins fines, qu'on blanchit par la cendre et la rosée, ou par le procédé de Bertholet, plus prompt, plus économique. La culture ne fournit pas assez de chanvre à la France pour sa consommation. Le chenevis nourrit la volaille, donne de l'huile; le marc engraisse les bestiaux. 21.

*PÊCHE*, fruit à noyau du pêcher; 22.

qui a du succès. Le chanvre encore verd, la tête et la racine coupées, est mis, par couches séparées, dans une fosse de seize pieds en carré, huit pieds de profondeur, dont l'eau se renouvelle sans cesse, mais lentement, par un petit filet d'eau continu. La poignée mise ensuite dans un auget rempli d'eau, y est retenue par des pointes qui sont dans le fond et deux cordes chargées d'un poids qui passent par-dessus. On retire par le gros bout la *chenevotte* brin à brin; la filasse reste. On la lave dans une eau courante; elle est alors très-blanche. Cette méthode mérite d'être plus connue.

origine incertaine. Sa grosseur depuis
22. un pouce jusqu'à quatre de diamètre ; semée de noyau, varie beaucoup : elle est agréable à la vue, au toucher, au goût : on la distingue en velue quittant le noyau *(pêche commune)* ; velue tenant au noyau *(pavi)* ; lisse quittant le noyau *(pêche violette)* ; lisse tenant au noyau *(brugnon)*. On mange ce fruit crud, séché, cuit, confit à l'eau-de-vie, au vinaigre, au sucre : on en fait du vin. Le pavi rouge de Pompone, bon confit au vinaigre ; la petite mignonne à l'eau-de-vie ; la sanguinole, qui a la chair rouge, en compote ; l'abricotée, l'alberge jaune, ont la chair jaune ; l'avant-pêche blanche est mûre en *messidor* ; la pêche de peau à la fin de *vendémiaire* ; les *bourdines*, *tetton de Vénus*, *madeleine violette*, réussissent mieux en plein vent. On remarque comme singularité, le pêcher nain et le pêcher à fleurs semi-doubles qui donnent du fruit.

23. *NAVET*, plante bisannuelle, racine charnue, pivotante ; très-varié ; chair blanche ou jaune ; cultivé en grand, se sème par un temps pluvieux en terre légère, sablonneuse ; peut succéder dans l'année à d'autres récoltes ;

laissé dans les terres, les engraisse; cueilli, les ameublit : la feuille sert de *fourrage*. Le navet se mange crud, cuit; les bestiaux le mangent avec plaisir; il doit être coupé par morceaux; sa graine nourrit la volaille, fournit de l'huile. Le navet coupé par tranches, séché, se conserve. Dans cet état il donne avec l'eau une boisson fermentée. 23.

*AMARYLLIS*, plante vivace, racine charnue, bulbeuse; trois espèces connues dans les jardins, la *belle-dame*, le *lys-jacques*, le *lys du Japon*, belles fleurs, couleurs vives, cerise, rose, cramoisi foncé, comme semée de paillettes d'or, odeur suave. 24.

*BŒUF*, quadrupède ruminant, domestique; c'est le taureau coupé. La castration faite à deux ans et au-dessous, le rend plus gros, plus grand; au-dessus, il est plus courageux, plus actif. A deux ou trois ans, on le met au travail; à dix on l'en retire pour l'engraisser. Il vit d'herbe, foin, paille, graines, fruits, racines, feuilles, jeunes pousses de divers arbres (1). Le 25.

(1) Dans les parties du Nord où l'herbe est rare, on fait sécher ces jeunes pousses, et on les met en bottes pour

25. bœuf est sobre, mange vîte, se couche pour ruminer : il prospère dans les pays chauds, mieux dans les tempérés ; parvient dans les bons pâturages au poids de seize cents livres et plus. La force de sa tête, la masse de son corps, le peu de hauteur de ses jambes, la lenteur, l'uniformité de ses mouvemens, sa patience, le rendent précieux dans les travaux champêtres qui demandent continuité d'action. On l'attèle seul ou à deux et plus, par les épaules, par la tête, ou de l'une et l'autre manière à la fois ; la seconde vaut mieux. Le joug est placé derrière les cornes : il est mieux devant ; un seul joug attache deux bœufs au timon ; quelquefois, ce qui vaut mieux, chaque bœuf a son joug. Il a le pied sûr, peut porter sur le dos, mieux sur les cornes ; il est sensible aux bons traitemens, obéit à la voix : la chaleur l'incommode. Les arts emploient son poil, sa peau, ses cornes et leurs

l'hiver. Lorsqu'on veut s'en servir, on en met dans un vase de bois avec de l'eau, on y jette des cailloux rougis au feu, on recouvre, la feuille se ramollit ; lorsque le tout est refroidi, on a tout-à-la-fois une nourriture et une boisson agréables au gros comme au petit bétail.

noyaux, son sang, son fiel, ses intestins, ses os; sa chair, très-substantielle, saine, de facile digestion, se mange cuite, fraîche, se conserve séchée, fumée, salée, pour les armées, la marine, les voyages de long cours: son fumier bon engrais. Il y a une variété sans cornes. 25.

*AUBERGINE*, *Melongène*, plante annuelle, originaire d'Asie, d'Afrique, d'Amérique; fruit rond ou oblong, violet ou blanc, cultivé en pleine terre dans les climats chauds, sur couche dans les climats tempérés de la France; se mange cuit, assaisonné. La variété à fruit blanc est cultivée sous le nom de *plante aux œufs*. 26.

*PIMENT*, *Poivre-long*, plante annuelle, originaire d'Amérique, cultivée dans les jardins; aime la chaleur; son fruit long, obtus, pointu ou rond, est d'abord verd, ensuite rouge ou jaune; frais, se confit au vinaigre; séché, supplée au poivre. 27.

*TOMATE*, plante annuelle, originaire d'Amérique; fruit charnu, forme applatie, beau rouge ou jaune, peau fine; aime la chaleur, sert d'assaisonnement. 28.

*ORGE*, plante annuelle, quatre espèces: 1°. le *commun*, originaire 29.

de Sicile et de Russie; 2°. le *nu* ou *sucrion*, originaire de Tartarie; 3°. *l'escourgeon*; 4°. *le plat* ou riz d'Allemagne : cultivé en grand par-tout, réussit dans tous les climats, croît dans les terres légères; préféré, après le froment et le seigle, pour faire du pain, qui est meilleur lorsqu'on le mêle dans la proportion d'un tiers avec les deux autres. Mondé, perlé, en gruau, cuit au lait, au bouillon, fait une nourriture saine; germé, séché, moulu, délayé dans l'eau, mis dans une cuve, fermente à l'aide d'un levain, fait la bière, et de l'eau-de-vie de grain. L'orge remplace l'avoine pour les chevaux, nourrit, engraisse la volaille.

29.

30. *TONNEAU*, vase de bois destiné à contenir des liquides, de forme cylindrique, renflé par son milieu où est la bonde, ou de la forme d'un œuf tronqué par les deux bouts. Il est composé de plusieurs pièces appellées *douves*, contenues par des cercles de bois ou de fer; fermé à chaque bout par un fond de bois encastré dans une rainure circulaire, appellée *jable*. Le merrain ou bois de douve et de fond est fait de bois de chêne dépouillé de son aubier et bien sec. Les cercles sont

faits ordinairement de bois de châtaignier.

Il est à desirer que les tonneaux soient d'une capacité uniforme dans toute la république, et dans un rapport constant avec les nouvelles mesures de capacité.

Jours 30.

## BRUMAIRE, II^e. MOIS.

*Mois des Brumes, Brouillards.*

Jours 1.

POMME, fruit à pepin du pommier, arbre moyen, cultivé avec succès dans tous les jardins, et en grand dans les climats tempérés : on distingue la pomme à *cidre* et la pomme à *couteau ;* celle-ci forme plus de soixante variétés, dont un tiers de choix. Elle se cueille à la main, depuis messidor jusqu'au milieu de vendémiaire ; varie en grosseur depuis un pouce jusqu'à cinq de diamètre ; en *maturité*, depuis messidor jusqu'à la même époque de l'année suivante ; en *forme*, *couleur*, *saveur :* elle est tendre ou cassante ; se mange crue, séchée, cuite, confite,

1. en gelée, en pâte. La *pomme de glace* mise dans une eau un peu salée, fait une boisson agréable, rafraîchissante. La reinette franche, supérieure à toutes, se conserve le mieux : les pommes mises en tas ressuent; on les essuie avec un linge doux, sec; on sépare celles qui sont sans tache et les meilleures, pour les étendre sur de la mousse sèche, dans un lieu sec, obscur, tempéré; si elles gèlent, on les fait revenir dans l'eau froide. On peut les transporter au loin.

Les pommes à cidre, plus variées, se cueillent dans ce mois; entassées quelque temps, écrasées sous la meule, pressurées, elles fermentent dans le tonneau, donnent le pommé ou cidre dont on fait de l'eau-de-vie, du vinaigre; la pomme âpre donne le cidre qui se conserve le mieux. Le marc arrosé d'eau fermente encore, donne un *petit cidre*; desséché, nourrit la volaille, les bestiaux, sert de chauffage. Le moût de pomme ainsi que le moût de raisin, se cuit seul ou avec différens fruits dont on fait des compotes qui se conservent toute l'année.

Les semis de pepin donnent quel-

Jours.

quefois des variétés intéressantes, que la greffe perpétue. 1.

Les pommes sauvages engraissent les cochons.

*Céleri*, plante bisannuelle sauvage, aromatique, âcre, des lieux humides; s'adoucit, s'attendrit par la culture et le blanchiment; se mange crud, cuit : les bestiaux le mangent. Les graines, très-aromatiques, douces, entrent dans quelques liqueurs. Ses variétés sont le céleri long, court, plein, creux, rouge, et le céleri-rave, préféré pour cuire : il se mange en entier. 2.

*Poire*, fruit à pepin du poirier, grand arbre des forêts. Au moins 150 variétés de *couleur*, *grosseur*, *saveur* différentes, connues sous plus de mille noms, dont un tiers de choix. Elles se distinguent en fondantes, cassantes, à cuire, à couteau, d'été, d'automne, d'hiver. Les plus précoces mûrissent en messidor; les plus tardives se cueillent en vendémiaire, mûrissent jusqu'au printemps suivant; se conservent comme les pommes; se mangent crues, séchées, tapées, cuites, confites au sucre, à l'eau-de-vie, au vin cuit; écrasées, fermentent, donnent une boisson nommée *poiré*; on en fait de 3.

l'eau-de-vie, du vinaigre. Le marc,
3. ainsi que les fruits entiers, arrosés d'eau, donnent une boisson; est préféré à celui de la pomme pour la volaille et le chauffage.

Quelques espèces de poires se perpétuent de semence sans dégénérer; d'autres demandent la greffe.

4. *BETTERAVE*, plante bisannuelle; cultivée en grand, fatigue peu la terre; racine grosse, pivotante, charnue, sucrée, d'un rouge foncé, rouge clair, jaune, ou blanche. Les feuilles, la racine se mangent cuites; la racine crue se conserve dans le vinaigre, dans le sel: réduite en pulpe, elle fermente, devient acide, agréable à manger. Cette plante fait une bonne nourriture pour les bestiaux, ainsi qu'une variété précoce très-grosse, rouge, pâle, connue sous le nom de *disette*. Deux variétés sont cultivées pour la table: l'une petite, blanche, pour sa précocité; l'autre de Castelnaudari, pour sa saveur.

5. *OIE*, oiseau aquatique, à pied palmé, sauvage, domestique. Le mâle est appellé *jars*, les petits, *oisons*. L'oie est vorace, facile à élever; s'éveille, crie au plus léger bruit. On lui enlève son duvet deux fois l'an;

celui

celui de l'oie du Nord plus estimé : les plumes de l'aile servent pour écrire. La sensualité a fait imaginer des moyens atroces pour engraisser l'oie et grossir son foie. On conserve sa chair en la séchant, la fumant, la salant, ou en la mettant dans la graisse. Les oies sauvages changent de climat, vont par troupe, disposées sur deux lignes qui forment un angle ; leur vol offre des remarques intéressantes. La femelle couve trente jours, et fait plusieurs pontes dans l'année. 5.

*HÉLIOTROPE*, arbuste vivace, délicat ; apporté du Pérou en France, au commencement du dix-huitième siècle. On le cultive pour sa fleur, qui a l'odeur de la vanille ; il se multiplie de graine, de bouture ; semé ou planté dès le commencement du printemps, il fleurit dans l'année. Une espèce annuelle, connue sous le nom d'*herbe aux verrues*, croît dans nos champs. 6.

*FIGUE*, fruit du figuier, arbrisseau laiteux, originaire d'Asie. Cet arbre aime la chaleur ; on le garantit du froid en l'empaillant, ou ce qui vaut mieux, en couchant ses branches dans la terre, lorsqu'elle est sèche ; il donne deux récoltes par an. Ses fleurs sont cachées 7.

dans le fruit. Les variétés nombreuses
7. de la figue, cultivées dans le midi de la France, font une branche considérable de commerce. Les plus cultivées dans la partie moyenne, sont la blanche, la longue, la ronde, l'angélique, la violette. La figue se mange fraîche, sèche; en la faisant fermenter, elle donne de l'eau-de-vie.

8. *SCORSONÈRE*, *Salsifis noir*, plante laiteuse, potagère, vivace, originaire d'Espagne, de Sibérie; résiste au froid. Sa racine longue, noire en dessus, et blanche en dedans, se mange cuite.

9. *ALIZIER DES BOIS*, arbre moyen; feuille profondément découpée; bois dur, de bonne qualité, qui sert au tourneur, menuisier, charpentier. On l'emploie à monter quelques outils, à faire les fuseaux des lanternes, les alluchons des roues dans les machines. Son fruit nommé *alize*, se mange *bletti* ou mou comme la nèfle; par la fermentation il donne une boisson.

10. *CHARRUE*, *Araire*, *Aran*, le plus utile, le plus usité des instrumens d'agriculture pour ouvrir, remuer, diviser, ameublir, relever, renverser la terre qu'on veut ensemencer, et pour

chausser, butter les plantes. Elle remplace le *pic*, *la bèche*, comme plus expéditive. Elle doit être solide, légère, aisée dans sa marche, facile à diriger. Sa construction varie suivant la qualité, la profondeur du sol. | 10.

Elle est simple ou composée, avec ou sans avant-train, à une ou deux roues, sans coutres, ou à un, deux, trois, quatre coutres; à coutres sans soc pour faciliter le défrichement; à une ou deux oreilles, à oreilles amovibles ou non.

Les parties qui la composent sont:

1°. Le *cep* de bois dur (poirier, prunier, cormier), de forme triangulaire, poli, avec ou sans roulette à son talon. Il porte le soc.

2°. Le *soc* de bon fer acéré, aigu, avec ou sans ailes, de 18 à 36 pouces de long, fixé au cep qu'il déborde.

3°. L'*age*, *flèche* ou *timon*, d'une seule pièce de bois léger (hêtre, frêne, tilleul), long de six à dix pieds, plus ou moins incliné sur le cep, s'attache au joug ou à l'avant-train.

4°. L'*oreille* ou *versoir*, de forme, partie concave, partie convexe, de bois dur, poli, bordé de fer, placé à droite ou à gauche du cep, pour relever, renverser la terre.

10. 5°. Le manche à une, à deux branches de bois dur (chêne).

6°. Le coutre ou couteau de bon fer acéré, fixé à la flèche presque verticalement en avant du soc, pour fendre la terre, couper les herbes, les racines.

7°. L'avant-train, à hauteur du poitrail, léger, à une, deux ou trois roues de bois; *moyeu* de frêne; *jantes*, frêne ou hêtre; *rais*, chêne ou frêne.

Le soc pique, entre d'autant plus qu'il est plus court, que l'angle qu'il fait avec l'age est moins ouvert, que l'age est plus long, que le tirage est plus horizontal, plus élevé.

11. *SALSIFIS* ou *SERSIFIS*, plante laiteuse, bisannuelle des prairies: cultivée, résiste au froid; sa racine blanche se mange cuite.

12. *MACRE*, *Cornuelle*, *Châtaigne d'eau*, plante annuelle des étangs, demande au moins vingt pouces d'eau; se cueille en automne: l'amande de son fruit se mange crue, cuite; approche pour la saveur, la consistance, de la châtaigne; devroit être multipliée.

13. *TOPINAMBOUR*, *Terre-à-touffe*, plante traçante, vivace, originaire du Bresil; cultivée en France depuis le

commencement du 17e. siècle; vient dans les mauvaises terres, rapporte, multiplie beaucoup, résiste au froid, est presque indestructible. Sa fleur paroît tard, est semblable à celle du soleil des jardins, mais plus petite. Ses racines sont des tubercules irréguliers, charnus, nourrissans, dont la saveur approche de celle de l'artichaut : toute la plante nourrit les bestiaux. Ses tiges contiennent du nitre, pourroient donner de la filasse : multipliée constamment par ses racines, elle a cessé de donner de la graine, et par conséquent des variétés utiles. 13.

*ENDIVE, Scarole, Chicorée frisée*, plante annuelle potagère; craint le froid : blanchie, se mange crue, cuite; se conserve confite; varie par sa grosseur, ses découpures, sa précocité, sa tendreté. Elle fait une nourriture rafraîchissante pour les chevaux; pourroit être cultivée avec avantage pour les moutons. 14.

*DINDON*, gros oiseau de basse-cour, originaire de l'Amérique septentrionale; sauvage, pèse jusqu'à soixante livres; domestique, jusqu'à trente livres : naturalisé au commencement du seizième siècle. Son plumage est noir, gris, blanc, ou panaché. 15.

Le dindon est irascible, bat à mort
15. les animaux foibles de son espèce; vit de graines, d'herbe, de racines, de fruits, et d'insectes, dont il purge les jardins, les champs; ne craint point le froid, réussit mieux dans les terreins secs, s'engraisse aiséement, surtout avec des noix non ouvertes; est bon à manger dès la première année; sa chair est savoureuse, digestive, nourrissante. La femelle pond à l'écart, couve deux fois l'an, ne quitte pas son nid, même pour ses besoins; les petits sont trente jours à éclore; trop de soins leur nuisent, les rendent difficiles à élever. Ils aiment à paître, mangent l'ail, l'ortie. L'humidité, la faim leur sont contraires: les plumes des dindons sont employées.

16. *CHERVI*, plante vivace connue en Europe depuis 1600; cultivée pour sa racine pivotante, blanche, charnue, douce, qui se mange cuite; c'est une des racines dont on a retiré jusqu'à présent le plus de sucre en tout semblable à celui du commerce. Sa graine germe difficilement, réussit mieux en automne.

17. *CRESSON DE FONTAINE*, plante vivace, aquatique. Le cresson peut se cultiver dans les jardins; se mange

crud, confit au vinaigre; desséché, sert sur mer dans les voyages de long cours. On lui substitue par erreur le *cresson des prés* et le *beccabunga*. 17.

*DENTELAIRE*, plante vivace, feuille très-caustique, d'usage en médecine; fleur bleue, en épi, qui dure jusqu'aux gelées. 18.

*GRENADE*, fruit du grenadier, arbrisseau originaire d'Afrique, naturalisé dans le midi de la France; varie en grosseur; saveur plus ou moins acide; il est bon crud; se confit et se transporte au loin. Son écorce sert dans la teinture et la tannerie. 19.

*HERSE*, instrument aratoire formé d'un chassis de bois triangulaire, trapèze ou carré, armé en dessous de pointes de fer ou de bois, longues de cinq à huit pouces. Elle sert à diviser, ameublir, égaliser la terre; suivant le poids dont elle est chargée, elle couvre les semences plus ou moins profondément, selon leur nature. Les petites graines n'ont besoin que d'un fagot d'épines au lieu de herse. Elle sert aussi à enlever la mousse des prés et les mauvaises herbes des terres. Cette opération réussit mieux en temps de neige. 20.

*BACCHANTE*, arbrisseau de l'A- 21.

21. mérique septentrionale, presque toujours verd; craint les grands froids, croît vîte, donne tard ses fleurs élégantes; cultivé dans les jardins sous le nom de *seneçon* en arbre.

22. *AZEROLE*, fruit à osselets de l'azerolier, agréable, appellé d'*Italie*; petit arbre épineux, cultivé dans le sud de la France, ressemblant à l'aubépine. L'azerole a la forme de la pomme d'api, est beaucoup plus petite, moins colorée: quelques variétés sont longues ou blanches; elle se mange crue, confite; on en fait une boisson fermentée.

23. *GARANCE*, plante vivace, traçante, sauvage, dans le midi de la France; cultivée par-tout; fatigue peu la terre; ses feuilles tendres nourrissent les bestiaux; ses racines fournissent à la teinture une couleur rouge, orangée, très-solide; fraîche, elle est préférable, mais elle ne peut se transporter au loin, qu'en la desséchant laborieusement dans des fours, et la pulvérisant. On éviteroit ces deux opérations en la cultivant près des ateliers de teinture. On a teint les os de quelques animaux, en mettant de la racine de garance dans leurs alimens.

24. *ORANGE DOUCE*, fruit à pepin de l'oranger, petit arbre originaire d'Asie,

naturalisé dans le midi de la France. Sa fleur recherchée des abeilles, a une odeur suave, très-expansive; on en fait une eau aromatique. Le fruit se mange crud, confit; se transporte au loin; on en prépare une boisson. Son écorce donne de l'huile essentielle, que le sucre rend miscible à l'eau. Plusieurs variétés : les meilleures ont l'écorce mince, lisse; on préfère celle dont la chair est rouge. 24.

*FAISAN*, oiseau des bois, originaire d'Asie, naturalisé dans les parties tempérées; son éducation est difficile; fait un grand dégât dans les bleds: son plumage est beau; sa chair délicate a un fumet qui lui est propre. La poule faisane pond vers le commencement de floréal, couve vingt-cinq jours; ses plumes, lorsqu'elle vieillit, prennent l'éclat de celles de son coq. 25.

*PISTACHE*, fruit à amande du pistachier, arbre moyen, originaire d'Asie, naturalisé dans le midi de la France. On distingue le pistachier à fleur mâle, et à fleur femelle portant du fruit disposé en bouquet. La peau verte, cramoisie, recouvre une coque peu dure, dont l'amande verdâtre, d'une saveur agréable, se mange fraîche, 26.

26. sèche, en dragée; contient une huile fort douce.

27. *MACJON*, *Gland de terre*, *Sane*, plante vivace des champs; jolie fleur papilionacée, purpurine, odorante; tubercule à sa racine de la forme d'un gland; peau noire, chair blanche; se mange cuit sous la cendre et à l'eau; sa saveur est celle de la châtaigne; il contient du sucre et une fécule. Il seroit utile d'essayer de cultiver cette plante comme fourrage; dans certains pays on la cultive pour son tubercule.

28. *COING*, fruit à pepin du coignassier, arbre moyen, originaire d'Asie. Le coing a la forme de la poire, est gros, jaune, d'une odeur agréable; sa chair astringente, ferme; ses semences très-mucilagineuses. Il se mange crud, cuit; parfume les fruits avec esquels on le prépare: on en fait une liqueur, on le confit au sucre, au vin cuit. Le coing de Portugal est plus gros et préféré.

29. *CORMIER*, *Sorbier domestique*; grand arbre des forêts, beau port; fleurs blanches, nombreuses, disposées en ombelle (ou parasol); fruit à pepin, petit, de la forme d'une poire, long ou rond, d'une saveur âpre; il mûrit sur la paille, se conserve peu, se

mange mou ou bletti, est préférable à la nèfle, et recherché par les animaux ; sans eau on en fait un *cidre* fort, avec de l'eau une boisson légère. Le cormier cultivé, réussit partout, croît lentement ; son écorce est astringente ; son bois rougeâtre, le plus dur des bois des grands arbres de la France, est employé à monter des outils, faire des verges de fléau, des vis de pressoir, des cylindres, poulies, et toutes les parties des machines sujettes à frottement ; il doit être travaillé très-sec. Cet arbre utile est trop peu cultivé. 29.

*ROULEAU*, instrument rural de bois, de pierre, de fer, à un ou deux cylindres sur deux lignes parallèles, montés dans un même chassis, ou sur la même ligne ; ce dernier tourne aisément et ne déchire pas le terrein ; uni à sa surface, il divise, écrase les mottes, affermit la terre sur les semences, les racines ; ralentit l'évaporation, unit les gazons, les prairies ; hérissé de pointes, il divise mieux, rompt la croûte qui arrête la sortie des semences. Le chassis doit être aussi garni de pointes en dedans. Des rouleaux de fonte d'un grand poids servent à affermir les chemins. 30.

# FRIMAIRE, IIIe. MOIS.

*Mois des Frimats.*

1. RAIPONCE, plante bisannuelle, laiteuse; racine pivotante, blanche, cassante, saveur douce qui se mange, ainsi que la feuille, crue, cuite. On peut la transporter des champs dans les jardins, pour recueillir la graine qui est très-fine, luisante, brunâtre, de culture difficile. elle réussit semée sur une terre douce, légère, bien ameublie, sans être couverte autrement que de mousse ou de paille froissée cette plante aime l'ombre, la fraîcheur.

2. *TURNEPS*, *Rave*, *Rabioule*, espèce de navet, plante bisannuelle, racine plus ou moins large, ronde ou applatie, terminée en dessous par un filet pivotant; peau blanche, verte ou violette vers le collet, chair ferme, cassante, blanche ou jaunâtre; celle-ci préférable; cette racine se mange crue, cuite sous la cendre, à l'eau, parfume les alimens;

coupée mince, on la fait aigrir dans de l'eau salée, comme le *saurcraute.* Ses pousses jeunes se mangent en salade; sa graine donne de l'huile; toute la plante peut nourrir, engraisser les bestiaux. Après une première récolte, les moutons parqués, les cochons, se nourrissent de ce qui reste. 2.

Le turneps se sème dès prairial dans les terres légères, plus tard dans les terres fortes, jusqu'à la seconde décade de fructidor; un temps de pluie est nécessaire pour le garantir du ticquet ou lisette, deux livres de semence suffisent par arpent; sur la fin de la saison il en faut moins. On recouvre peu, on sarcle, on éclaircit à un pied de distance. il réussit mieux dans les terres légères, sablonneuses, profondes, bien préparées; utilise les jachères, craint peu le froid, fatigue peu la terre, sert à l'ameublir. En enfouissant le turneps par le labour, il sert d'engrais. Sa variété à racine jaune se mange jeune, comme le radis.

*CHICORÉE SAUVAGE*, plante vivace, laiteuse, amère, ne craint point le froid, se mange verte toute l'année; blanchie l'automne, l'hiver; 3.

cultivée en grand, donne un fourrage abondant, utile pour tous les bestiaux les cochons mangent sa racine. Variété à fleur blanche.

3.

4. *NÈFLE*, fruit du néflier, arbre moyen des forêts; deux variétés cultivées, l'une à gros, à petit fruit à osselets, l'autre à petit fruit sans osselets; se mange blettie crue, en beignet; sa maturité devient égale au-dedans et au-dehors, en l'agitant dans un *van*.

5. *COCHON*, quadrupède domestique provenant du sanglier; le mâle se nomme *verrat*, la femelle *truie*; elle porte environ quatre mois, peut mettre bas deux fois l'an, jusqu'à douze petits à chaque fois : croît vîte, vit vingt ans, craint la chaleur, exige de la propreté, se nourrit de gland, de son, de racines, cherche les vers, fouille, endommage les prairies; jeune, s'engraisse plus ou moins rapidement : lorsqu'il a acquis toute sa graisse, on perd à le nourrir davantage. Son poil ou *soie*, sa peau sont employés dans les arts. La graisse de sa peau sous le nom de lard, celle de ses intestins sous le nom de sain-doux, ainsi que sa chair, se mangent frais, salés ou fumés, et assaisonnent les

Jours.

autres viandes ; le sang, les intestins se mangent aussi. 5.

La variété connue sous le nom de *cochon de Chine, Siam, Tunquin*, a le dos cambré, le ventre pendant jusqu'à terre, est plus petite, croît vîte, s'engraisse plus promptement & à moindres frais que le cochon ordinaire ; sa chair eſt plus délicate.

*MACHE, Doucette*, plante annuelle, sauvage, potagère ; plusieurs variétés ; se mange crue, cuite ; mêlée à l'oseille, l'adoucit ; les agneaux la recherchent : se sème depuis prairial jusqu'en fructidor. Sa graine de trois à quatre ans, préférable ; encore bonne à sept, huit ans. 6.

*CHOU-FLEUR*, plante annuelle potagère, provient du chou ; se soutient sans dégénérer par les arrosemens dans une terre bien amendée ; redevient chou lorsqu'on le néglige ; sa culture difficile ; l'art en procure de frais toute l'année ; se mange cuit ; se conserve frais, dépouillé de toutes ses feuilles grandes et petites dans un lieu sec, obscur ; on le conserve aussi confit, séché. Ses variétés sont *le tendre* ou *hâtif, demi-dur, dur ;* il éussit mieux semé sur couche ; assez 7.

fort, on le transplante avec sa motte
7. en pleine terre.
8. *MIEL*, substance douce, sucrée; rassemblé dans les ruches, dans le creux des arbres, par les abeilles sauvages, domestiques, qui le récoltent au fond des fleurs; elles préfèrent les plantes aromatiques. En automne, le sarrasin, la bruyère sont leur principale ressource; mais le miel en est peu estimé. Le tilleul est regardé dans le Nord comme fournissant le meilleur. Les abeilles remplissent leur estomac du miel qu'elles butinent; une partie les nourrit; elles dégorgent le surplus dans les alvéoles élevés de la ruche: la réunion de ces alvéoles forme les rayons ou gâteaux. Pour obtenir le *miel vierge*, on suspend les *gâteaux* au sortir de la *ruche*, dans un linge propre, au-dessus d'un vase de terre, dans un lieu sans feu ni soleil : on retourne de temps en temps les gâteaux pour en faciliter l'écoulement. Le miel qu'on retire au soleil, ou en pressurant les gâteaux, prend le goût de la cire. Le meilleur est blanc, ferme, grenu. On le mange en nature; on en fait une boisson fermentée, appellée *hydromel*, qu'on perfectionne en la mettant dans des tonneaux qui ont

contenu de bon vin ; on en obtient de l'eau-de-vie, du vinaigre. Le miel pêtri, cuit avec la farine de seigle, fait le *pain d'épice*. Il remplace le sucre dans les confitures et autres usages. Il seroit utile de mettre dans le voisinage des ruches, des plantes choisies, à fleurs tardives. 8.

*GENIÈVRE*, baie noire du genevrier, petit arbre toujours verd des forêts, des lieux stériles, qui, par ses émanations aromatiques, purifie l'air où il végète ; croît lentement, s'élève de graine semée à l'instant de sa maturité ; reprend difficilement par la transplantation. On mange le genièvre sous forme d'extrait ; on en fait une infusion, un ratafia ; avec de l'eau, il fermente, fait une boisson saine, agréable ; il donne une huile essentielle ; l'eau-de-vie de grain aromatisée avec ces baies, donne l'eau-de-vie de genièvre. Son bois très-dur est employé dans les arts. 9.

*PIOCHE*, outil de deux sortes ; l'une à fer pointu, sert à diviser la terre, la pierraille ; l'autre à fer carré, très-convenable pour lever les arbres destinés à être plantés. Dans l'une et l'autre, le fer un peu recourbé est de dix à quinze pouces de long ; le 10.

10. manche de bois, de deux pieds et demi.

11. *CIRE*, substance ductile, inflammable qu'on retire des ruches : elle provient de la poussière que les abeilles recueillent sur les étamines des fleurs, et qu'elles rassemblent en pelote dans les cavités de leurs pattes. Elles en mettent une partie en magasin ; la plus considérable acquiert dans leur estomac les propriétés de la cire ; elle est alors blanche. Les abeilles en font des alvéoles ou petites loges très-régulières, à six faces, où elles déposent leurs provisions et leurs œufs ou *couvain*. Ces alvéoles sont disposés en *rayons* ou *gâteaux*. La cire jaunit dans la ruche par les émanations qui y circulent. Le miel exprimé, on lave, on fond la cire dans l'eau chaude, on la met en pains pour le commerce. Elle est alors jaune, grasse, légère, d'une bonne odeur. Pour blanchir la cire, on la fond de nouveau, on la fait couler par filet délié sur un cylindre horizontal plongeant à moitié dans l'eau froide. On tourne le cylindre, la cire se fige et se déploye en rubans minces qu'on étend sur de la toile à la rosée. Tout corps froid, arrondi, poli, plongé dans la cire fondue, en prend

une couche, la fige, et peut aussi servir à la réduire en lames minces pour le blanchiment. En perdant sa couleur, elle perd son odeur et devient cassante. Pure, imprégnée de diverses couleurs, on en fait des bas-reliefs, des figures, des objets d'étude pour l'anatomie; sa ductilité la rend propre à plusieurs arts; on en fait des bougies. L'éducation des abeilles doit être encouragée, pour trouver en France toute la cire nécessaire à la consommation. 11.

*RAIFORT, Cran*, plante vivace des lieux frais; racine grosse, longue, blanche, charnue; saveur piquante; contient du soufre et de la fécule; se mange crue avec les alimens qu'elle assaisonne; remplace la moutarde; réduite en poudre, est utile dans les voyages de long cours. Ses feuilles longues peuvent nourrir les bestiaux. On force la racine à pivoter, en coupant au printemps les petites racines autour du collet. 12.

*CÈDRE DU LIBAN*, grand arbre résineux, toujours verd, originaire des montagnes d'Asie, cultivé en France depuis 1730. Ses branches horizontales, très-ramifiées, s'étendent au loin: sa forme est pyramidale; sa 13.

pointe s'incline vers le nord. Il est
13. foncé en couleur; son ombrage épais, sombre; son port imposant; son fruit ou cône, de la grosseur du poing, commence à donner en France de bonnes graines. Il se multiplie de semences, réussit dans tous les terreins; jeune, craint le froid; âgé, y résiste: son bois odorant, blanc rougeâtre, d'un tissu fin, serré, et presqu'incorruptible, seroit très-utile dans les arts. Sa résine est d'une odeur agréable. Le bois de cèdre du commerce est celui du *genevrier de Virginie*, ou *cèdre rouge*.

14. *SAPIN A FEUILLE D'IF*, grand arbre résineux, toujours verd, de nos montagnes. Il résiste au plus grand froid, craint le soleil: jeune, il reprend et repousse bien sous les autres arbres; feuilles plates, rayées de blanc en-dessous; fruits ou cônes dont la pointe est dirigée en haut. On le confond avec l'*épicea*, dont la feuille est cylindrique et le fruit pendant.

La résine du sapin est la térébenthine du commerce; distillée, donne une *huile essentielle*, connue sous le nom d'esprit ou essence de térébenthine. Son bois sert dans la mâture, est très-employé dans les arts, varie

peu en longueur par la chaleur, d'une longue durée sous l'eau, sous terre. La seconde écorce détachée au printemps, est employée dans le Nord comme aliment. Ses jeunes branches peuvent suppléer au houblon dans la bière. 14.

*CHEVREUIL*, quadrupède des forêts, des lieux montueux, armé d'un bois peu rameux qui tombe en automne; vit en famille, est fidèle à sa femelle, ne s'apprivoise jamais parfaitement, dévaste les champs, s'élance, saute très-haut pour rompre sa trace lorsqu'il est poursuivi. Sa femelle porte cinq mois et demi, sa peau est employée sous le faux nom de *peau de daim;* sa chair est délicate. 15.

*AJONC*, *Jonc marin*, arbrisseau épineux, toujours verd, fleur papilionacée qui paroît deux fois l'an; croît dans les mauvaises terres; sensible au grand froid; fait des haies; transplanté, reprend difficilement; coupé jeune et écrasé, fournit aux bestiaux un fourrage sain; vieux, sert à brûler; pourri, fait engrais. 16.

*CYPRÈS*, arbre moyen, résineux, odorant, toujours verd, originaire du Levant; porte sur le même pied des fleurs mâles et femelles séparées. Les 17.

étamines des premières répandent au
17. printemps une poussière jaune très-abondante. Aux fleurs femelles succède un fruit articulé, nommé noix de cyprès ; son astriction pourroit le rendre utile dans la teinture et autres arts ; il contient plusieurs graines. Son bois serré, blanchâtre, presque incorruptible, peut croître dans les mauvais terreins ; craint les grands froids. Deux variétés, l'une à branches ouvertes, l'autre de forme pyramidale, sont mal-à-propos nommées la première mâle, la seconde femelle. La forme pyramidale du dernier, sa verdure perpétuelle, son odeur balsamique, l'ont fait planter près des tombeaux, par les anciens.

18. *LIERRE*, arbrisseau grimpant, résineux, toujours verd ; feuilles luisantes, épaisses, d'un verd obscur ; graines noires, en bouquet. Il s'attache aux arbres, aux murailles, les détruit, garnit les lieux ombragés ; son bois léger, spongieux, peut, à défaut de liège, en tenir lieu ; il donne une résine appellée *gomme de lierre*. Le bois des racines sert à affiler des outils. Ses variétés sont à feuilles panachées de blanc, de jaune, et à fruit jaune.

19. *SABINE*, arbrisseau résineux tou-

jours verd, originaire du midi de la France, du genre du genevrier; aime l'ombre; sa forme est irrégulière, son odeur très-forte. Deux espèces, l'une à feuille de cyprès, improprement appellée mâle, c'est la plus commune; l'autre à feuille de tamaris, improprement appellée femelle; l'une et l'autre varient, à feuilles panachées. 19.

*HOYAU*, instrument aratoire; fer long de 15 à 20 pouces, également courbé dans toute sa longueur; cette courbure mesurée à son milieu, donnera un *rayon* de deux pouces et demi de long; largeur du fer, près de *l'œil*, deux pouces; à son extrêmité opposée, cinq: manche de bois coudé, de deux pieds de long; l'espace entre le bout large du fer, et la partie du manche qui y répond, est d'un pied. Le hoyau tient le milieu entre *la pioche carrée* à son extrêmité et *la houe*; il sert avec avantage dans les terres fortes et pierreuses. 20.

*ERABLE A SUCRE*, grand arbre originaire de l'Amérique septentrionale, connu en France depuis peu d'années, encore rare; réussiroit dans nos montagnes. Sa graine doit se semer peu de temps après sa maturité; longue à germer. Les Américains en 21.

recueillent la sève avant la sortie des
21. feuilles, en perçant la tige des arbres vigoureux d'un trou incliné, de cinq pouces de profondeur, d'un pouce de diamètre, dans lequel on met une canule. Cette sève est d'autant plus abondante, qu'il y a eu plus de neige; évaporée dans des chaudières, donne un sucre qui rafiné, crystallise comme le sucre ordinaire, en a toutes les qualités, et fait une branche considérable de commerce. Son bois est propre au chauffage et aux arts. L'érable à sucre ressemble à l'*érable plane;* il en diffère en ce qu'il n'est pas laiteux, et que les écailles de son bouton sont bordées de noir. On prend souvent pour l'érable à sucre, d'autres espèces d'érables.

22. *Bruyère*, arbuste toujours verd. Dix espèces indigènes dont une fleurit sous la neige; quelques-unes sont odorantes. Les fleurs sont agréables, de couleur blanche, verte, rose, rouge, pourpre ou mêlangée suivant les espèces; elles se succèdent toute l'année et fournissent beaucoup de miel. La bruyère croît ordinairement dans les lieux sablonneux, les fertilise par son terreau très-bon à employer dans les cultures soignées. La bruyère

sert

sert à faire des balais, à faire monter les vers-à-soie; on en fait la litière des animaux; réduite en poudre, peut servir de tan; elle fait un bon chauffage; sa cendre est un bon engrais, et contient beaucoup de potasse. 22.

*ROSEAU*, *canne*, grande plante vivace, ligneuse, du sud de la France; ses tiges droites, creuses, forment des tubes divisés par des nœuds espacés également; s'élèvent de 10 à 15 pieds; leur surface dure est comme vernissée. On en fait treillages, peignes, canettes de tisserand, quenouilles, supports de ligne pour la pêche. On les substitue aux échalas; refendues, sont employées comme *lattes*: elles sont durables. Sa racine est sucrée; on mange les premières pousses. Cette plante aime l'humidité, la chaleur. Une variété panachée, plus délicate, est nommée *Roseau-ruban*. On confond sous le nom de *roseau* plusieurs plantes qui ont des noms particuliers. 23.

*OSEILLE*, plante vivace, acide, sauvage, cultivée; sa racine charnue, pivotante, sèche, donne à l'eau une couleur rouge; ses feuilles se mangent cuites, se conservent confites; les bestiaux la mangent. Plusieurs variétés, la grande ou vierge, la longue, 24.

la ronde, la jaune; la première ne
24. donne point de graines, se multiplie de drageons; les autres de graines. Une autre espèce sauvage, appellée *surelle*, très-petite, plus acerbe qu'acide, est recherchée des moutons. Ce qu'on appelle sel d'oseille est retiré de la plante *alleluia* ou *pain de coucou*.

25. *GRILLON*, *cricri*, insecte qui habite les fournils et autres lieux chauds: le mâle fatigue par son cri; le siège de ce bruit est dans les ailes; il change brusquement de place aussitôt qu'il a crié; est difficile à prendre, fait du dégât dans la farine, les alimens; la lumière l'attire.

26. *PIGNON DOUX*, semence du fruit ou cône du pin cultivé, arbre toujours verd du sud de la France, tige haute, tête étalée. Ce fruit est la pomme de pin des sculpteurs; l'enveloppe ligneuse du pignon contient une amande agréable, émulsive, qui fournit une huile douce. Elle se mange fraîche, sèche, en dragée; on en fait le *pignolet*, espèce de confiture.

27. *LIÈGE*, écorce épaisse d'un à deux pouces, légère, souple, compressible, élastique, d'un chêne verd, arbre du sud de la France. Tous les dix ans

environ, dans le temps de la sève, on la coupe sur l'arbre par tables de 4 à 5 pieds de long, à l'aide d'une petite coignée; on la sépare avec le manche fait en coin, en ménageant le *liber* ou seconde écorce, sans laquelle il ne reviendroit point de liége : l'écorce des vieux arbres est préférable. On la flambe pour la sécher; on la lave, on la dresse en la chargeant. Le liège sert à faire des bouchons, semelles, bouées pour les ancres, chapelets pour les filets de pêcheurs, vases à rafraîchir; il sert aussi à polir les métaux; réduit en charbon, il donne un noir employé dans les arts. On trempe le liège dans des substances grasses, pour qu'il n'absorbe pas l'humidité; on le recouvre de résine, pour empêcher les liqueurs de s'évaporer à travers. 27.

*TRUFFE*, tubercule fongueux, informe, surface rude, gercée, comme chagrinée; elle est cassante, charnue, odorante, noire en dehors et en dedans, quelquefois marbrée. Elle croît sous terre sans racine, ni tige, ni feuille qui l'accompagnent, parvient jusqu'à 4 pouces de diamètre; les cochons en sont friands, aident à la découvrir; on dresse aussi des chiens à cette recherche. On la trouve près 28.

des chênes du côté du Nord à peu de
28. profondeur, quelquefois au pied du charme. La terre au-dessus est stérile; on y remarque des insectes volans. On ignore encore la manière de la reproduire. La nature la multiplie principalement dans le département de la Dordogne. Elle se conserve dans l'huile, ou séchée en poudre. On la mange cuite, assaisonnée; elle parfume les viandes. On en trouve une variété blanche dans plusieurs départemens et dans le Nord.

29. *OLIVE*, fruit à noyau de l'olivier, petit arbre originaire du sud de l'Europe, sauvage, cultivé dans les départemens méridionaux de la France : il craint le froid. On assure que ce fruit, quelle que soit sa grosseur, présente, dans la même espèce, le même rapport de volume entre le noyau et la pulpe. L'olive cueillie avant son entière maturité, est lessivée pour lui ôter son amertume; elle se conserve, se transporte, et se mange confite au sel; mûre, se mange fraîche, assaisonnée. Cueillie à la main à son point de maturité, on la réduit en pâte sous la meule : cette pâte mise dans des sacs de jonc, donne sous la presse une première huile appellée *vierge*. Une seconde pression donne une huile moins par-

faite. Le marc détrempé à l'eau bouillante, et pressuré de nouveau, donne une huile grossière employée pour le savon. L'huile pure se fige facilement : au milieu d'une masse figée, il reste toujours une petite partie fluide très-pure, préférée pour les usages de l'horlogerie. L'huile mise dans des tonneaux dépose sa lie; pour la conserver, on la soutire plusieurs fois. Le marc, appellé *grignon*, fait de bonnes couches de jardin; il s'échauffe et conserve sa chaleur près de deux ans; il sert de chauffage. 29.

Plusieurs variétés ; la plus estimée pour l'huile fine, est celle nommée *aglandou ;* pour manger confite, la *laurine.* L'olive cueillie dans des terreins graveleux, fournit moins d'huile, mais elle est plus délicate.

*PELLE*, outil très-varié dans ses formes et dimensions, plus ou moins creuse, de bois de hêtre ordinairement, quelquefois recouverte de tôle à son extrêmité ; sert à différens travaux ruraux et domestiques, à remuer la terre, la pierraille ; on en durcit le bois par le feu. La pelle en fer à manche de bois est préférable, dure plusieurs années, fatigue moins l'ouvrier. 30.

# NIVOSE, IVe. MOIS.

*Mois de la Neige.*

1. TOURBE, fossile combustible, débris de végétaux passant à l'état bitumineux, des lieux qui ont été ou sont marécageux. La tourbe est spongieuse, légère ou compacte, fibreuse ou non; sa couleur est du brun au noir; s'échauffe entassée à l'air si elle est humide, s'y enflamme si elle abonde en pyrites; exhale en brûlant une mauvaise odeur qu'elle perd en la réduisant en charbon.

La carbonisation de la tourbe se fait comme celle du bois, par un feu étouffé, ou par une distillation en grand dans un four en brique enfoncé en terre, au-dessous et autour duquel on pratique des canaux de circulation où l'on entretient du feu.

Il se dégage de la tourbe, par ce dernier procédé, de l'eau et une huile ou goudron contenant de *l'ammoniaque* (alkali volatil). Lorsque

l'opération est finie, on laisse refroidir. La tourbe se trouve réduite du tiers ou de moitié, en un charbon noir sonore, dont on se sert dans plusieurs ateliers; l'usage doit en être encouragé. 1.

La tourbe compacte est la plus propre à réduire en charbon; la légère est susceptible de culture, peut faire un bon engrais pour les terres, et sa cendre pour les prés. Un sol tourbeux pénétré d'eau est ordinairement tremblant.

Les départemens de la république où l'on connoît des tourbières exploitées ou non, sont : Paris, Seine et Oise, Seine inférieure, Oise, Somme, Pas-de-Calais, Aisne, Seine et Marne, Marne, Moselle, Meuse, Meurthe, Isère, Drôme, Mont-Blanc, Jura, Aude, Pyrénées, les Landes, Bec-d'Ambès, Dordogne, Charente inférieure, Deux-Sèvres, Loire inférieure, Indre, Sarthe, Eure. On présume qu'il en existe dans d'autres départemens.

*HOUILLE*, *Charbon de terre*, combustible précieux très-abondant en France, qui se trouve par veines, couches, amas, dans le sein de la terre, à différentes profondeurs. Il est noir, luisant, feuilleté, quelquefois 2.

2. grenu, friable, compacte ou léger, pur ou terreux, sec ou gras. Il se divise à l'air humide, s'échauffe et quelquefois s'enflamme. Il est employé très-utilement et sans aucun danger, dans un grand nombre d'arts, même dans la boulangerie, en chauffant le four par l'extérieur comme pour la carbonisation de la tourbe. Le plus léger s'allume promptement, dure peu; le plus compacte s'allume difficilement, chauffe mieux, plus longtemps; le charbon gras est celui qui au feu se boursoufle, se colle, fait la voûte, donne une grande chaleur; c'est le meilleur pour souder le fer et rafiner l'acier.

On l'épure, comme on fait le charbon de bois : on le met par petits tas qu'on couvre de terre en y pratiquant des soupiraux. On allume par le bas, et l'on bouche toutes les ouvertures. Il perd de son poids dans cette opération et augmente de volume. On l'épure aussi dans des fours; le menu du charbon de terre gras s'y aglutine, fait des masses, et peut être employé dans les hauts fourneaux, dans les arts métallurgiques et dans les usages domestiques. On pêtrit aussi le menu

JOURS

avec l'argille, pour faire un chauffage économique. 2.

Le charbon de terre donne, par une distillation en grand, une eau styptique et une huile ou goudron, qu'on peut employer dans la marine et à la préparation des cuirs.

Il se trouve du charbon de terre dans la plupart des départemens de la France. Il alterne avec les couches de grès, de schistes ou de calcaires, dans les montagnes secondaires les plus voisines des montagnes primitives.

*BITUME*, substance minérale, 3.
inflammable, liquide ou solide, d'une odeur forte, désagréable. Il se trouve pur ou mêlé dans le sein de la terre, s'élève dans les grandes chaleurs du fond des eaux, ou découle de la terre et de quelques rochers qui en sont imprégnés. *Le pétrole*, *l'asphalte*, *la poix minérale*, *le charbon de terre*, *le jai ou jayet*, *le succin ou ambre jaune*, sont des bitumes; on les trouve dans le voisinage des volcans et des sources salées; le succin se trouve sur le bord de quelques mers.

*SOUFRE*, substance minérale très- 4.
inflammable, jaune, légère, cassante, pure ou combinée, informe ou crystal-

lisée, quelquefois demi-transparente.

4. Le soufre donne en brûlant une vapeur suffocante connue sous le nom d'*acide sulfureux*, dont on se sert pour tuer les animaux malfaisans, en l'introduisant dans leur retraite. Cette vapeur blanchit la laine, la soie, mais les altère ; décolore les fleurs, les étoffes. Fondu, mêlé avec la brique pilée, sert à sceller le fer dans la pierre ; on en fait des allumettes, des mèches pour soufrer les vins ; coloré, il sert à prendre des empreintes ; pulvérisé, il entre pour un huitième dans la poudre à tirer. Une poignée de soufre allumé éteint le feu dans les tuyaux de cheminée en les bouchant dans le haut et sur-tout dans le bas. Chauffé dans des vaisseaux clos, il s'élève, se sublime en fleurs de soufre. On le retire ordinairement des pyrites; il existe en filon mêlé à du sable, entre Dore-l'Église et Arlan ; on le trouve aussi dans les volcans et dans quelques substances animales et végétales. Le soufre donne l'*acide sulfurique*, connu sous le nom impropre d'*huile de vitriol* ou d'*acide vitriolique*.

5. *CHIEN*, quadrupède de forme, de grandeur, de couleur, de caractère différens ; sauvage, domestique. Ses

variétés sont, oreilles droites ou pendantes, tête ronde ou alongée, lèvres pendantes, dos relevé, jambes torses, poil ras, long, frisé, sans poil. Le chien a l'odorat fin, boit en lapant, mange avidement, quelquefois par jalousie, guérit ses plaies en les léchant, a le sommeil léger, aboie, hurle, met de l'accent dans sa voix pour exprimer sa joie, sa douleur, sa crainte, sa vigilance, sa colère, sa victoire ou sa défaite. Il perd la voix dans quelques pays chauds. Dans sa course, la ligne de son corps est oblique à la direction de sa route. C'est le plus intelligent des animaux domestiques; il est susceptible de bonne, de mauvaise éducation; maltraité, tenu à la chaîne, il devient rampant, craintif, vindicatif, méchant, traître; la liberté, les bons traitemens le rendent gai, caressant, fidèle, docile, patient, courageux. Ami de l'homme, il le suit, voyage, se repose, vit en société avec lui, partage ses dangers, le défend, rassemble, garde, conduit ses troupeaux, veille sur ce qui lui appartient, vient mettre à ses pieds la proie qu'il a poursuivie dans les champs, les bois. S'il perd l'odorat en suivant une piste, on le lui rend en

5.

lui mouillant le nez. Il sert à tirer des
5. fardeaux, à mouvoir quelques machines. Sa femelle porte soixante-trois jours, de quatre à huit petits ; il vit vingt ans. La laine du barbet, la soie de l'épagneul sont employées ; sa peau est très-recherchée ; on mange sa chair dans quelques pays ; on lui trouve la saveur de celle du mouton. Dans les îles de la mer du Sud, on nourrit les chiens de végétaux ; ils sont stupides, hébêtés.

6. *Lave*, matière provenant des terres, des pierres calcinées, fondues dans les entrailles des volcans, et qui en est sortie comme un torrent de feu ; ardente, elle est fluide, molle ou pulvérulente ; refroidie, elle est en masse informe ou régulière ; en boules, en tables, en prismes ou basaltes, à 3, 4, 5, jusqu'à 9 faces. La lave est légère, poreuse ou compacte, tendre ou dure ; ses couleurs varient ; les plus ordinaires sont entre le gris et le noir ; il y en a de blanches. Elle étincèle au briquet, est excellente dans la construction, durcit à l'air ; on en fait des meules de moulin. Les scories volcaniques, le gravier ou la *pozzolane* sont recherchés pour faire des voûtes solides, légères ; pour les travaux sous l'eau, et tout

ce qui demande un bon ciment. La lave se vitrifie aisément ; on en fait des bouteilles d'un verre noir, léger, qui quelquefois est attaquable aux acides. 6.

*TERRE VÉGÉTALE*, ou terre propre à recevoir les semences des plantes, à en favoriser la végétation. Elle est composée de terres calcaire, argilleuse, sablonneuse, et des produits de la décomposition des végétaux, des animaux, de manière à ne paroître former qu'une terre homogène. Elle est légère ou forte, meuble ou serrée, sèche ou fraîche, grasse, profonde, suivant la proportion, la nature des substances qui la composent, l'intimité, la profondeur du mêlange. Elle prend le nom de la substance qui y domine. La meilleure terre végétale est douce, fine, facile à diviser ; s'imprègne aisément d'humidité ; la retient au degré le plus convenable pour une bonne végétation, et durcit difficilement. Les terres inférieures en qualité peuvent être amendées par le mêlange d'autres terres ou de marnes argilleuses, sablonneuses ou calcaires, choisies pour leur fournir ce qui leur manque : on emploie aussi le fumier. 7.

*FUMIER*, *Engrais*, végétaux en 8.

8. décomposition imprégnés d'excrémens d'animaux. Les dépouilles des animaux et des végétaux mêlés ou non, en décomposition, sont aussi du fumier. Il donne de la chaleur, se rembrunit, et finit par se convertir en terreau. Il est plus ou moins humide, chaud, gras; sa quantité, sa qualité doivent être déterminées par la nature des terres auxquelles on le destine. Le fumier de vache est préférable pour les terres maigres, légères; celui de cheval pour les terres fortes. Le fumier fait des couches pour les jardins; sa chaleur le rend propre à l'incubation des œufs; les terres servant d'engrais sont d'un effet plus durable; le fumier d'un effet plus prompt.

9. *SALPÊTRE*, *Nitre*, *Nitrate de potasse*, substance d'une saveur salée, fraîche, amère. Mis sur le feu dans un vase, le nitre fond; s'il touche à un charbon allumé, il fuse, se consume rapidement ainsi que le charbon, en produisant une flamme brillante. Pulvérisé, il entre pour les trois quarts dans la poudre à tirer qui lui doit tout son effet. Il est utile dans plusieurs arts: distillé seul, il fournit un air très-pur, *(air vital, air*

9.

*oxigène)*; distillé avec l'*acide sulfurique* ou de l'argille, il donne l'acide nitrique (l'eau-forte); mêlé en petite quantité avec le soufre, il en détermine la combustion, pour obtenir l'*acide sulfurique* (huile de vitriol, acide vitriolique).

On trouve le salpêtre sur les vieux murs, *(nitre de houssage)* dans les terres de démolition; dans celles qui sont imprégnées de substances animales, végétales et exposées à l'action lente de l'air; dans les étables, écuries, caves, celliers; dans les creux, la croûte de quelques roches calcaires, poreuses, sur une épaisseur d'un pouce environ; dans des terres végétales et quelques plantes.

On fait des nitrières artificielles en rassemblant des terres de démolition, et celles qui ont déjà été lavées, sous des hangards de manière à les rendre très-perméables à l'air, aux vapeurs des substances animales, végétales qu'on y mêle ou dont on les arrose.

On reconnoît une terre salpêtrée en la goûtant, ou en l'éprouvant au feu.

Pour l'en retirer, on rassemble la terre dans des tonneaux; on y fait

passer de l'eau à plusieurs reprises
9. pour dissoudre le salpêtre qui peut s'y trouver. Cette eau bien chargée, ce que fait connoître l'aréomètre, est mise à évaporer sur le feu ; on y met du salin ou potasse retiré des cendres de végétaux : on fait crystalliser dans un lieu frais, et l'on obtient le salpêtre brut qu'on purifie ensuite.

10. *FLÉAU*, instrument destiné à séparer par le battage, les semences de leur paille. Il est composé de deux bâtons inégaux, unis par un anneau flexible de cuir gras, ou de peau d'anguille qui est préférable. L'un des bâtons, plus court, plus gros, doit être de bois dur, pesant (cormier), c'est la *masse* ou *verge ;* l'autre plus long fait le manche qui doit être d'un bois léger (sapin, sureau). La mécanique offre ses ressources pour séparer le grain de sa paille, et l'obtenir très-net, avec économie de force et de temps. On emploie encore dans le midi les pieds des animaux ; cette méthode est la plus mauvaise de toutes.

11. *GRANIT*, roche formée d'une agrégation de *quartz*, de *feld-spath*, de *mica*, quelquefois de *schorl*, de *grenat*, mêlés confusément, unis sans aucun intermédiaire. Il est dur ou

friable, gris, bleuâtre, rouge, jaune ou verd; étincèle au briquet; fait la base, le noyau, le sommet des plus hautes montagnes (1); est disposé en plusieurs endroits par bancs inclinés plus épais dans leur partie inférieure. 11.

Le granit s'échauffe beaucoup au soleil, se divise par rhomboïdes, se délite et tombe en sable par l'action alternative de l'air chaud, humide, froid. Il contribue en s'échauffant à la fonte des glaces dans les hautes montagnes, aux avalanges, à la formation des fentes dans les glaciers et à leur mouvement.

Les variétés les plus solides prennent bien le poli, servent dans les constructions; on en fait des vases, piédestaux, colonnes, meules de moulins. Le granit composé de quartz et de feld-spath passant à l'état de kaolin, peut, sans autre mêlange, faire de la porcelaine.

*ARGILLE*, *Glaise*, *Terre grasse*, pure ou mêlée, blanche, grise, bleue, verte, jaune, rouge ou noire. Elle est 12.

(1) Il fait la *limite* des grandes divisions du globe par bassins. GRANIT, en langue esclavonne, signifie *limite*, *frontière*.

12. douce au toucher ; sèche, se polit sous le doigt, happe ou s'attache à la langue, ne fait point effervescence avec les acides, n'étincèle point sous le briquet, est imperméable à l'eau ; détrempée, corroyée, devient ductile, prend toutes les formes ; sur le tour du potier se façonne en vases, en ustensiles de ménage ; sous la main du sculpteur, elle reçoit la première expression du génie. L'argille éprouve au feu une retraite graduée, s'y durcit au point d'étinceler au briquet, ne s'y fend pas si elle est pure, ne s'y convertit point en verre : celle qui s'y décolore est estimée. L'argille se trouve par lits dans la terre à différentes profondeurs, sert à arrêter les eaux souterraines, à en diriger l'écoulement. On enduit d'argille battue les réservoirs, les bassins pour y retenir l'eau ; elle tient lieu de mortier dans les fours ; pure, on en fait les pipes à fumer, les creusets, les pots de verrerie qui doivent résister à un grand feu. Plus ou moins mêlée, elle fait la poterie commune de grès, la faïance, les carreaux, briques, tuiles. Une argille blanche, sous le nom de *kaolin*, due à la décomposition du quartz, du feldspath, entre dans la porcelaine. L'ar-

JOURS.

gille sert dans les fouleries de draps, les raffineries de sucre, la distillation de l'eau-forte, la purification de la crême de tartre, du muriate d'ammoniac ou (sel ammoniac). Les terres à foulon ou à dégraisser, les terres sigillées, les bols, sont des argilles. Les laves, une portion des granits et d'autres pierres, se convertissent à l'air en argille. 12.

*ARDOISE*, schiste ou pierre feuilletée, argilleuse, magnésienne, d'un bleu noirâtre, plus ou moins dure, poreuse, fine, légère : se trouve par lits à différentes profondeurs, varie dans son poids en prenant l'humidité de l'air ou la lui rendant. Certaine espèce peut servir d'*hygromètre*. La meilleure, pour les usages domestiques, est sonore et non perméable à l'eau. On en couvre les maisons ; on en fait des cadrans, des tables pour écrire, compter, dessiner, démontrer ; elle sert à repasser quelques outils, se rembrunit à l'air, s'échauffe au soleil. L'ardoise contient beaucoup de *magnésie*, et souvent des pyrites. On l'exploite jusqu'à 1800 pieds, par galeries inclinées, quelquefois à ciel ouvert. 13.

*GRÈS*, pierre tendre ou dure, poreuse ou compacte, formée de grains 14.

de sable plus ou moins fins, adhérens
14. entr'eux. Le grès est blanc, gris, rouge, brun ou de couleur mêlée. Il étincèle sous le briquet s'il est assez dur; résiste au feu s'il est pur, est alors employé dans les grands fourneaux de métallurgie, de verrerie, de porcelaine; pénétré de substance calcaire, il est attaqué par les acides; exposé au feu, s'y réduit en sable. Tous les grès se pénètrent d'eau; quelques-uns en retiennent jusqu'à un dixième de leur poids. Le grès sert à paver les chemins, à construire dans les lieux exposés à l'eau; on en fait des meules pour émoudre les canons de fusil, affiler les armes blanches, les outils. Le grès du Levant est recherché pour repasser les instrumens délicats. On filtre les eaux dans des grès poreux.

15 *Lapin*, quadrupède sauvage, domestique; poil court, blanc, gris, roux ou noir; celui d'Angola a le poil long, soyeux. Le lapin frappe la terre de ses longs pieds de derrière au moment du danger, pour avertir sa bande. Il craint l'humidité; se creuse des terriers; fait beaucoup de dégâts dans les champs, les jardins; endommage les arbres. La femelle porte trente

jours de quatre à douze petits, les soigne en bonne mère, les cache au mâle qui les cherche pour les détruire. Le poil du lapin sert dans la chapellerie ; celui d'Angola fait des tissus légers, chauds : la peau de lapin fait des fourrures ; sa chair se mange, devient plus délicate par la castration, est meilleure dans les lieux secs, montueux. On devroit détruire le lapin sauvage qui dévaste tout, et multiplier le domestique qu'on nourrit aisément. 15.

*SILEX*, pierre quartzeuse, dure, qui varie en couleur, transparence, dureté, finesse de grain ; il étincèle sous le briquet, entame le verre, est inattaquable aux acides. La substance du silex pénètre par des filtrations dans les bois, et les pétrifie ; dans les terres, les pierres poreuses, et les durcit. Les pierres à fusil sont des silex qui se trouvent en rognons dans les bancs calcaires. Celles de *Meusnes* et *Couffi* sur le Cher sont les plus estimées. 16.

*MARNE*, terre plus ou moins dure, blanche ou colorée, composée de terre calcaire, d'argille, de sable en différentes proportions : on la distingue par celle de ces substances qui y domine : son effervescence avec les 17.

acides, le vinaigre, la fait distinguer
17. de l'argille pure. On l'emploie très-utilement comme engrais, suivant sa nature, pour donner à chaque terre la partie qui lui manque pour devenir une bonne *terre végétale*. Son effet est lent, mais durable; la meilleure est celle qui s'humecte le plus à l'air, se divise le mieux; elle se trouve par couches dans le sein de la terre. Sa grande utilité la fait rechercher jusqu'à cent pieds de profondeur.

18. *Pierre à chaux*, *pierre à bâtir*, *Carbonate calcaire*, plus ou moins dure, fine, pure, disposée par bancs près la surface de la terre; elle forme des montagnes entières, est souvent mêlée de débris de coquilles, de corps marins. Elle fait effervescence aux acides; fait très-rarement et difficilement feu au briquet; durcit à l'air, quelquefois s'y délite, sur-tout si on ne lui donne pas, dans la construction, la même assiette qu'elle avoit dans la carrière; peut quelquefois se polir; se calcine au feu, devient *chaux vive* qui s'échauffe à l'air humide, éclate, se réduit en poudre, c'est alors la *chaux éteinte* à l'air. La chaux vive, non humectée, dessèche les corps des animaux, les réduit à l'état de momie;

humectée, elle les dissout, les consume, enflamme les matières combustibles : elle fuse, décrépite dans l'eau, l'absorbe abondamment, s'y *éteint*, se réduit en pâte : c'est le blanc des architectes, dont on fait un bon enduit. Unie au sable, elle fait le *mortier ;* à la brique pilée, au mâche-fer, à la pozzolane, fait un bon ciment. La chaux vive sert au chaulage des grains, à la préparation des cuirs. La pierre calcaire crue, réduite en poudre, ou calcinée et éteinte à l'air, sert d'engrais pour les terres argilleuses ; choisie, elle sert au sculpteur, à l'architecte. Toutes les pierres calcaires se pénètrent d'eau, quelques-unes en prennent le sixième, le cinquième, et même le quart de leur poids. 18.

*MARBRE*, pierre calcaire à gros, à petits grains lamelleux ou à facettes, plus ou moins dur, susceptible d'un beau poli, froid au toucher, blanc, gris, jaune, verd, rouge, noir ou de couleur mêlée, dont on compte environ 60 variétés. 19.

Les plus beaux marbres sont l'africain, la brocatelle, le cipolin, le statuaire. Les montagnes de la république renferment de beaux marbres dont l'exploitation doit être encoura-

gée. Le marbre fait effervescence avec
19. les acides, ne fait pas feu au briquet, est souvent mêlé de substances hétérogènes. Lorsqu'il est pur, il peut faire de bonne chaux.

20. *Van*, instrument d'osier, en forme de coquille ovale, à deux anses; servant à nettoyer les grains après le battage. Ses dimensions varient; le plus grand a trois pieds dans son plus grand diamètre; il doit être peu concave pour les graines légères.

21. *Pierre a platre*, *Gypse*, *Sélénite*, *Sulfate de chaux*. Le gypse est pur ou terreux, en masse informe ou crystallisé; se trouve par bancs dans le sein de la terre à différentes profondeurs, forme des montagnes entières, est souvent accompagné de sources salées; est un peu soluble dans l'eau, la rend fade, mal-saine, peu propre à dissoudre le savon, à cuire les légumes; employée aux arrosemens, elle nuit aux arbres en encroûtant leurs racines. Le gypse en poudre, répandu à l'approche de la pluie sur les prairies, détruit les mousses, les lichens, favorise la végétation; en temps sec il nuit.

Le gypse, s'il est mêlé de terre calcaire, calciné, réduit en poudre, délayé,

délayé, gâché, absorbe beaucoup d'eau, prend de la solidité, se gonfle, est employé dans la bâtisse sous le nom de *plâtre* : si le gypse est trop pur, on y mêle de la pierre à chaux. Le gypse choisi, crystallisé, est improprement appellé *faux talc ;* il sert aux mouleurs. Les lieux nouvellement enduits de plâtre sont mal-sains, doivent être aérés, séchés avant d'être habités. 21.

*SEL MARIN, Sel commun, Muriate de soude*, le plus abondant, le plus utile des sels ; se trouve dans les eaux de toutes les mers, dans des puits, des sources, des lacs salés ; dans le sein de la terre, mêlé ou pur (sel gemme). On le tire des eaux de la mer par l'évaporation naturelle, *marais salans ;* des eaux intérieures par l'évaporation artificielle, *bâtimens de graduation, chaudières.* Les procédés qu'on suit sont très-imparfaits, et consomment beaucoup de bois. Les grands froids en augmentant l'évaporation, en congelant l'eau, peuvent servir à concentrer le sel dans l'eau restante, et même à le faire crystalliser. Le sel de mer est préférable pour les alimens, les salaisons ; le sel marin est très-utile aux bestiaux ; mêlé avec 22.

de l'alun, peut servir dans les dissections pour la conservation des objets
22. d'anatomie; est employé dans la métallurgie, verrerie, faïancerie. Il s'humecte à l'air s'il est formé d'une terre calcaire; se conserve sec s'il est formé de soude pure. Par la distillation avec de l'argille, on en retire l'acide muriatique. On peut retirer en grand la soude du sel marin.

23. *FER*, *Acier*, le plus solide, le plus dur, le plus élastique, le plus abondant et le plus utile des métaux pour tous les arts qui nourrissent, vêtissent, abritent, pourvoient de l'instrument du travail, défendent et arment les enfans de la liberté.

Attirable à l'aimant, il s'aimante lui-même et devient le guide, la boussole des voyageurs sur mer, sur terre. L'acier est préférable au fer pour cet usage.

Exposé à l'action combinée du feu et de la vapeur de l'eau, il augmente de poids, se crystallise et fournit un fluide élastique, inflammable, léger, qui dans l'aréostat élève, soutient l'homme dans l'athmosphère, et devient un nouvel instrument pour le génie. L'acide sulfu-

rique sur le fer produit le même fluide. 23.

Au feu le fer brûle, augmente de poids, devient terreux, rouge; c'est l'*oxide* (ou chaux) de fer. Les parcelles de fer détachées du briquet par le choc du caillou, fondent en petits globules et s'enflamment.

L'action alternative de l'air, de l'eau, le convertit en rouille ou ochre jaune, rouge, verte.

Le fer en mine se trouve en différens états dans la terre, à diverses profondeurs. La mine extraite, triée, cassée, lavée et quelquefois grillée, est ensuite mêlée avec de la castine (1) et du charbon de bois, dans des fourneaux de 8 à 10 mètres (2) de hauteur, animés par des soufflets.

La mine fond, coule dans l'*ouvrage* ou creuset. Le fer fondu se sépare du *laitier* (3), est reçu dans des moules de terre ou de sable pour faire des vases, des tuyaux, des canons, etc. ou dans des sillons creu-

(1) Espèce de fondant calcaire ou argilleux, suivant la nature de la mine.

(2) 24 à 30 pieds.

(3) Castine, matières terreuses vitrifiées.

23. sés dans le sable pour obtenir la fonte en saumons ou *gueuses*.

Trop peu de charbon dans les hauts fourneaux, rend la fonte blanche, cassante, plus pesante; le charbon mis dans une juste proportion, la rend grise, douce, tenace; trop de charbon la rend noire, spongieuse. La disette de bois a fait employer quelquefois le charbon de terre épuré.

La fonte chauffée, ramollie au feu de charbon de bois, en petites masses ou *loupes*, affinée, forgée sous des marteaux de 4 à 500 livres, prend du nerf, est tirée en barre.

La meilleure fonte est refondue au fourneau à réverbère pour être coulée en canons;

Ou affinée, forgée, étendue en tôle qui étamée donne le fer blanc;

Ou tirée en fil d'archal de diverses grosseurs;

Ou convertie en acier comme il suit:

La fonte grise coulée en petites plaques est chauffée, ramollie au feu de charbon de bois, bien recouverte de poussier, se pénètre de *carbonne*, est épurée à l'aide d'un sable fondant, est forgée sous le martinet; tirée en barres qu'on jette à l'eau en-

core chaudes ; c'est *l'acier naturel* brut. 23.

Cet acier cassé, trié, assorti dans ses différentes qualités, mis en trousse, chauffé au charbon de terre, à son défaut, au charbon de bois, est corroyé, forgé, raffiné.

Il se soude bien avec le fer, s'égrène peu, soutient le recuit. Le meilleur a le grain égal.

Du bon fer en barreaux longtemps et fortement chauffé dans du poussier de charbon de bois, se carbonne davantage, se boursoufle, devient l'*acier de cémentation* (acier poule), propre à faire des platines, des ressorts, des armes blanches ; il se soude difficilement avec le fer.

Ces deux aciers fondus de nouveau au milieu du charbon, donnent l'*acier fondu* le plus dur, le plus propre à prendre un beau poli ; il ne se soude point avec le fer.

On distingue le fer de l'acier à l'aide de l'eau-forte affoiblie : une goutte sur le fer, laisse une tache blanche, sur l'acier une tache plus ou moins noire suivant qu'il abonde en carbonne.

Le fer et l'acier en fils, en baguettes unis, tordus, forgés ensemble, for-

ment le *damas* qui, passé à l'eau-
23. forte, offre à sa surface des ondes blanches, noires.

L'acier prend à un feu gradué différentes couleurs.

La France est riche en fers ; tous les fers travaillés convenablement sont susceptibles de devenir acier ; nous pouvons, nous devons nous passer de nos voisins pour cet objet.

Un fil d'archal d'un dixième de pouce de diamètre porte 450 livres avant de rompre.

Le bleu de Prusse, le sulfate de fer ou couperose verte sont des combinaisons du fer, employés dans les arts.

On trouve du fer dans les végétaux, dans les animaux.

24. *CUIVRE-ROUGE*, *Cuivre rosette*, métal d'une odeur, d'une saveur désagréables ; plus ductile, moins dur, moins solide, plus fusible que le fer ; très-malléable, s'écrouit ou durcit sous le marteau ; devient plus sonore ; se recuit et perd de sa dureté ; est attaquable aux acides, aux corps huileux ; à l'air, il perd son éclat, sa couleur, prend une teinte rembrunie, verdâtre, luisante, appellée *patine ;* laminé, battu, sert au graveur, au chaudronnier ; il

est dangereux pour la préparation des alimens, se change en verd-de-gris, qui est un poison; il est employé pour le doublage des vaisseaux; étamé ou recouvert d'une feuille d'argent, il est moins dangereux; filé, il prend de la force; un fil d'un dixième de pouce de diamètre porte 299 livres avant de rompre; au feu, le cuivre brûle, augmente de poids, devient fragile, terreux, brunâtre; c'est l'oxide ou chaux de cuivre employé dans les émaux. Le cuivre rosette allié au *zinc*, devient le *laiton* ou cuivre jaune, le *similor*, l'*or de Manheim*; à l'arsenic, devient blanc, dur, cassant; allié au zinc, à l'étain, fait l'*airain*, le *bronze*, la matière des canons, mortiers, médailles, statues. Dans plusieurs départemens de la France, on le trouve à différentes profondeurs, pur ou vierge, en mines ou combiné diversement, informe ou crystallisé. Il n'y a qu'une seule mine exploitée utilement : il pourroit y en avoir plusieurs. 24.

*Chat*, quadrupède, sauvage, domestique; poil doux, court, blanc, gris, roux, noir ou de couleur mêlée. Il retire ses griffes dans leur gaîne, ou les sort à volonté. Il voit peu le jour, mieux la nuit; ses yeux ont alors l'é- 25.

25. clat du feu ; frotté sur le dos dans l'obscurité, donne des étincelles. Il miaule, met de l'accent dans sa voix pour exprimer ses affections ; aime la rapine ; fait la chasse aux oiseaux, levreaux, lapereaux, mulots, taupes, souris, chauvesouris, rats, crapauds, grenouilles, lézards, serpens, poissons, et autres animaux ; est patient, rusé, se tapit, feint de dormir pour mieux les surprendre ; se sert adroitement de ses pattes pour saisir sa proie, jouer avec elle, se défendre, frapper, atteindre ce qu'il desire. Il mange lentement, boit peu et en lapant. Ses excrémens sont corrosifs ; il les couvre soigneusement ; il aime les parfums, les plantes très-odorantes, sur-tout le *marum*, la *valériane*, la *cataire ;* les fait périr en se roulant dessus. Il est propre, adroit, souple, léger, curieux, jaloux, bruyant dans ses amours, hardi, ami de l'indépendance ; s'irrite, devient furieux contre ceux qui veulent le contraindre ; aime la campagne, les bois ; a une tendance à redevenir sauvage : il peut être longtemps sans manger. La femelle porte cinquante-six jours jusqu'à six petits, les cache pour que le mâle ne les dévore point. Le chat vit dix à douze

ans : sa peau fait des fourrures ; son poil sert dans la chapellerie. Celui du chat d'Angola est long, soyeux, blanc, noir, roux, fait des tricots légers, chauds. La chair du chat se mange. 25.

*ETAIN*, métal gris-blanc, odeur, saveur qui lui sont propres ; fait entendre un cri lorsqu'on le ploie ; il est très-fusible, moins dur, moins solide que le cuivre, moins ductile que le fer, peu malléable ; acquiert de la dureté, de la sonorité en le chauffant sans le fondre, dans la pousière de charbon, et l'y laissant refroidir ; un fil d'un dixième de pouce de diamètre porte 49 livres avant de rompre. L'étain est attaquable à quelques acides ; ne s'altère point à l'air ; fond au feu, s'y ternit à sa surface ; remué souvent, se change en poudre grise, ou oxide d'étain, qui augmente de poids ; c'est la *potée* que les fondeurs fripons enlèvent, comme *crasse*, avec la cendre ; mêlée avec du suif, du charbon en poudre, cette crasse redevient au feu de l'étain coulant, brillant. On empêche cette altération en le couvrant de cendre pendant qu'il est en fonte ; pur, il est sain et utile pour les usages domestiques ; sert à étamer le cuivre, le fer : en feuilles minces, il s'appli- 26.

que, à l'aide du mercure, sur le verre, pour faire les *miroirs*. La potée sert à polir, fait l'émail blanc de la faïance, des cadrans de montres. L'étain s'allie au plomb, et en prend les qualités inférieures; au cuivre qui en devient plus dur; au fer en copeaux qui en devient plus fusible; le fer alors lui communique de sa dureté. Il sert dans la teinture pour aviver les couleurs; mêlé au plomb pour faire les soudures communes. La province de Cornouailles, en Angleterre, est riche en mines d'étain. On pourroit peut-être en trouver en France dans les départemens du Finistère, des Côtes du Nord ou de la Manche.

26.

27. *PLOMB*, métal gris-bleuâtre, odeur, saveur marquées; moins solide, moins dur, moins ductile, moins fusible que l'étain, il est attaquable aux acides; avec le vinaigre, fait la céruse; se dissout dans le vin, en adoucit l'âpreté, et le rend un poison; on ne peut l'y découvrir sûrement que par l'évaporation. Il noircit à l'air, y résiste; au feu se change par l'action de l'air en une poudre grise, jaune ou *massicot*, rouge ou *minium*, en verre ou *litharge* qu'on emploie imprudemment pour vernisser la poterie com-

mune; cette poudre ou oxide de plomb, augmente de poids, se volatilise au feu; ses vapeurs s'attachent aux pâturages, aux plantes, aux fruits, à l'eau, et les rendent nuisibles et mortels, si on ne porte pas de prompts secours. Le plomb coulé en tables, laminé, sert à faire des tuyaux, des couvertures, des bassins; granulé, mis en balle, sert à la chasse, au combat. Un fil d'un dixième de pouce de diamètre porte 29 livres avant de rompre. On l'emploie dans quelques injections anatomiques; on en fait des empreintes, des bas-reliefs, des statues; fondu avec des métaux qui contiennent de l'argent, il l'entraîne avec lui; mêlé à l'étain, le rend malsain. Les mines de plomb sont abondantes en France, contiennent toutes de l'argent, deux, trois jusqu'à quinze onces par quintal. 27.

*Zinc*, substance métallique, d'un blanc bleuâtre, peu malléable, peut cependant se laminer, est moins fusible que le plomb, attaquable aux acides, noircit à l'air, y résiste, donne au feu une belle flamme, augmente de poids, s'y convertit en une fleur blanche légère; c'est l'oxide employé avec succès par les peintres; il ne 28.

jaunit point à l'air comme le blanc de
28. céruse. Il s'allie au cuivre rosette, qui devient laiton ; entre dans la matière des canons, peut être substitué à l'étain pour étamer les ustensiles de fer ou de cuivre. Ses mines sont abondantes, mais on ne l'en retire point en France à l'état de métal.

29. *Mercure*, *Vif-argent*, métal fluide, d'un blanc brillant : il devient solide, malléable à un froid de 32 degrés ; il est attaquable aux acides, non altérable à l'air ; on en fait les thermomètres, les baromètres ; agité dans un baromètre bien fait, le mercure dans l'obscurité, jette de la lumière. Il s'allie à presque tous les métaux, sert à appliquer l'étain sur les glaces ; l'or, l'argent sur le cuivre ; à séparer de leurs mines l'or, l'argent ; se volatilise à une petite chaleur ; dans les lieux fermés, ses vapeurs sont dangereuses. Le cinabre est la mine qui donne le mercure le plus pur. Le cinabre naturel ou artificiel est employé dans les arts.

30. *Crible*. On donne ce nom à quatre instrumens différens, tous destinés à nettoyer les grains.

1°. *Crible simple*, formé d'un cerceau portant un fond de peau de che-

val, d'âne ou de cochon ; percé de trous ronds, longs ou entremêlés, plus ou moins grands ; on le meut à la main, sur deux bâtons, ou suspendu. 30.

2°. *Crible à plan incliné.* Une trémie verse le grain par nappe sur un plan incliné, fait de fil d'archal, disposé paralélement dans le sens de la largeur. Le bon grain roule dessus, se rend au bas ; la poussière, le menu grain passent au travers, tombent sur une peau placée au-dessous.

3°. *Crible cylindrique.* Le grain passe d'une trémie dans un cylindre incliné en forme de bluteau, formé alternativement de feuilles de fer blanc percées comme une rape, et de fil d'archal. On le meut par une manivelle ; ses rapes nettoient la peau du grain ; les parties en fil d'archal laissent passer la poussière, le menu grain.

4°. *Crible à vent, Tarare.* Un axe portant huit ailes renfermées dans un tambour circulaire ouvert à son centre, est mis en mouvement par une manivelle, une roue dentée, et un pignon, pour déterminer un courant d'air. Le grain mis dans une trémie qui est au dessus, passe sur

30. un premier crible presque horizontal, de fil-d'archal, qui reçoit de la roue un trémoussement par l'effet d'un *va-et-vient*. La paille coule sur ce premier crible; le grain passe au travers, rencontre en tombant le courant d'air qui chasse la balle, les grains légers, la poussière hors de la machine. Le surplus tombe et coule sur un crible inférieur, en mailles de fer, incliné en sens contraire du premier : le menu, le mauvais grain, la terre que le vent n'a pu emporter, passent au travers, le bon grain roule dessus, se rend au bas. On change le premier crible, suivant la nature du grain, auquel on approprie la grandeur des mailles.

Le crible à vent nettoie, rafraîchit, dessèche le grain; il est préférable aux autres.

# PLUVIOSE, Ve. MOIS.

## *Mois des Pluies.*

*LAURÉOLE*, arbuste toujours verd, improprement appellé *mâle*, originaire des bois; feuillage d'une couleur agréable, fleur verdâtre qui dure une partie de l'hiver; ses baies en mûrissant sont noires, son écorce est souple, solide; toutes les parties de cet arbuste sont caustiques; il aime l'ombre, est cultivé dans les jardins. 1.

*MOUSSE*. Sous ce nom on comprend beaucoup de plantes de genres, d'espèces différens, dont les fleurs sont très-peu visibles. Les mousses sont très-petites, vivaces, toujours vertes, rampantes; leurs tiges sont délitées, flexibles, feuillées. La nature tend par-tout à couvrir de mousse la nudité et la dégradation des corps. Elles croissent sur la terre dont elles augmentent la quantité en se détruisant; sur les rochers qu'elles divisent, 2.

2. rendent fertiles; sur les vieux murs qu'elles dégradent; sur les arbres, à la végétation desquels elles nuisent; dans les réservoirs dont elles purifient l'eau, tant qu'elles végètent; dans les marécages dont elles élèvent le fond peu-à-peu, en se réduisant en terreau. Elles nuisent aux prairies, qu'on peut en purger par la cendre, la chaux éteinte à l'air, la herse à pointes de fer. La mousse à massue ou *lycopode* répand dans sa maturité une poussière abondante, jaune, très-inflammable; c'est le soufre végétal employé dans les spectacles, dans les feux d'artifice. La mousse sert dans la construction des cabanes, et à calfater; on l'emploie au transport des plantes; elle peut remplacer la bourre, le crin dans les meubles; la paille dans les lits, les fruitiers. Elle conserve l'humidité de la terre, abrite les semis contre le soleil, le froid, les grandes pluies; sert à caler sous l'eau les pierres des digues nourrit quelques animaux dans le Nord.

3. *FRAGON*, vulgairement *Petit houx*, plante vivace, ligneuse, toujours verte; originaire des bois; feuilles piquantes, fleurs sortant des feuilles, fruit d'un beau rouge: on mange ses

jeunes pousses, comme les asperges; on fait des balais de ses branches. 3.

*PERCE-NEIGE*, petite plante vivace, liliacée, bulbeuse; son nom lui vient de la précocité de ses fleurs; variété à fleurs doubles; cultivée dans les jardins. 4.

*TAUREAU*, quadrupède ruminant, à pied fourchu, le mâle de la vache, principalement destiné à la propagation de l'espèce. Un bon taureau a l'œil noir, le regard fier, le front ouvert, la tête courte, les cornes grosses et noires, les oreilles longues, velues, le mufle grand, le nez court, le cou charnu, les épaules larges, le dos droit, les jambes grosses, la queue longue, l'allure ferme, le poil roux; son mugissement est grave, sourd, prolongé, lugubre, plus fort que celui du bœuf. Il est indomptable, furieux dans le rut; la couleur rouge l'irrite; la castration dompte son caractère, lui ôte de son courage sans diminuer sa force, le soumet au joug; il travaille alors en esclave et s'engraisse: sa chair est inférieure à celle du bœuf; plus la castration du taureau est tardive, moins sa chair est bonne, et moins il perd de ses 5.

mœurs; on le dompte aussi en lui supprimant les cornes.

5.

6. *LAURIER-THYM*, espèce de viorne, arbuste toujours verd du midi de la France, cultivé dans les jardins. Il craint les grands froids, y résiste mieux à l'ombre; ses fleurs blanches en ombelle durent une partie de l'hiver. Il a trois variétés, feuilles luisantes et lisses, feuilles très-velues, feuilles panachées.

7. *AMADOUVIER*, sorte de champignon parasite, vivace, qui croît sur différens arbres. Sa partie molle intérieure, bouillie dans l'eau avec du nitre, battue pour l'assouplir, séchée, frottée dans de la poudre à tirer, fait l'amadou pour le briquet. Il arrête le sang des blessures; celui de chêne, nommé *agaric*, est préférable pour cet usage, et peut suppléer à la noix de galle dans la teinture.

8. *MEZEREUM*, *Bois joli*, arbuste des forêts, improprement appellé *Lauréole femelle*; cultivé dans les jardins; donne en hiver, avant les feuilles, des fleurs blanches ou rouges, odorantes, adhérentes aux rameaux. Toutes les parties de cet arbuste sont caustiques; il se multiplie de graines;

JOURS

semées en automne au moment de leur maturité, elles lèvent promptement. Elles peuvent se conserver dans la mousse, le sable, la terre, jusqu'au printemps; sont alors plus lentes à lever. 8.

*PEUPLIER;* grand, moyen ou petit arbre suivant les espèces, dont plusieurs naturelles en France; et un plus grand nombre d'étrangères naturalisées. Le peuplier est propre aux lieux humides ou inondés; croît vîte se multiplie de boutures; son bois, plus ou moins tendre, sert à la menuiserie et à plusieurs usages économiques; les feuilles font un bon fourrage. Les bourgeons du peuplier noir fournissent une gomme-résine d'une odeur agréable. Le peuplier de Hollande ou l'*ypréau*, est préférable aux autres sous tous les rapports, acquiert une grande hauteur, croît dans les terreins humides ou secs. 9.

*COIGNÉE*, instrument tranchant du bûcheron; son fer qui n'est point arrondi comme celui de la hache, est moins large, et plus long; le manche de la coignée doit être long, afin d'augmenter la force du coup, et d'atteindre de plus loin. 10.

*ELLÉBORE.* Sous ce nom l'on 11.

compte quatre espèces de plantes vi-
11. vaces, d'usage en médecine. La pre-
mière, petite, donne en nivôse une
fleur jaune : la deuxième donne à la
même époque une grande fleur rose
qui blanchit en s'épanouissant, se
conserve dans l'eau : elle est nom-
mée *rose d'hiver* ou *ellébore noir* ;
c'est la plus belle fleur de la sai-
son : la troisième donne en ventôse
une fleur verte : la quatrième nom-
mée *pied-de-griffon*, a une odeur fé-
tide, donne en automne une fleur
verdâtre. La seconde et la quatrième
sont sur-tout cultivées dans les jar-
dins.

12. *Brocoli*, plante potagère, bisan-
nuelle, voisine du chou-fleur, qui
se mange crue, cuite, confite : on
en compte quatre variétés ; la blanche,
préférable aux autres, donne au prin-
temps une pomme grosse comme
celle du chou-fleur. La variété vio-
lette, la rougeâtre et la verte pous-
sent aux aisselles des feuilles, des
drageons tendres, succulens, et quel-
quefois fructifient comme la blanche.
Le brocoli semé en prairial, est bon
à la fin de l'automne, en hiver et
au printemps.

13. *Laurier franc*, petit arbre tou-

jours verd, originaire d'Asie, naturalisé dans le midi de la France; craint le grand froid. Toutes ses parties sont très-aromatiques; les feuilles assaisonnent les alimens; la peau des graines ou baies donne une huile essentielle; leur amande donne par expression une huile grasse. Les graines se rancissent aisément, perdent alors la faculté de germer. Son bois est dur; on en connoît des variétés à feuilles étroites, à feuilles plus ou moins ondulées. Le laurier est la récompense des vertus militaires, des grands talens, comme le chêne est décerné aux vertus civiques. 13.

*AVELINIER*, variété du noisettier, à gros fruit presque rond, dont l'amande est d'une saveur agréable; on en fait des dragées; elle fournit une huile douce. L'avelinier est cultivé; il croît aisément. 14.

*VACHE*, la femelle du taureau; ses cornes sont plus minces, son ventre plus ample, ses cuisses plus petites. Jeune, elle s'appelle *génisse*; peut être couverte à trois ans, porte neuf mois. Sa principale utilité est dans le produit de son lait. Une bonne vache a la peau mince, douce, les jambes courtes, fortes, le pis (les mamelles) volumi- 15.

15. neux, souple; les mamelons égaux et à pleines mains. Grasse, elle ne donne plus de lait. La conservation des bonnes espèces dépend du choix du taureau. Sa meilleure nourriture est la luzerne, le sainfoin non mouillés, les racines, la paille d'avoine, la farine de fèves, le son, la plante sèche du pois chiche, et souvent du sel. On la trait deux fois le jour. Le bon lait est d'un beau blanc; une goutte mise sur l'ongle, reste ronde sans couler; le lait bleuâtre est de médiocre qualité: on retire du lait la crême dont on fait le beurre par le battage: le lait caillé mis dans des formes, donne du fromage; il reste un petit lait et un sucre de lait qui s'attache à la longue aux vases de bois dont on se sert. La vache peut travailler au chariot, à la charrue; elle donne alors moins de lait. Transportée d'un pâturage excellent dans un moindre, elle dépérit: le grand froid comme la grande chaleur l'incommode: elle cesse de porter à dix ans; alors on l'engraisse, mais plus facilement lorsqu'elle est pleine. Laissée à la nature, elle vit jusqu'à quinze ans; sa bourre, son cuir, ses cornes sont employés; sa chair est bonne à manger; son fumier

est un bon engrais, sur-tout dans les terres sèches et légères. 15.

En se léchant, les vaches enlèvent leur poil, l'avalent ; il reste dans leur panse sous forme de pelotes nommées *égagropiles*.

*Buis*, *Bouis*, arbrisseau toujours verd des forêts, des montagnes ; bois très-dur ; mis dans l'eau s'enfonce ; est fort employé dans les arts ; celui des pays chauds est plus facile à travailler ; les nœuds, bourlets ou tubérosités qui se forment sur la tige, sont recherchés des tourneurs, des luthiers, des tabletiers ; on le coupe en automne. ses variétés sont, le nain pour faire les bordures des jardins, celui à feuilles panachées, celui à feuilles étroites. 16.

*Lichen*. Sous ce nom on comprend plus de cent espèces de plantes, et un plus grand nombre de variétés : la plupart des lichens sont petits, parasites, vivaces, d'une consistance coriace, membraneuse, de couleur grisâtre. Les uns s'attachent aux rochers, y forment par leur destruction la première couche de terreau qui les prépare, après des siècles, à recevoir d'autres plantes ; d'autres vivent sur les arbres qu'ils font périr à la longue en obstruant leurs pores ; ils croissent 17.

rapidement sur ceux qui sont privés
17. d'air, de soleil, ou qui sont languissans. On confond mal-à-propos les lichens avec les mousses. Plusieurs espèces pulvérisées, mêlées avec de la chaux, arrosées d'urine, sont réduites en une pâte nommée *orseille*, qui fournit à la teinture une couleur rouge; c'est un objet de commerce dans le Puy-de-Dôme et les départemens voisins. Un lichen d'Islande donne une gelée nourrissante. Le renne, quadrupède du Nord, se nourrit de lichens.

18. *If*, arbre toujours verd, couleur foncée, feuille petite, étroite; ses fruits ou baies d'un beau rouge transparent dont le noyau n'est recouvert qu'en partie, durent une portion de l'hiver; la saveur de leur pulpe est douce, leur noyau amer. Cet arbre croît lentement, est touffu, excellent pour les haies, se tond avec succès; son bois est dur, flexible, élastique, fendant, veiné de rouge; reçoit le poli, se tourmente beaucoup, perd ce défaut par un long séjour dans l'eau, dans la vase; sert dans les arts. Les oiseleurs font de l'écorce une glue pour la pipée. Il y a une variété panachée.

19. *Pulmonaire*, plante vivace des bois,

bois, feuille ordinairement tachée de blanc, fleur violette ou blanche, assez agréable pour être cultivée dans les jardins. 19.

*SERPETTE*, instrument tranchant, de différente grandeur, courbé à son extrêmité, servant à tailler les arbres; son manche droit, terminé en crochet, doit être assez long pour placer la main entière. Fait en corne de cerf, il est plus solide, mieux en main. La serpette fermant à ressort, celui-ci doit être plus court que le manche, afin que le bas de la lame soit pris dedans. 20.

*THLASPI*, *Taraspic*; quatre espèces cultivées dans les jardins; la première vivace, toujours verte, ligneuse, originaire de Sicile; fleur blanche crucifère qui dure tout l'hiver, demande à être abritée: la seconde vivace, toujours verte, ligneuse, plus basse, reste en pleine terre; donne au printemps une fleur blanche: la troisième, annuelle, à fleur blanche ou gris-de-lin: la quatrième, annuelle, à fleur violette ou blanche: ces deux dernières durent en fleur jusqu'à l'arrière-saison. 21.

*THYMÉLÉE DES ALPES*, arbuste rampant, toujours verd, fleur pour- 22

22. pre, en ombelle, odeur très-suave, paroissant deux fois l'an; se cultive dans les jardins, aime l'ombre. Toute la plante est caustique: il y a une variété rare, à fleur blanche.

23. *CHIENDENT*, plante vivace graminée. Sa racine traçante, noueuse, est d'une saveur douce, sucrée. Lavée, séchée, broyée, mise sous forme de pain, elle peut servir de nourriture. Cette plante est printanière, nourrit les animaux; les chiens la mangent pour vomir; elle multiplie beaucoup, nuit aux terres, est difficile à détruire. Le hersage fréquent avec des herses à dents de fer, longues, courbées, rapprochées, minces, et les labours au crochet, sont les moyens de l'extirper. On doit la brûler. On confond cette plante avec plusieurs autres *graminées*; souvent on donne son nom à cette *famille*.

24. *TRAINASSE*, *Renoué*, plante annuelle des champs et des bords des chemins; fleurs peu visibles, graines nombreuses, petites, lourdes, de la nature de celle du sarrasin. Cette plante multiplie beaucoup, nuit aux terres; la prompte maturité de ses graines exige qu'on la sarcle de bonne heure; elle

fournit au printemps une pâture pour les moutons. 24.

*LIÈVRE*, quadrupède sauvage de la famille des rongeurs. Poil roux, oreilles longues, narines toujours en mouvement, odorat fin, jambes de derrière longues, queue courte. Cet animal ne terre point, ne sort pas du canton qu'il a adopté, y revient quand on l'en chasse; il est peureux, dort les yeux ouverts, sort la nuit, court rapidement; la femelle nommée *hâze*, peut engendrer à un an, porte trente jours, met bas trois ou quatre petits nommés *levreaux*. Le lièvre se nourrit des jeunes branches, de l'écorce, des racines des arbres, dévaste les champs; sa peau fait des fourrures, son poil sert dans la chapellerie : sa chair est noire, délicate, meilleure dans les terres sèches, montueuses; celle du levreau est préférée. Le lièvre est plus fort dans les pays froids; son poil y blanchit dans l'hiver. 25.

*GUÈDE*, *Pastel*, *Vouède*, plante bisannuelle, sauvage, cultivée. Elle fournit une pâture aux moutons dès le printemps; ses feuilles préparées donnent un bleu qui remplace l'indigo pour la teinture; les objets qui sortent d'une cuve de guède 26.

sont verds, ils deviennent bleus à
26. l'air. On la sème au printemps, dans les terres légères, fertiles, profondes; elle réussit dans les terres nouvellement desséchées bien exposées; on la sarcle, on l'éclaircit; lorsque sa feuille jaunit, on la coupe, ce qui se répète jusqu'à quatre fois; légèrement fanée, on la réduit en pâte dans un moulin à huile; l'on en fait des pelotes, qu'on fait sécher et qu'on vend aux teinturiers sous le nom de pastel en coque.

27. *NOISETTIER*, *Coudrier*, arbrisseau des bois, à chaton; croît avec succès dans les terres légères, sablonneuses; fruit oblong, rond; son amande à pellicule blanche ou rouge, d'une saveur agréable, fournit une huile très-douce et recherchée; les Chinois en mettent dans le thé qu'ils boivent. Les rejets longs, unis, flexibles, droits du noisettier, fournissent des baguettes pour faire des supports de lignes; on en fait des faussets, des harts, cercles, claies. Son bois est utile dans la menuiserie, l'ébénisterie, la vannerie; réduit en charbon, est recherché pour la poudre à tirer.

28. *CYCLAMEN*, *Pain de pourceau*, plante vivace, feuilles agréablement

veinées; fleurs élégantes, pendantes, redressées par leurs extrêmités; racines charnues, grosses, applaties, dont les sangliers et les cochons se nourrissent; de-là vient son nom; ces racines donnent une fécule nutritive. Sa graine doit être semée au moment de sa maturité. On en cultive plusieurs espèces et variétés, automnales ou printanières, à fleurs rouges, roses ou blanches; une de celles-ci est très-odorante. 28.

*CHÉLIDOINE*, *Éclaire*, plante vivace qui croît sur les murs, dans les mauvaises terres. Elle contient un suc corrosif, d'un jaune orangé; ses fleurs sont jaunes, ses graines petites, nombreuses. 29.

*TRAINEAU*, voiture sans roue portée sur deux patins, ou même sans patin; à fond plat ou arrondi en demi-cylindre, relevé sur le devant par une courbure en coquille, à laquelle on attèle un ou plusieurs chevaux. Dans quelques contrées du Nord on y attèle des rennes ou des chiens qui sont attachés au cou par un seul trait passé entre leurs jambes et fixé immédiatement au traîneau sans timon ni limonnière. Cette voiture est basse, se charge 30.

et se décharge très-aisément. Elle sert aux transports et aux voyages sur la neige, la glace, et dans les lieux rocailleux qui seroient impraticables pour des voitures à roues.

La caisse d'une voiture ordinaire mise sur deux patins, devient un traîneau commode pour de longs voyages.

## VENTOSE, VIe. MOIS.

*Mois des Vents.*

1. *TUSSILAGE*, *Pas-d'âne*, plante vivace, traçante, des lieux frais, des terres fortes; fleurs jaunes qui paroissent avant les feuilles: celles-ci sont très-grandes; les moutons s'en nourrissent.

2. *CORNOUILLER A GROS FRUIT*, petit arbre des bois; cultivé, fait de bonnes haies, se tond bien; fleurs jaunes, abondantes, recherchées des abeilles: elles paroissent avant les feuilles; fruit rouge à noyau, quelquefois jaune, acidule, de la forme d'une pe-

tite olive ; mûr, il se mange cru, confit ; est mêlé à d'autres fruits pour faire des boissons fermentées. On s'en sert pour perfectionner le cidre et le poiré ; l'amande du noyau donne de l'huile. Le bois du cornouiller est noueux et très-dur ; on en fait les échelons d'échelles, les roulons de ridelles de charrettes, des brochettes à percer les viandes, des faussets qui sont préférables à ceux de bois mous. 2.

Il y a un *cornouiller* nommé *sanguin des bois*, plus petit, à fleurs blanches, baies noirâtres, rondes, donnant une huile à brûler. L'écorce des branches est, l'hiver, d'un beau rouge. Il a une variété à feuille panachée.

Ces deux arbres croissent dans tous les terreins : les moutons, les chevaux mangent leurs feuilles.

*VIOLIER*, *Giroflée jaune*, plante vivace, presque ligneuse, croît sur les murailles ; ses fleurs jaunes, très-odorantes, fournissent aux abeilles une de leurs premières récoltes ; il y en a à fleurs plus ou moins doubles, à fleurs panachées ; ses graines peuvent fournir de l'huile. 3.

*TROÊNE*, arbrisseau des bois, presque toujours verd ; fleurs blanches en 4.

bouquet ; baies noires, qui fournis-
4. sent aux arts une couleur bleuâtre ; branches flexibles ; employé par les vanniers. On en fait des haies, des palissades, des massifs pour retenir les terres en pente ; il se tond bien, et refleurit après. Les bestiaux mangent ses feuilles. Il y a des variétés à fruit blanc, à feuilles panachées.

5. *Bouc*, quadrupède ruminant, originaire des montagnes du Levant, le mâle de la chèvre, avec ou sans cornes, barbe au menton, n'ayant point de dents incisives supérieures. Il aime à grimper, enlève l'écorce des arbres, mange les jeunes branches, les lichens : il doit rester à l'attache, ou être relégué dans les montagnes. Cet animal est chaud, fécond, engendre à deux ans, exhale une odeur qui vicie l'air au lieu de le purifier, comme on le croit ; elle diminue par la castration. Il vit jusqu'à douze ans. Son poil fait des cannelots et différens autres tissus. Sa peau serrée égale celle du daim : on en fait des outres pour contenir des liqueurs. Sa chair se mange ; le suif qu'il fournit, fait une chandelle excellente. Le bouc d'Angora doit être préféré à raison de son poil long, argenté, soyeux, dont on

fait les plus beaux camelots et d'autres étoffes ; son éducation doit être encouragée. 5.

*AZARET*, *Cabaret*, *Oreille-d'homme*, plante vivace des bois, odeur piquante, fleur noirâtre : connue seulement en médecine. 6.

*ALATERNE*, arbrisseau toujours verd des collines du sud de la France ; craint le grand froid. Ses baies fournissent un verd de vessie ; son bois est dur, jaune. Plusieurs variétés à grandes, à petites feuilles, à feuilles panachées de jaune, à feuilles bordées de blanc (celle-ci délicate), à feuilles dentées ou *de Montpellier*. Il demande un terrein sec ; cultivé à l'ombre, résiste mieux au froid : on le confond souvent avec le *phillirea*, dont il diffère par ses feuilles *alternes*. 7.

*VIOLETTE*, plante vivace des bois, traçante, cultivée, donne au printemps, en automne, une fleur d'une odeur suave, dont on fait un sirop de couleur violette : ce sirop étendu d'eau, sert à reconnoître la présence d'un alkali ou d'un acide ; il verdit en y mettant de la soude, de la potasse, de l'ammoniac ou de la chaux ; il rougit en y mettant du 8.

8. vinaigre, de l'eau-forte, ou tout autre acide. La violette sert aussi à parfumer, colorer quelques liqueurs. Les départemens méridionaux en font un commerce assez considérable avec le Levant; on en fait une infusion agréable et des conserves : elle fournit des variétés rouges, blanches, panachées, et d'un violet clair.

9. *MARSAULT*, *Osier noir*; arbre moyen, espèce de saule; croît promptement dans les lieux aquatiques et dans les lieux secs; fait de bonnes haies, des taillis. Ses fleurs nombreuses, très-printanières, fournissent aux abeilles du miel, de la cire. Ses feuilles sont mangées par les animaux, ses branches employées par le vannier; son écorce sert de tan en Laponie; son bois blanc, moins tendre que celui du saule ordinaire, refendu, fait des échalas; pour les empêcher de se courber, on les lie en bottes; on les garde dans un lieu sec pendant un an.

10. *BÈCHE*, outil employé à travailler la terre, sur-tout dans les jardins. La bèche varie par ses formes, ses dimensions : elle est composée, 1°. d'un fer, ou lame acérée, de dix à quinze pouces de long, de huit à dix de large,

10.

terminée par une douille ronde, ou par deux lames ou oreilles d'environ six pouces, percées chacune de deux trous; 2°. d'un manche de bois de frêne, d'érable, long de deux à trois pieds, terminé quelquefois par une béquille, ou une main : ce manche est reçu dans la douille, ou fixé entre les deux oreilles de la lame de fer, par deux rivets qui le traversent. Quelquefois le manche se termine par un pellon en bois, dont le bout en coin arrondi est fixé entre deux lames de fer renflées et soudées sur les côtés qui font la partie supérieure du tranchant de la bèche : cette manière est imparfaite. Pour introduire la bèche dans la terre, on met le pied sur la tranche de la lame qu'on fortifie en y ajoutant un dosseret large de quelques lignes : ce dosseret au lieu de se fixer à la lame, fait une pièce détachée qui s'enfile par un anneau dans le manche, sans descendre jusqu'à la lame. Cette disposition permet de labourer plus profondément. La bèche moins expéditive que la *charrue*, travaille mieux la terre; la *houe* plus expéditive que la bèche, fatigue davantage l'ouvrier; le *crochet* qui remplace la houe dans les terreins pierreux,

difficiles à labourer, ménage les racines des plantes ; la *fourche* à dents larges, ou *trident*, remplace la bèche pour la position de l'ouvrier, et le crochet par son emploi.

10.

11. *NARCISSE ;* on en distingue surtout quatre espèces, et leurs variétés cultivées dans les jardins ; toutes, plantes bulbeuses, vivaces, odorantes ; deux naturelles en France, deux étrangères naturalisées. La première, *Narcisse* des poëtes, ou *Jeannette*, est à fleurs blanches, grandes, solitaires, simples ou doubles ; la seconde, *Narcisse* commun, *Aillau*, *Porion*, à fleurs jaunes, grandes, solitaires, simples ou doubles ; la troisième, *Narcisse de Constantinople à bouquets*, petites fleurs jaunâtres rassemblées ; la quatrième, *Narcisse Tasette*, fleurs blanches rassemblées, originaire du sud de l'Europe. Le narcisse croît même dans l'eau ; est cultivé dans l'intérieur des maisons. La Hollande en fournit plusieurs variétés à bouquet.

12. *ORME*, grand arbre, originaire du nord de l'Europe, croît dans tous les terreins secs ; le bois y est meilleur ; son intérieur s'altère lorsqu'on l'étête pour le planter. On lui fait tort lorsqu'on attend pour l'élaguer que ses

branches soient trop fortes. Son feuillage est d'un verd foncé ; les animaux s'en nourrissent ; son bois sert dans la marine, le charronnage, la menuiserie ; on en fait des cercles de cuves, des affûts, des tuyaux de conduite, des pompes : il se tourmente à l'air, se conserve long-temps sous l'eau, sous terre ; fournit un bon chauffage, un bon charbon, des cendres riches en potasse. Le bois de l'orme *Teille* est cassant : ses feuilles sont larges : celui de l'orme de Hollande est léger, médiocre : son écorce est fongueuse. Le bois de l'orme tortillard est excellent pour les moyeux des roues : cette dernière espèce, qui croît vîte, multipliée de graine, ne cesse pas d'être tortillard. L'Amérique septentrionale fournit un orme appellé *bois de fer*, à cause de sa dureté ; il mérite d'être cultivé et multiplié en France. 12.

*FUMETERRE ;* deux espèces principales, parmi cinq plantes indigènes ; l'une à racines bulbeuses, vivaces, croît au nord de la France, dans les bois ; elle fournit des variétés agréables par leurs fleurs ; l'autre espèce annuelle se trouve dans les champs, les jardins, est usitée en médecine. 13.

*VELAR, Tortèle*, plante annuelle 14.

médicinale ; croît près des lieux habités.

14.

*CHÈVRE*, quadrupède, femelle du bouc, originaire du Levant. Vive, légère, elle aime à grimper, fait du tort aux arbres, en arrachant leurs écorces et broutant leurs jeunes pousses ; elle vit douze ans, porte cinq mois, met bas un, plus souvent deux chevreaux ; fournit un lait abondant, savoureux, dont on fait des fromages : ceux du Mont-d'Or sont renommés. On la trait deux fois le jour, est bonne nourrice, allaite volontiers les enfans, s'attache à eux, accourt à leurs cris, prend garde de les blesser : elle craint les grands froids, doit être tenue à l'attache, ou reléguée dans les montagnes. Sa chair se mange fraîche ou salée, préférée à celle du bouc : son poil, sa peau, son suif sont recherchés. La chèvre d'Angola mérite d'être multipliée pour la beauté, l'utilité de son poil.

15.

*ÉPINARD*, plante annuelle, cultivée depuis environ deux siècles ; se sème dans toutes les saisons ; les pieds femelles portent la graine, les pieds mâles n'en portent pas ; mal à propos ces derniers sont appellés femelles. Variétés à feuilles plus ou moins

16.

grandes, charnues, semence épineuse ou non. Ses feuilles se mangent cuites. 16.

*DORONIC*, plante vivace des montagnes; grande fleur dorée; d'usage en médecine. On confond sous ce nom différentes espèces de plantes. 17.

*MOURON*, *Morgeline*, plante annuelle des lieux cultivés, grène promptement, doit être sarclée de bonne heure, se reproduit quatre à cinq fois dans la même année, sert à nourrir les oiseaux, se mange en salade; sa saveur douce approche de celle de la mâche. 18.

*CERFEUIL*, plante annuelle, cultivée; se sème toute l'année; ses feuilles se mangent en salade, servent d'assaisonnement. Le cerfeuil musqué, vivace, cultivé, originaire d'Italie, a un parfum qui approche de celui de l'anis; ses graines vertes, hachées servent dans les salades, se sèment avec plus de succès à la fin de l'été ou en automne; les bestiaux, les lapins mangent les feuilles de ces deux espèces. 19.

*CORDEAU*. A l'aide du cordeau tendu par des piquets, le jardinier aligne ses plantations, ses allées, prend des distances, mène des perpendiculaires, des parallèles, rapporte 20.

20. des angles, fait des figures régulières, rectilignes ou curvilignes, trace des cercles, des portions de cercle, des ovales : cet instrument peut suffire à toutes les opérations géométriques dont il a besoin; c'est à la fois sa règle et son compas.

Dans une plantation étendue, le jardinier fait moitié moins de chemin, gagne du temps, fait plus d'ouvrage et le fait mieux, en employant deux cordeaux à la fois.

Il les place sur les deux premières lignes, plante la première et porte le bout du premier cordeau sur la troisième.

Il revient par la seconde ligne en plantant, porte l'autre bout du premier cordeau sur la troisième, et le bout du second sur la quatrième.

Il plante la troisième ligne, porte le bout du cordeau de la troisième à la cinquième, et le bout de l'autre cordeau de la seconde à la quatrième.

Il plante la quatrième et ainsi de suite.

A chaque fois il plante une ligne; arrivé à son extrêmité, il termine l'alignement d'un des cordeaux dans la ligne suivante et commence l'alignement de l'autre cordeau.

*MANDRAGORE*, plante vivace, originaire du sud de l'Europe, d'une odeur désagréable; fleur assez grande, placée près de terre; racines très-grosses, qui donneroient une fécule nutritive après avoir été bien lavées. Cette plante a long-temps servi aux charlatans pour abuser de la crédulité des ignorans. 21.

*PERSIL*, plante bisannuelle, potagère, originaire de Sardaigne; graine aromatique. Ses feuilles, agréablement découpées, se mangent crues, cuites, servent d'assaisonnement; séchées, se conservent pour l'hiver. On le cultive en grand; les mouton qui en mangent trois ou quatre fois par décade, sont préservés du tac: on le cultive en grand pour cet usage. les lièvres, les lapins en sont friands. Il y a des variétés de persil à feuilles grandes, petites, frisées, panachées, à grosses racines. Cette dernière semée claire, acquiert la grosseur d'une petite carotte, et fournit un aliment sain et agréable. 22.

*COCHLÉARIA*, plante bisannuelle des lieux ombragés; saveur piquante, utile au marin contre le scorbut. Elle est abondante dans le Nord. 23.

*PAQUERETTE*, petite plante vi- 24.

vace des prairies; fleur jaune à son
24. centre, blanche à sa circonférence, rouge en dessous, simple ou double; on en cultive dans les jardins des variétés doubles de différentes couleurs, qui dégénèrent par une culture négligée.

25. *THON*, poisson de mer à grandes écailles recouvertes d'une peau mince, museau pointu, épais; mâchoires garnies de dents aiguës, serrées; yeux grands, saillans; dos noirâtre. Il vient par troupes, au printemps, de l'Océan dans la Méditerranée; poursuit les sardines dont il est friand; suit les vaisseaux, se montre sur les côtes d'Espagne, de France, de Sardaigne, de Sicile, d'Italie, de Grèce; se rend par les Dardanelles dans la mer Noire; son retour se fait en automne. On le pêche dans ces deux saisons, sur les côtes de l'Océan, à la ligne, sans autre appât qu'un linge figurant une sardine; sur la Méditerranée, aux filets.

Des compagnies de pêcheurs établissent à quelques lieues des côtes de France, de gros filets fixés, soutenus par des ancres, des bouées, en forment de vastes enceintes divisées chacune en plusieurs parties, qui-

conduisent par plusieurs détours à un filet placé horizontalement sous l'eau, et bien amarré : c'est le *corpou*. Chaque enceinte est appellée *madrague* (c'est-à-dire, *parc*).

25.

Un chef placé dans une barque à la tête de la madrague, observe, donne le signal, dirige la manœuvre.

Les thons entrent en foule dans ce labyrinthe et ne peuvent plus en sortir. Rendus dans le *corpou*, les matelots tous ensemble soulèvent le filet hors de l'eau, saisissent les poissons, les retournent sur l'eau pour leur ôter leur force. Quelques-uns pèsent plus de 200 livres.

On les vuide, on les coupe par tronçons, on les fait rôtir sur de grands grils de fer, ou on les fait frire dans l'huile d'olive, on les assaisonne, on les encaque avec de l'huile nouvelle et un peu de vinaigre.

Ce poisson est moins rusé, plus huileux sur l'Océan, maigre sur les côtes de Sardaigne, meilleur sur celles de France; gras, mais d'une saveur fade sur la mer Noire : sa chair est ferme, agréable, ressemble dans quelques parties à celle du veau, se transporte au loin, fait un objet de commerce.

26. *PISSENLIT*, plante vivace, laiteuse; multiplie beaucoup par ses graines à aigrettes, que le vent disperse : ses racines longues, charnues, difficiles à détruire, se mangent, ainsi que ses feuilles, en salade, ou blanchies comme celles de la chicorée sauvage auxquelles elles ressemblent. Cette plante est saine pour les bestiaux.

27. *SYLVIE*, espèce d'anémone; plante vivace des bois, printanière; variétés à fleurs blanches, couleur de chair, doubles; cette dernière cultivée dans les jardins. Les bestiaux la mangent.

28. *CAPILLAIRE*. Sous ce nom on connoît trois espèces de plantes vivaces de la famille des fougères; le capillaire noir, celui de Montpellier, celui de Canada; le second est employé en sirop : leur fructification est sous leurs feuilles.

29. *FRÊNE*, grand arbre des lieux humides, dans lesquels sa croissance est rapide; il croît aussi dans les lieux secs; ses feuilles fournissent une bonne nourriture pour les bestiaux, se conservent pour l'hiver dans des tonneaux, avec du sel, de l'eau. Son bois solide, dur, élastique, bon pour la charpente, la menuiserie, est ex-

cellent pour le charronnage ; préférable pour les essieux, les rames ; fait de bons assemblages, de bons manches d'outils, ne se tourmente pas, sert au chauffage. Son écorce infusée dans l'eau, la rend bleue, sert à teindre les filets. On fait des plantations de frêne destinées à être étêtées à la manière du saule. Une espèce donne au printemps des fleurs agréables ; le frêne de Calabre produit la manne. L'Amérique septentrionale fournit plusieurs espèces qui réussissent en France, notamment le frêne à feuille de noyer, à feuille simple, à feuille large. 29.

*PLANTOIR*, outil de jardinier : c'est un bâton de bois dur, recourbé par un bout pour l'empoigner, pointu par l'autre, et quelquefois revêtu de fer ; il sert à planter ; son usage est expéditif, mais mauvais dans les terres fortes pour les plantes délicates, en ce qu'il rassemble leurs racines en un tas, tandis que pour prospérer elles doivent être étendues et séparées. 30.

# GERMINAL, VII^e. MOIS.

*Mois de la Reproduction de la Terre.*

1. PRIMEVÈRE, *Primerole*, plante vivace, basse, à tiges ou sans tiges; ses fleurs odorantes sont à bord plan ou concave, simples ou doubles, de couleurs diverses. Un grand nombre de variétés sont cultivées dans les jardins. Ses feuilles se mangent cuites; ses fleurs parfument le vin, et ses racines la bière: les moutons mangent la plante.

2. *PLATANE*, grand arbre de l'Amérique septentrionale; deux espèces naturalisées en France, l'une *du Levant*, l'autre d'*Occident* (de l'Amérique septentrionale); leurs feuilles grandes, d'un beau verd, pourrissent difficilement sur terre; leur écorce unie se détache tous les ans par plaques; leur bois de bonne qualité ressemble à celui du hêtre. Le platane du Levant aime l'humidité, croît aussi dans les lieux secs; le soleil n'altère point ses feuilles;

son ombre est très-épaisse ; son bois sert dans l'Orient à la construction des vaisseaux ; il offre deux variétés principales. Celui d'Occident, plus grand, préfère les terreins les plus humides ; ses feuilles sont plus larges, moins découpées, abondantes ; succulentes lorsqu'elles sont jeunes, elles fourniroient une nourriture précieuse pour les bestiaux : on en a remarqué une variété noueuse, propre à faire des moyeux et d'autres objets de charronnage. 2.

*ASPERGE*, plante vivace des lieux sablonneux ; deux variétés cultivées, la commune et la grosse ; les pousses se mangent ; cuites à la vapeur de l'eau-bouillante, elles conservent plus de saveur. On peut s'en procurer pendant long-temps. La grosse porte différens noms, suivant les lieux d'où elle vient. La racine de l'asperge pourrit aisément dès qu'elle ne végète plus ; on prévient le mal en ôtant en automne une partie de la terre dont on la recouvre au printemps, pour avoir les pousses plus longues. Les bestiaux mangent la plante. 3.

*TULIPE* ; deux espèces, vivaces, bulbeuses ; l'une petite, à fleurs très-odorantes, peu cultivée ; l'autre ori- 4.

ginaire d'Asie, naturalisée depuis
4. 1559, a donné par les semis un très-grand nombre de variétés simples ou doubles, riches en couleur; elles se multiplient par les caïeux, ne se panachent qu'après plusieurs années, et dégénèrent en vieillissant.

5. *POULE*, femelle du coq, originaire de l'Inde; le plus utile des oiseaux de basse-cour; ses variétés sont à plume lisse ou frisée, à crête ou huppée, à queue ou sans queue, peau blanche ou noire, grande ou petite; plumage de différentes couleurs. La poule craint l'humidité, a la vue perçante, mue tous les ans; elle caquète avant de pondre, chante après; glousse lorsqu'elle veut couver ou rassembler ses petits; se nourrit d'herbages, de grain. L'avoine, le sarrasin, le chenevis l'excitent à la ponte. Elle aime les vers de terre, les insectes; est redoutable aux abeilles; se plaît dans le sable, en avale des grains; le manque d'eau lui donne la pépie; la mal-propreté l'expose à la vermine qu'on détruit par le poivre. Une bonne poule pond dans la belle saison tous les jours une fois, rarement deux; tenue dans un lieu chaud, obscur, tranquille, elle peut pondre toute l'année, excepté pendant

la

la mue ; le froid diminue la ponte ; quelques grains de sel de temps à autre l'accélèrent. Les œufs de fructidor, vendémiaire, se gardent plus long-temps. On les conserve dans l'eau, la graisse, le son, la cendre, et aussi en les couvrant d'un enduit de gomme, de cire, d'huile, de vernis. L'œuf est très-nourrissant ; sa glaire est employée dans les arts pour clarifier, lutter. Si la poule a reçu l'approche du coq, ses œufs sont bons à couver. Une poule peut couver de douze à dix-huit œufs ; après vingt-un jours, le *poussin* sort de l'œuf. La même poule peut conduire plusieurs couvées, soigne avec tendresse ses petits, les défend avec courage, leur montre leurs alimens et les divise, les réchauffe sous ses ailes. Les jeunes coqs coupés font les *chapons* qu'on engraisse, et qu'on peut employer à couver des œufs, ou conduire des poussins. La poule coupée s'engraisse, prend le nom de *poularde ;* sa plume, sa chair sont employées. 5.

On peut faire éclore les poulets sans le secours de la poule, en mettant les œufs à une chaleur de trente-deux degrés et demi, dans du fumier, des fours, des étuves, au bain-marie, ou

à la vapeur de l'eau, ce qui est préférable; mais ces moyens ne valent pas la chaleur naturelle.

5. La poule de Caux, haute sur pattes, avec le coq ordinaire, fournit une meilleure race pour la chair et la ponte.

6. *BLETTE*, plante annuelle, originaire d'Amérique; deux espèces, la blanche, la rouge : les feuilles se mangent cuites à la manière des épinards.

7. *BOULEAU*, grand arbre des forêts, commun dans les montagnes et dans le Nord; croît vîte dans les terreins humides, sablonneux. Dans le Nord, avant la sortie des feuilles au printemps, on retire du bouleau noir, par une incision verticale, une *eau limpide*, *sucrée*, dont on fait une boisson fermentée, agréable, de peu de durée. L'eau du bouleau blanc est abondante, très-peu sucrée.

L'époque où la feuille paroît est celle où l'orge se sème.

La *feuille* fraîche, sèche nourrit le bétail; on en fait provision pour l'hiver. On en retire une couleur d'un jaune foible.

Les *branches* souples, solides dans les lieux découverts, font des liens, balais, paniers.

L'*écorce extérieure*, souple, forte, se lève par feuillets minces, les premiers blancs, les autres rougeâtres; elle servoit pour écrire, avant l'invention du papier. On couvre quelques habitations de cette écorce; on en fait des corbeilles, des vases à contenir du liquide; à défaut d'autres vases, les pêcheurs y font cuire leur poisson, en y mettant de l'eau : divisée par rubans, on en fait des chaussures nattées, des cordes, des bouteilles, etc. 7.

L'*écorce intérieure* est épaisse, rouge, solide; broyée, bouillie avec de la cendre, teint en rouge les filets des pêcheurs. Le cuir dépouillé de son poil, plongé à plusieurs reprises dans une décoction de cette écorce fraîche, résiste mieux à l'humidité. On retire de l'écorce de bouleau, par un feu étouffé dans des fourneaux, une huile employée dans la préparation du cuir de Russie; elle lui donne sa qualité, son odeur.

Le *bois* est blanc, solide, plus dur dans nos montagnes que dans le Nord. On en fait des ustensiles de ménage, des sabots, des cerceaux, du charronnage, des jantes de roue d'une seule pièce; fait un bon chauf-

fage. Son charbon sert aux dessinateurs, entre dans la poudre à tirer, est employé dans les fourneaux.

7. Il se forme sur le bouleau des nœuds d'une substance rougeâtre, marbrée, légère, solide, non fibreuse, très-recherchée des tourneurs, connue dans le Nord sous le nom de *Cap*. On en fait des tasses.

Le bouleau est le dernier arbre qu'on rencontre en s'élevant sur les montagnes, et en s'avançant dans le Nord vers les limites de la végétation; mais il est petit, tortu, rabougri.

8. *JONQUILLE*, plante vivace, bulbeuse, originaire d'Asie; fleur simple ou double, d'un jaune d'or; odeur suave; entre dans les parfums, se multiplie de semence et par caïeux.

9. *AULNE*, *Averne*, grand arbre, croît promptement dans l'eau. Planté sur le bord des eaux, retient les terres; dans les prairies ne nuit point à la végétation. Son écorce sert à tanner les cuirs, à les teindre en couleur fauve, ainsi que les filets de pêcheurs: mêlée avec ses fruits, peut suppléer pour le noir à la noix de galle. Son bois blanc, tendre, facile à teindre, sur-tout en noir, prend

bien la colle ; est durable sous l'eau ; on en fait des pilotis, des perches, pelles, sabots, échelles, chaises, talons de souliers ; sert au chauffage : son charbon est un de ceux qu'on préfère pour la poudre à tirer. Ses feuilles fraîches ou sèches servent de nourriture aux animaux : il a une variété à feuilles découpées. 9.

*COUVOIR*, panier d'osier où l'on met la poule couver ; il doit avoir la base large, être tenu proprement et parfumé. 10.

*PERVENCHE*, plante vivace des bois, ligneuse, rampante ; branches longues, flexibles ; feuillage d'un beau verd ; fleurs bleues, agréables ; se plaît à l'ombre. Deux espèces ; l'une a les feuilles, les fleurs grandes ; l'autre espèce plus petite, varie, à feuilles panachées, à fleurs blanches, pourpres, simples ou doubles. On cultive dans les jardins une troisième espèce originaire de Madagascar, à belles fleurs roses, blanches ; elle demande à être serrée l'hiver. 11.

*CHARME*, grand arbre d'une belle verdure : son écorce unie, mince, teint en jaune ; sa sève au printemps est abondante ; son bois dur, coriace, fournit des essieux, jantes, jougs, 12.

alluchons, maillets, manches d'outils;

12. se tourne bien; fait un bon chauffage. Le charme se transplante aisément, est peu difficile sur le terrein, fait de bonnes clôtures faciles à diriger; ses feuilles qui se conservent sur l'arbre, jusqu'aux nouvelles, servent d'abri en hiver; les bestiaux les mangent avec plaisir. Il a une variété à feuilles de chêne, une autre à fruit de houblon.

13. *MORILLE*, sorte de champignon des forêts, abondante après les premières pluies chaudes; se mange fraîche ou séchée.

14. *HÊTRE*, *Fayard*, *Faulx*, *Fouteau*, grand arbre formant des forêts d'une grande étendue; beau port, beau feuillage, écorce fine, lisse, grisâtre: il fait périr les plantes qui l'avoisinent, se transplante difficilement, veut être ombragé dans sa jeunesse, croît dans les terres sablonneuses, fait de bonnes haies: ses feuilles restent jusqu'aux nouvelles; durent longtemps sur la terre après être tombées, on en garnit les lits en place de paille: les moutons s'en nourrissent: sa graine triangulaire, abondante, renfermée dans une coque épineuse, connue sous

le nom de *faine*, bien séchée, dépouillée de son enveloppe sous la meule, donne une amande d'une saveur agréable dont on retire une huile douce, abondante, qui s'améliore en vieillissant, et qu'on mange ; son marc engraisse promptement les cochons, la volaille et les bestiaux ; donne moins de consistance au lard que le gland ; l'amande grillée peut suppléer au café. L'écorce de l'arbre remplace le liège pour les filets de pêcheurs : son bois est veiné, solide, facile à fendre ; fort employé par les boisseliers, layetiers, menuisiers, gaîniers, tourneurs ; on en fait des vases, saloirs, pelles, sabots, soufflets, bâts, colliers pour les bêtes de somme. On le durcit à la fumée ; il se conserve mieux sous l'eau qu'à l'air, fait un bon chauffage, brûle vîte, donne beaucoup de cendres. Il a une variété à feuilles de couleur pourpre, plus ou moins foncée. 14.

*ABEILLE*, *Mouche à miel*, d'Europe ; habite des troncs d'arbres, des creux de rochers ; vit en société ; est industrieuse, laborieuse, utile à l'homme par le miel, la cire qu'elle lui fournit. On en distingue quatre variétés ; l'une grosse, longue, brune ; 15.

15. une deuxième presque noire; une troisième grise; une quatrième jaune aurore, luisante, dite *de Flandre* et *de Hollande*, active, économe, préférable aux autres. Chaque essaim ou famille est composé, 1°. d'une pondeuse ou mère, corps plus gros, plus long que celui des autres abeilles, ailes courtes; pond jusqu'à quarante mille œufs par an, est armée d'un aiguillon; 2°. d'environ seize cents mâles ou faux-bourdons, petits, sans aiguillon, fainéans; 3°. d'environ vingt mille ouvrières, sans sexe, aiguillon barbelé, à la base duquel est une liqueur vénéneuse. Elles sont actives, prévoyantes, font tout le travail intérieur et extérieur de l'habitation; ne souffrent qu'une seule pondeuse; chassent, détruisent tous les mâles vers la fin de l'été; elles sont vindicatives; emploient sur-tout leur aiguillon contre ceux qui les craignent, les irritent; attaquent les plus gros animaux et les tuent: la fumée les éloigne; celle d'un linge humide, allumé, lié au bout d'un bâton, sert avec succès à leur enlever impunément leurs récoltes en miel, en cire; on parvient au même but, en les aspergeant d'eau légérement,

15.

à l'aide d'une brosse. On doit laisser quelque chose pour leurs besoins et pour les exciter au travail : elles sont susceptibles de s'apprivoiser. Les fleurs qui leur fournissent le meilleur miel, sont celles des bourraches, bouillons-blancs, serpolets et autres plantes labiées. En Suède, leur principale récolte de miel se fait sur les bruyères; en Dannemarck, sur le sarrasin; en Pologne, en Russie, sur le tilleul; dans le Levant, sur les thyms; au bord de la mer Noire, sur l'aconit; en Sardaigne, sur l'absinthe; en Corse, sur l'arbousier; à Narbonne, sur le romarin. De là ses diverses qualités. Les abeilles recherchent les fleurs de tulipes; après les fleurs elles recueillent les gouttes d'eau sucrée que jettent autour d'eux certains pucerons attachés aux jeunes pousses de quelques arbres; elles sont dans l'engourdissement pendant l'hiver; plus il est prolongé, moins elles consomment de leurs provisions. Lorsque la ponte produit de nouvelles mères, il se compose autant de nouveaux essaims, qui vont ailleurs fonder des colonies.

On élève les abeilles dans des ruches qui ne doivent point être expo-

15. sées au grand soleil, à la pluie, au vent; quelquefois on les place dans l'intérieur des habitations, même dans leurs parties les plus élevées; d'autres fois on les fait voyager pour leur procurer de plus abondantes récoltes.

16. *LAITUE*, plante potagère, annuelle, qui offre beaucoup de variétés, pommées ou non pommées; se mange crue, cuite. Les laitues préférables pour le printemps sont, la *crèpe*, la *berlin*, la *feuille d'épinards*; celle-ci se coupe deux ou trois fois; pour l'été, la *berlin*, la *versailles*; pour l'hiver, la *passion*, la *coquille*.

17. *MÉLÈSE*, grand arbre résineux des montagnes; forme pyramidale; *feuilles longues*, étroites, d'un beau verd au printemps, rassemblées par paquets tombent l'hiver; *semences ailées*, contenues dans un cône ou fruit écailleux qui s'ouvre à sa maturité; les graines tombent, le vent les disperse. Le mélèse croît promptement, même dans un sol médiocre: il parvient à la hauteur de cent pieds et plus, se transplante facilement, ne se multiplie que de semence. Sa culture est trop négligée.

*Sa résine* abondante sort par les

pores de l'écorce et la vernit ; elle en devient inattaquable à la pluie et très-combustible ; la résine se trouve quelquefois par masse dans les gros arbres, ou par petits grumeaux blancs (*manne de Briançon*). Elle eſt moins bonne que celle du sapin à feuille d'if. On la tire des mélèses les plus vigoureux, en ouvrant, à deux pieds de terre, un trou d'un pouce de diamètre ; une gouttière la conduit dans un baquet. On la passe dans un tamis de crin. Mêlée à l'eau, et distillée, elle donne une huile essentielle qui entre dans les vernis ; le résidu peut être employé dans le brai gras pour la marine. Un arbre peut fournir huit livres de résine par année, et pendant cinquante ans. Cet écoulement altère la qualité du bois. 17.

*Son écorce* est employée dans les tanneries.

*Son bois* dure long-temps, est presque incorruptible sous l'eau, est employé dans la charpente, la menuiserie, se polit bien ; les peintres s'en servoient anciennement au lieu de toile.

*Cigue*, plante bisannuelle des champs, des lieux ombragés ; elle est dangereuse. On la distingue du cer- 18.

feuil, du persil, par son odeur nauséabonde et sa tige tachetée.

19. *RADIS*, plante potagère annuelle : racine charnue, petite, blanche, rouge, rose, violette, longue ou ronde; elle se sème toute l'année, et se mange crue. Les jeunes feuilles se mangent cuites et en salade.

20. *RUCHE*, habitation des abeilles; on la construit en bois avec ou sans verres; en paille ou osier, ronce, viorne, troêne tressés; on en fait avec du liège ou un tronc d'arbre : sa forme est circulaire ou carrée; d'une seule ou de plusieurs pièces posées les unes sur les autres, ou à côté les unes des autres : sa hauteur est d'environ trente pouces sur vingt à vingt-cinq de largeur : on la recouvre de paille, quelquefois d'une boîte assez grande pour laisser un vuide tout autour. Elle doit être éloignée des fumiers, des marais, et parfumée de temps en temps. La ruche composée de plusieurs pièces ou *hausses*, est plus utile pour en retirer le miel et la cire, sans faire périr et sans troubler les abeilles.

21. *GAINIER*, arbre moyen, originaire de Judée, naturalisé en France; ses fleurs roses ou blanches, celles-

ci rares, sont agréables, abondantes, paroissent avant les feuilles et sont recherchées des abeilles. Ses feuilles sont d'un beau verd; son bois dur, veiné, est propre à la marqueterie : cet arbre craint les très-grands froids. 21.

*ROMAINE*, *Chicon*, sorte de laitue à pomme alongée, qui a plusieurs variétés, dont une hâtive. Celle à feuille verte ou la *maraichère*, la *blonde*, la *flagellée* sont préférables pour l'été; la grise de toutes saisons, monte difficilement, passe même l'hiver, ainsi que la rouge : toutes se mangent crues ou cuites. 22.

*MARRONNIER D'INDE*, grand arbre du nord de l'Asie, naturalisé en France depuis plus d'un siècle; beau port, beau feuillage, belles fleurs printanières; son bois blanc, mou, sert en voliges. Son fruit est une coque épineuse qui contient plusieurs *marrons* fort amers. On les adoucit en les lessivant; pelés, rapés, ils donnent de la fécule; écrasés, infusés à froid pendant douze heures dans l'eau, ils la rendent savonneuse et propre à blanchir. Les bestiaux peuvent manger ces semences. Leurs cendres donnent une grande quantité de potasse. 23.

24. *ROQUETTE CULTIVÉE*, plante annuelle, se sème, se récolte dans l'espace de trois mois; l'été, se cultive à l'ombre; jeune, elle assaisonne la salade; ses graines donnent de l'huile.

25. *PIGEON*, oiseau sauvage, ou domestique, symbole de la tendresse, de la constance. Il supporte tous les climats; se détache difficilement du lieu qui l'a vu naître, vole avec rapidité et long-temps, voit au loin, se nourrit de grains, aime le sel, le salpêtre et les eaux saumâtres, se plaît au soleil, à une pluie douce, veut être propre. Il roucoule, fait la roue auprès de sa femelle : celle-ci pond deux œufs à chaque couvée, les couve tour-à-tour avec son mâle; nourrit ses petits en dégorgeant dans leur bec le grain qu'elle a ramolli dans son gésier. Si elle est bien nourrie, elle pond au moins neuf fois par an; alors une seule paire de pigeons pourroit produire progressivement au bout de quatre années, plus de dix-huit mille pigeons. Cet oiseau va par troupe, fait un grand dégât dans les semis, principalement dans les chenevières; sa fiente ou colombine est un bon engrais, préférable dans les terres

fortes. Il vit au-delà de quinze ans. Sa chair est délicate. Les pigeons les plus connus sont le *ramier*, *biset*, *mondain*, *romain*, *pattu*, *nonnain*, *paon*, *cavalier*, *polonois*, *culbutant*, *gorge*, *glouglou*, *huppé*, *messager;* ce dernier porté fort loin du lieu qu'il habite, le retrouve ensuite avec facilité. 25.

*LILAS*, arbrisseau, originaire d'Asie; feuillage d'un beau verd, quelquefois panaché; belles fleurs en grappes droites, d'une odeur suave, violettes, pourpres ou blanches: son bois blanc est serré, ferme. On distingue le lilas de Perse, espèce plus petite qui fournit trois variétés: une autre espèce se fait remarquer par sa fleur purpurine à grosse panicule; elle tient le milieu entre les deux espèces précédentes. 26.

*ANÉMONE DES JARDINS*, plante vivace, originaire du Levant, à racines charnues; les semis donnent beaucoup de variétés à fleurs simples ou doubles, nuancées de toutes les couleurs; on les conserve en les relevant de terre tous les ans, lorsque leurs tiges sont sèches; on les replante au commencement de l'automne. 27.

*PENSÉE*, petite plante agréable par l'élégance de ses fleurs, la viva- 28.

28. cité, l'harmonie, le velouté de leurs couleurs; elles sont légérement odorantes. On en cultive deux espèces: l'une annuelle très-commune, se sème d'elle-même, fleurit presque toute l'année, donne beaucoup de variétés; l'autre vivace, peut se multiplier en partageant ses touffes.

29. *MYRTILLE*, *Raisin des bois*, arbuste traçant; ses baies d'un bleu foncé, se mangent fraîches, avec de la crême, dans des tartes; les coqs de bruyère en sont friands; on les emploie dans la teinture.

30. *GREFFOIR*, instrument du jardinier lui servant à greffer, sur-tout en *écusson*; à l'extrêmité de son manche est une pièce d'ivoire, mince, arrondie, de la longueur d'environ un pouce; elle sert à lever l'écorce pour placer l'*œil*. Le greffoir en forme de *scalpel*, à manche d'ivoire, est préférable.

# FLORÉAL, VIII^e. MOIS.

*Mois des Fleurs.*

1.

*ROSE*, fleur du rosier, arbuste dont il existe beaucoup d'espèces, de variétés, originaires de l'Asie, de l'Amérique septentrionale, de l'Europe. La rose est simple, semi-double, double prolifère ou très-double, avec ou sans aiguillons; sa couleur est rouge tendre, pourpre, ponceau, jaune, citron, carnée ou de chair, blanche, panachée. Les principales cultivées sont la *rose rouge* de *Provins*, qui est un objet de commerce; la *rose à cent feuilles*, *la mousseuse*, variété de la précédente; la *muscate*, la *cannelle*, la *pomifère*, la *rose de Meaux*, *de Bourgogne*, *de Champagne*, et celle *à gros-cu*. Elles se succèdent jusqu'à la fin de l'automne. C'est à la culture qu'on doit les fleurs doubles : les étamines deviennent pétales, et la fleur cesse de donner des graines. La plupart ont une odeur suave, entrent dans les parfums, dans

1. quelques liqueurs; on en fait des conserves. Elles donnent, par la distillation, une eau odorante (*eau rose*), et une huile essentielle en petite quantité transparente presque sans couleur, figée à une température ordinaire et très-recherchée pour son parfum qui se développe par le frottement. La fleur du *rosier à gros-cu* est suivie d'un fruit rond d'un rouge brun, dont la pulpe fait une confiture.

2. CHÊNE, *Rouvre*, arbre qui acquiert jusqu'à dix pieds de diamètre, 130 pieds de hauteur, forme de vastes forêts, sur-tout dans les parties tempérées de l'Europe; vit des siècles, est utile dans toutes ses parties. Attaché fortement à la terre par son pivot profond, il résiste aux orages. Son aspect plaît, étonne. Symbole de la génération, de la force, de la durée; consacré aux vertus civiques, il est digne de devenir dans toute la France l'arbre de la liberté.

Son *écorce* astringente, pulvérisée, ainsi que les *cupules* qui portent le gland et la *sciure* de son bois, servent à tanner les cuirs; l'*écorce* fournit une couleur fauve, remplace pour le noir dans la teinture et la chapellerie, ses *cupules* et ses *galles*.

Son *bois* dur, solide, sur-tout sur un sol élevé, graveleux, durcit encore plus en l'écorçant sur pied, ou par son séjour dans l'eau; il s'y conserve des siècles, y acquiert la couleur, la dureté de l'ébène; les planches de chêne sont plus solides, mieux veinées, en les refendant sur la *maille*. Ce bois, le plus utile pour toutes les constructions civiles, militaires, navales; le plus employé par les charpentiers, menuisiers, tonneliers, fournit aussi un bon chauffage, un excellent charbon, des cendres riches en potasse. Il rougit quand il est sur le retour. 2.

Sa *sève* astringente communique ses propriétés à toutes les parties de l'arbre, même aux plantes parasites qu'il nourrit.

Ses *feuilles* d'une belle forme, d'un beau verd, nourrissent les animaux, pourrissent lentement; entassées, donnent une chaleur plus durable que celle du fumier: elles restent sur l'arbre une grande partie de l'hiver.

Ses *fleurs* printanières gèlent souvent.

Son *fruit* ou gland, enchâssé dans sa cupule, est d'une saveur âpre; il peut s'adoucir par des lessives, la tor-

réfaction et la germination; son amande
2. qui rancit promptement, contient de la fécule ; elle a quelquefois servi d'aliment aux hommes. Le gland frais ou séché nourrit et engraisse les porcs.

Le chêne se multiplie seulement de semences qui doivent être mises dans la terre dès leur maturité ; jeune, il doit être abrité par d'autres plantes; il se transplante difficilement à cause du pivot de sa racine ; une bonne culture donne au plant de chêne un chevelu qui assure le succès des transplantations ; dans les forêts, ses branches latérales périssent ; isolé, elles doivent être élaguées jeunes ; trop grosses, elles occasionnent des plaies à la tige, qui détruisent son intérieur.

Ses *variétés* sont à péduncule court, long, feuille velue, forme pyramidale. La première improprement appellée mâle, a le bois plus dur.

3. *FOUGÈRE COMMUNE*, plante rameuse, vivace, des bois, multiplie beaucoup; elle ne peut être détruite, dans les champs, qu'en la coupant à mesure qu'elle pousse. Elle fournit de la litière; sert à emballer les fruits dans leur transport; donne en brûlant beau-

coup de chaléur ; sa cendre est un bon engrais ; lessivée, elle donne du salin pour les verreries, les salpêtreries ; pêtrie avec de l'eau, formée en boule, séchée au soleil, calcinée, peut suppléer au savon. La fougère pourrie fait du fumier. Ses racines amères ne contiennent rien de nutritif, quoiqu'elles aient été données quelquefois au lieu de pain : elles sont d'usage en médecine. 3.

*AUBÉPINE*, *Epine blanche*, arbrisseau très-épineux, bois très-dur, fleur odorante qui ne corrompt point le poisson comme on le croit ; les animaux mangent ses feuilles ; on fait une boisson fermentée avec ses fruits. L'aubépine croît par-tout, fait d'excellentes haies, se tond bien ; on la multiplie principalement de graines, qui doivent être semées aussitôt qu'elles sont mûres : semées au printemps, elles restent en terre jusqu'à l'année suivante. Ses variétés sont à feuille panachée, à fleur double, rose, précoce ; à fruit jaune. 4.

*ROSSIGNOL*, petit oiseau d'Europe ; vit seul, aime l'ombrage et les eaux : le chant du mâle au printemps est très-mélodieux ; le calme de la nuit l'invite à déployer sa voix ; apprivoisé, 5.

il chante dans tous les temps. La femelle, comme celle des autres oiseaux, est silencieuse ; son plumage est moins foncé ; elle fait deux pontes au moins, chacune de quatre à cinq œufs de couleur de bronze. Le rossignol est avide d'insectes; les vers de farine sont l'appât le plus sûr pour le prendre.

5.

6. *Ancolie commune*, plante vivace des bois ; cultivée dans les jardins, y croît aisément ; fleur bleue irrégulière ; la culture a produit des variétés dont la fleur est double, verte, blanche, rose ou panachée.

7. *Muguet*, petite plante vivace des bois; aime l'ombre ; racines traçantes, fleur blanche d'une odeur très-suave ; ses variétés sont à fleur double et rouge.

8. *Champignon*, famille de plantes qui comprend plusieurs genres, un grand nombre d'espèces, de variétés. Elles croissent dans la terre, à sa surface, sur des végétaux vivans, sur des substances animales, végétales en décomposition. Elles diffèrent entre elles par la forme, la grandeur, par la couleur qui varie du blanc au noir :

L'odeur, suave dans les uns, vireuse dans d'autres ;

8.

La saveur, âcre, brûlante, insipide ou agréable;

La substance, gélatineuse, spongieuse ou ligneuse;

La qualité, vénéneuse, émétique, astringente ou très-combustible;

La durée, d'un jour ou de plusieurs années.

Le *mousseron*, la *morille*, l'*oronge*, la *chanterelle*, l'*agaric*, l'*amadou*, la *truffe* et toutes les *moisissures* sont de la famille des champignons, qui tous ont leurs fleurs, leurs graines comme les autres plantes, mais elles ne sont visibles qu'au microscope.

Plusieurs champignons frais, secs ou cuits causent des maladies, d'autres tuent; tous sont de difficile digestion. Les moins mal-sains des lieux secs, sont dangereux dans les lieux humides, ou le deviennent en se gâtant.

Il n'existe aucun moyen certain de distinguer les moins malfaisans. Le vinaigre calme les douleurs qu'ils causent, mais ne guérit pas: l'émétique est le meilleur remède.

Les champignons se conservent secs, confits au sel ou dans l'huile.

Les plus utiles sont l'agaric qui donne l'amadou, et celui qui arrête les hémorrhagies. On prend les écu-

8. reuils avec un appât dans lequel on met de la *vomitive*, espèce d'agaric.

9. *HYACINTHE*, *Jacinthe*, plante vivace, bulbeuse. Deux espèces sont plus connues : l'une de nos bois ; l'autre originaire du Levant, cultivée depuis deux siècles dans les jardins. Les semis ont produit un très-grand nombre de variétés, à fleur simple, double, de toutes couleurs, toutes très-odorantes : les variétés à fleur double ont d'abord été rejettées, et ne sont cultivées au plus que depuis un siècle. L'oignon de cette espèce fleurit bien, placé sur l'eau dans un vase.

10. *RATEAU*, instrument des champs, des jardins, composé d'un long *manche* qui se fixe par un ou deux points sur le *fût*, pièce de bois, garni sur son épaisseur de dents de fer ou de bois dur. La longueur du fût varie depuis dix pouces jusqu'à trois pieds ; celle du manche depuis trois pieds jusqu'à cinq et demi ; les dents rondes ou plates posées de champ, plus ou moins longues, sont droites ou courbées, pointues ou obtuses, rapprochées ou éloignées suivant leur destination. Le rateau sert à ramasser les récoltes, nettoyer les prés, les terres, les

Jours.

les allées; diviser, égaliser leur surface, en retirer les pierres, couvrir les semences, rompre la croûte qui les empêche de lever; quatre peuvent suffire dans les jardins; le grand, le moyen, le fin, celui à sentier. Le *fauchet*, sorte de rateau qui sert à ramasser le foin, a des dents de bois des deux côtés de son fût. 10.

*RHUBARBE* (*la vraie*), grande plante vivace, originaire de Chine, près la grande muraille; feuilles palmées, grosses racines d'usage en médecine, qui contiennent du soufre, de la sélénite (sulfate calcaire) bien sensible lorsqu'elles ont vieilli. Cultivée en grand, se récolte au bout de quatre années. La rhubarbe réussit sur le sol de la république. Il existe trois autres espèces de rhubarbe inférieure à celle-ci: la première de Tartarie, à feuille compacte, est meilleure que les deux autres; la seconde, de la mer Noire, nommée *rapontic*; les pétioles ou queues des feuilles se mangent cuites: la troisième de Moscovie, à feuille ondulée. Toutes trois sont grandes et vivaces; leurs feuilles cuites à grande eau, peuvent être mangées comme les épinards. 11.

*SAINFOIN*, *Esparcette*, plante vi- 12.

12. vace, à fleur rouge rayée, en épi; racine pivotante. Il résiste au froid, à la sécheresse; vient bien dans les terreins sablonneux, pierreux, même argilleux, si le fond n'est point trop humide; dure de trois à six années; le terrein peut ensuite produire pendant le même espace de temps des grains et autres plantes, en variant annuellement les espèces, relativement à leurs racines. Le sainfoin fournit deux fois par an un fourrage excellent, préférable à la luzerne, mais trop peu abondant. Il convient à tous les animaux; son excès leur est moins nuisible: ses feuilles coupées en verd, mêlées avec la paille d'avoine, font une bonne nourriture. Pour conserver le sainfoin, on le fauche dans le commencement de sa fleur; on le garde en meule, en y laissant intérieurement, de peur qu'il ne s'échauffe, un ou plusieurs conduits perpendiculaires pour le passage de l'air. Après deux ou trois labours, on sème sa graine avec de l'avoine, dont on ne met que moitié de la semence ordinaire. Il faut 12 à 15 boisseaux de graine de sainfoin par arpent; elle doit être nouvelle: on l'enterre peu. Elle est d'une récolte plus facile que

celle de la luzerne ; elle nourrit bien les chevaux. 12.

*BATON D'OR*, plante ligneuse, vivace, toujours verte, variété de la giroflée jaune. Ses fleurs sont doubles, d'un beau jaune, d'une odeur suave, très-serrées le long de la tige qui est ferme et droite : de-là lui vient son nom. Le bâton d'or se multiplie de bouture, est devenu très-rare. 13.

*CHAMÉRISIER :* cinq espèces d'arbrisseaux ou arbustes de nos montagnes, et deux étrangères cultivées sous ce nom dans nos jardins. La première surnommée à *fruit noir ;* la seconde *des haies ;* la troisième *des Pyrénées ;* la quatrième *des Alpes ;* la cinquième à *fruit bleu ;* la sixième *de Tartarie*, à fleur blanche et rose ; la septième *de Canada.* Leurs fleurs, de la forme de celle du chèvrefeuille, sont blanches, jaunes, purpurines ; leurs fruits ou baies rouges, en général abondans, restent long-temps sur pied. Ces arbrisseaux, peu délicats, peuvent former de petites clôtures qui réussiront bien dans les mauvaises terres ; le bois de l'espèce des haies fait des tuyaux de pipe. 14.

*VER-A-SOIE*, chenille originaire 15.

15. d'Asie, très-intéressante à multiplier, à étudier. Le ver-à-soie est laborieux, propre, sans moyen de nuire, a l'odorat fin; est incommodé de l'humidité, du froid, du grand chaud, de l'électricité des orages; aime l'air pur, l'obscurité, les parfums légers, une nourriture abondante, tendre, veut de l'espace à mesure qu'il grossit, et une chaleur graduée; il mange peu quand il a froid; peut jeûner quelque temps, mais ses progrès en sont retardés. Il change de peau quatre fois; après un mois et plus d'existence, il cesse de manger, monte, cherche à se fixer, attache autour de lui le fil qui sort de sa bouche et dont la longueur va jusqu'à mille pieds. Il se renferme ainsi dans un cocon du poids de dix grains environ, entouré d'une bourre (*mauvaise soie*), composé lui-même d'une soie jaune, ou blanche, rosée ou céladonne qu'on déroule à l'eau chaude (*orcansin*). De toutes les matières propres aux tissus, la soie est la plus forte, la plus légère, la plus chaude et la plus belle. Le ver devient *chrysalide*, se dépouille deux fois dans son cocon, en sort transformé en papillon mâle ou femelle, vit encore

Jours.

15.

huit jours. La femelle pond environ cinq cents œufs ou graines, ensemble du poids de sept à huit grains; les bons sont gris-cendrés, rougeâtres, ronds, assez pleins pour enfoncer dans l'eau, s'écrasent sous l'ongle avec bruit. A une chaleur graduée de dix-huit à vingt degrés, ils éclosent du cinquième au dixième jour avec le concours de l'air. De tous les moyens artificiels de les faire éclore, une étuve aérée est préférable. Partout où le mûrier croît, le ver-à-soie peut réussir. Il ne peut être élevé, avec profit, en France, que renfermé. A la Chine, dans le Bengale, au Tunquin, où la nature l'a placé, souvent on le renferme, on le fait éclore artificiellement. La chaleur qui lui convient n'est point au dessous de quinze degrés, ni au dessus de vingt-cinq; on ne peut la rendre égale que par des moyens artificiels; un feu de flamme claire, entretenu avec des plantes aromatiques bien sèches, renouvelle, purifie l'air; la qualité de la soie dépend de celle de la nourriture du ver. La feuille du mûrier blanc est la plus employée; celle du noir le rend plus robuste, mais la soie en est moins belle; l'instant de la végé-

15. tation du mûrier est l'époque pour faire éclore la graine ; deux mille livres pesant de ces feuilles sont produites par environ une toise cube de branches bien garnies ; cent livres de cocons en sont le produit. Le ver-à-soie étant jeune, on lui coupe la feuille ; on lui en donne deux fois par jour, progressivement jusqu'à six ; elle ne doit point être mouillée. Dans les petites éducations une once de graine fournit cent livres de cocons ; dans les grandes, dix onces n'en donneront que six cents. On présente au ver à-soie, quand il ne mange plus, de petites branches de genêts, de bruyères, ou d'autres arbustes ; il y monte, y attache ses cocons ; cent livres de ces branches peuvent servir pour cent livres de cocons : il est possible de faire jusqu'à trois éducations par an. Si, lorsque le ver est prêt à filer, on lui ôte sa pelote de matière à soie, cette matière soufflée comme une bulle de savon, se dilate, forme une pellicule mince, transparente, flexible, présente les couleurs de l'opale. D'autres espèces de chenilles fournissent aussi de la soie, mais moins belle, moins solide, plus difficile à travailler.

*CONSOUDE (grande)*, plante vivace du bord des eaux ; grandes feuilles que les bestiaux mangent; la couleur de sa fleur varie; sa racine grosse, charnue, très-mucilagineuse, est employée en médecine. 16.

*PIMPRENELLE*, plante vivace des prés secs; résiste au froid, à la chaleur; fournit l'hiver un pâturage très-utile aux bestiaux, rend leur chair ferme, communique au beurre une saveur agréable. Cette plante coupée souvent, donne un feuillage plus tendre, est d'un plus grand produit. Elle se sème en rayon, de bonne heure au printemps ou à l'automne; est employée pour l'assaisonnement des salades; il y a une variété à feuille plus large. Une espèce de pimprenelle originaire du Canada, plus grande, doit être préférée dans les terreins frais pour les prairies artificielles. 17.

*CORBEILLE-D'OR*, plante vivace, ligneuse, toujours verte, originaire du Levant, cultivée dans les jardins; ses fleurs jaunes, de longue durée, forment une touffe régulière, d'où lui est venu son nom. Elle se sème avec avantage à la fin de l'été. 18.

*ARROCHE*, *Bonne-Dame*, grande plante annuelle, originaire de Tar- 19.

tarie; résiste au froid, croît promptement, à-peu-près par-tout; elle est
19. cultivée dans les potagers; ses feuilles aqueuses se mangent jeunes étant cuites; il seroit utile de la cultiver en grand comme fourrage; elle varie à feuilles blanches, rouges, sanguines.

20. *Sarcloir*, outil de culture, de différentes formes et dimensions; destiné à détruire les mauvaises herbes; le plus utile est celui qui sert à échardonner; son fer recourbé est tranchant vers son bout en dehors comme en dedans, coupe en tirant et en poussant.

21. *Statice*, *Gazon d'Olympe*, plante vivace, très-basse; ses fleurs blanches, rouges, ou gris-de-lin, durent long-temps. On en fait des bordures dans les jardins.

22. *Fritillaire*, plante vivace, bulbeuse; fleur pendante, de la forme d'une petite tulipe, blanche, pourpre, nuancée diversement; une variété marquée par petits carreaux se nomme *Damier*. On la cultive dans les jardins.

23. *Bourrache*, plante annuelle, originaire d'Alep, très-anciennement cultivée; ses fleurs sont blanches, bleues, ou purpurines; entrent dans les salades. Cette plante jeune con-

JOURS

tient du nitre ; est d'usage en médecine. 23.

*VALÉRIANE DES JARDINS*, grande plante vivace ; croît par-tout, même sur les murailles ; fleurs blanches, rouges, odorantes, de longue durée. Parmi plusieurs autres espèces de valériane, on compte principalement celle des bois et celle des marais. 24.

*CARPE*, poisson d'eau douce, très-fécond ; fraie depuis floréal jusqu'en messidor ; la femelle pond jusqu'à trois cent mille œufs. La carpe acquiert jusqu'à trois pieds de long, 30 livres de poids ; vit très-long-temps ; blanchit en vieillissant ; la castration la fait grossir et engraisser : pour la nourrir hors de l'eau, on la suspend dans un petit filet sur de la mousse humide, on lui donne du pain trempé dans du lait : les plus estimées sont celle de la Saône, de la Seine, de la Loire et du Rhin. 25.

*FUSAIN*, *Bonnet de prêtre*, arbrisseau des bois ; fleur blanchâtre, fruit rouge, quelquefois blanc, d'une longue durée, employé dans la teinture ; bois dur, dont on fait des lardoires, des fuseaux. Des lanières longues, minces, levées sur le bois sans les en détacher entiérement, réunies en forme de 26.

balais, servent à chasser les mouches;
26. les dessinateurs se font des crayons avec les jeunes branches de fusain, qu'ils réduisent en charbon dans un tube fermé de fer qu'ils font rougir au feu. Le fusain croît par-tout, fait de bonnes haies.

27. *CIVETTE*, *Cive*, *Appétit*; petite plante vivace, bulbeuse, originaire de Sibérie; cultivée dans les potagers. Ses feuilles approchent de celles de la ciboule, se mangent crues; plus on les coupe, plus elles sont tendres. On distingue la grande et la petite civette: on la multiplie en séparant les pieds.

28. *BUGLOSE*, plante vivace; racine charnue, mucilagineuse, pivotante; fleur bleue; cette plante, d'usage en médecine, contient du nitre; les animaux mangent ses feuilles.

29. *SENEVÉ*, *Moutarde*; plante annuelle, cultivée en grand, en terre fraîche; elle se sème depuis la fin de l'hiver jusqu'en germinal, suivant les climats; se récolte au bout de trois mois, peut se replanter. Elle est employée comme fourrage; ses feuilles naissantes se mangent en salade. Ses graines d'un brun foncé font la moutarde; on en fait de l'huile bonne à brûler et employée dans les arts. On cultive une

variété à graine blanche, plus grosse, plus abondante en huile. 29.

*HOULETTE*, instrument de bergerie et de jardinage. La houlette du berger est formée d'un long bâton, terminé à son extrêmité supérieure par un crochet de fer qui sert à arrêter les moutons, en les saisissant par les jambes; à son extrêmité inférieure, par une petite pelle de fer, avec laquelle on ramasse des mottes de terre, qu'on jette aux moutons pour les rassembler, et au chien pour le dresser. 30.

La *houlette* du jardinier est formée d'un manche de bois plus ou moins long, terminé par un fer de diverse grandeur, arrondi, pointu ou carré. Elle sert à planter ou lever des plantes; elle est préférable au plantoir, surtout lorsque les racines ont besoin d'être étendues.

## PRAIRIAL, IX^e. MOIS.

*Mois des Prairies.*

*LUZERNE*, plante vivace; racine profondément pivotante; fleur bleue. 1.

Elle craint l'humidité ; réussit moins
1. bien dans les climats chauds et froids, que dans les climats et les expositions tempérées ; aime une terre profonde ; produit chaque année de deux à trois récoltes d'un fourrage abondant, sain en verd, en sec, qui convient aux chevaux, à tous les bestiaux. La durée d'une luzernière est de 5 à 9 ans ; le sol peut ensuite produire du grain sans engrais.

2. *Hémérocalle*, plante vivace à fleur rouge papillonacée, qui fournit aux abeilles un miel abondant. Sa racine donne une fécule. On compte deux espèces ; l'une vulgairement appellée le lys de *Sibérie*, fleur jaune, odeur de jonquille ; l'autre plus grande, le lys *Asfodel*, du Levant, fleur rouge, terne, jaunâtre.

3. *Trefle* cultivé, dure trois ans, vient par tout, excepté dans les terreins secs ; croît promptement ; produit beaucoup : c'est le meilleur fourrage pour alterner. Il doit être mêlé avec de la paille pour le faner facilement ; fournit aux abeilles une abondante récolte de miel. Pâturé frais immodérément, est nuisible. On ne doit le faire pâturer ni à la

rosée, ni chargé d'eau. Le froment lui succède avec avantage. On cultive dans le midi un trèfle annuel. 3.

*Angélique*, grande plante bisannuelle des lieux humides, naturelle en *Laponie*, en *Autriche*, sur les bords du Volga; est cultivée en grand sur-tout à *Niort*. On la mange crue, blanchie, confite au sucre; on fait avec la graine des dragées, du ratafia. 4.

*Canard*, oiseau aquatique sauvage, domestique; pattes courtes, très-en arrière; doigts réunis par une membrane; démarche lourde; bec large, applati, obtus, garni intérieurement de lames qui lui servent à la mastication; bruyant, barboteur, vorace; croît vîte; est d'un grand produit; sa chair de difficile digestion, de bon goût, sur tout lorsqu'il a pu se livrer à son naturel pour l'eau; quelques plumes retrossées, frisées à la queue du mâle, le distinguent de la femelle qui est plus petite. La cane pond 15 à 20 œufs aussi bons, mais à coque plus dure que ceux de la poule. Les canetons vont à l'eau en naissant, même étant couvés et conduits par une poule. Le canard a une gloutonnerie qui lui est 5.

5. souvent funeste. On l'engraisse en le renfermant dans une mue en partie plongée dans l'eau. On a l'art de faire acquérir un très-gros volume au foie.

Le canard sauvage a fourni le domestique auquel il se mêle volontiers; il vit en troupe sur les étangs voisins des lieux habités. La troupe ne descend qu'après avoir reçu le signal de sécurité de ceux qui vont en avant comme *éclaireurs;* il a l'ouie, l'odorat très-fins; on le prend à l'hameçon, aux lacs tendus dans les grands joncs. Le chasseur prudent, placé en opposition de la lune et du vent, peut en surprendre un grand nombre. Sa chair plus estimée que celle du domestique. Souvent la cane sauvage fait sa ponte sur la tête d'un arbre; descend ses petits en les portant avec son bec dans l'eau voisine; les habitans du Nord attachent près des grandes eaux de petits caissons aux arbres, et y mettent un ou deux œufs de cane pour attirer les pondeuses; ils les visitent à la ponte, et en retirent les nouveaux œufs par le fond qui est à bascule.

On connoît plusieurs variétés : le *bec crochu;* la *tête noire;* la *tête levée;*

le canard qui donne l'*édredon ;* celui de *Madagascar ;* de *Barbarie* , ou mieux, le canard *musqué*, ayant des tubercules charnus sur la tête, plus gros, plus beau, plus propre, plus paisible, et aussi bon que le domestique ; il devroit être multiplié de préférence à tout autre. 5.

*Mélisse* , plante vivace du sud de la France ; fleur blanche, labiée ; odeur de citron ; elle entre dans la composition de l'eau de mélisse. 6.

*Fromental* , grande plante graminée, vivace, à panicule avennacée ; fourrage productif, bon ; aime les terreins frais ; diffère du *ray-grass* , espèce basse de graminée , dont l'épi étroit a la forme de l'*ivraie.* 7.

*Martagon* , lys à fleurs pendantes, renversées : cinq espèces, beaucoup de variétés. Racine charnue, écailleuse, vivace, se mange en Sibérie. La poussière des étamines fourniroit une belle couleur aux peintres en miniature. 8.

*Serpolet* , espèce de thym, plante grêle, rampante, vivace, très-aromatique , camphrée. Variétés à larges feuilles ; velue , panachée ; 9.

odeur de citron ; à fleurs blanches.

9. Cette plante est l'indice d'un sol aride. Les lapins qui la broutent ont un meilleur goût.

10. *FAULX*, instrument aratoire servant à couper près de terre l'herbe des prairies, les bleds, le chaume. Le tranchant est mince, terminé en pointe, un peu courbé, soutenu dans toute sa longueur par un ourlet. Une queue contournée sert à le fixer à un long manche de bois à deux poignées, qu'on saisit à deux mains ; quelquefois on adapte près de l'emmanchement, plusieurs baguettes d'osier qui s'avancent au dessus de la faulx en suivant sa courbure, pour faucher, rassembler, renverser les plantes d'un même côté, d'un même coup et en former un ondin.

On amincit le tranchant usé, émoussé, en le battant à froid sur une petite enclume ; un tourne-fil d'acier, une pierre à émouler réparent les brèches, avivent le tranchant que le battage rend plus dur, plus durable. Au lieu de pierre à émouler, on se sert aussi d'un bois tendre sur lequel on met un sable fin.

La négligence du gouvernement des

Jours.

rois à encourager parmi nous les arts vraiment utiles, nous rendoit tributaires de l'étranger. L'Allemagne fournissoit à la France toutes les faulx dont elle avoit besoin. Le régime républicain met au premier rang l'agriculture, et tous les arts qui la servent : nos fers sont améliorés; les aciéries se multiplient ; des faulx se fabriquent en France ; des élèves se forment , & bientôt tout cultivateur trouvera près de lui tous les instrumens de son travail. 10.

*Fraise*, fruit du fraisier, plante basse, traçante des bois, cultivée dans les jardins ; elle multiplie beaucoup, pousse de longs filets qui prennent racine en touchant terre ; on les retranche soigneusement, on bine, on arrose. Sa fleur est blanche, agréable, quelquefois semi-double. La fraise est parfumée, rouge ou blanche, ronde ou oblongue, de la grosseur d'une mûre sauvage, quelquefois plus grosse, d'une saveur sucrée, légérement acidule ; elle porte ses semences à la surface. La qualité du terrein, l'exposition, la culture ajoutent à sa grosseur, à sa beauté, perfectionnent sa saveur, développent son parfum. 11.

11. En élevant de graine, on obtient des variétés intéressantes, plus abondantes en fruits. On doit semer sur du terreau ou une terre douce bien préparée, unie; couvrir la semence légérement de terre, ou mieux, de mousse, de paille froissée; abriter le semis contre l'ardeur du soleil et les pluies abondantes.

Parmi les nombreuses variétés de fraisiers, on distingue celui des Alpes qui produit abondamment et longtemps. Sa graine semée à la fin de l'hiver ou au commencement du printemps, donne du fruit dès la fin de l'été suivant. Le fraisier ananas de Caroline, de Bath, et sur-tout celui du Chili, sont remarquables par la grosseur de leur fruit.

Le fraisier du Chili, comme quelques autres espèces, a ses fleurs mâles et femelles séparées sur différens pieds; nous n'avons en France que la plante femelle. Elle ne produit qu'autant qu'il existe dans son voisinage une autre espèce qui fleurisse en même temps et la féconde, tels que le fraisier à gros fruit, le *capronnier*.

12. *Betoine*, plante officinale vivace, fleur rougeâtre.

Jours.

*Pois*, plante légumineuse, annuelle, du sud de l'Europe. Plusieurs variétés à fleurs blanches, à fleurs violettes ou roses; à rames ou grimpantes; naine ou sans rames; à gousse avec ou sans parchemin; ces derniers encore tendres se mangent avec la cosse. Les pois les plus remarquables par leur qualité, leur produit, sont le *michaut* très hâtif et de toute saison; semé dès le mois de frimaire, il donne des pois de primeure; le *quarré fin*, dit *clamart*, excellent et d'un grand rapport; le gros *quarré blanc*; le *marly*; le *sans pareil*; le *quarré verd*, le plus propre à conserver en sec pour purée; le *gris*, *pois de brebis*, qui se cultive en grand pour fourrage en verd, en sec; le *cossat*, bonne nourriture pour les bestiaux. 13.

Les pois sont sujets à être piqués par le ver d'un petit charanson noir: on le fait tomber en les criblant fortement au dessus d'un baquet d'eau, ou en les étendant au soleil et les remuant de temps en temps.

*Acacia* (*faux*), grand arbre épineux, originaire de l'Amérique septentrionale; il croît rapidement, son feuillage est agréable, son ombre 14.

14. légère, ses fleurs blanches très-odorantes. Les jeunes pousses sont bonnes pour les bestiaux ; ses fleurs font un bon sirop ; sa racine douce, sucrée, a l'odeur de la réglisse. Son bois bien veiné, dur, se fend aisément, ne pourrit ni sous l'eau, ni à l'air : on en fait des échalas, des perches à houblon, d'excellens cercles, de très-bonnes chevilles, des pieces de construction pour les moulins et autres machines. En Amérique, on le préfère pour les étambots, les courbes de l'arrière des vaisseaux. Cultivé bas comme l'osier, il fourniroit, même dans un sol maigre, à des coupes fréquentes. Une variété sans épine reste basse.

15. *CAILLE*, oiseau de passage plus petit que la perdrix grise dont il a la forme, les mœurs. La caille a le vol bas, se nourrit de bled, millet, sarrasin ; se tient dans les bleds verds, les chaumes ; fait son nid sur la terre, pond seize œufs. Les *cailleteaux* s'apparient de messidor en vendémiaire, s'engraissent promptement. Au bruit du chasseur, la caille se tapit sur terre, ne se lève pas ordinairement quoiqu'il passe

JOURS.

fort près d'elle. En imitant son chant avec un *appeau*, on l'attire dans le filet. Sa chair est délicate. 15.

*Œillet* des jardins, plante vivace, toujours verte; fleurs variées, simples, doubles. Les semis de graines bien choisies, fournissent de belles variétés; quelques-unes donnent des fleurs toute l'année. L'œillet se multiplie aussi de marcotte, de bouture; craint les fortes gélées. On fait du ratafia avec les pétales d'une espèce à fleur rouge, qu'on cultive, à cet effet, en grand. Les fleurs simples plaisent aux abeilles. 16.

*Sureau*, grand arbrisseau, qui se multiplie de graine, de marcotte, de bouture : variétés à feuille découpée, à feuille panachée de jaune, de blanc, à fruit blanc. Le bois des vieux pieds est dur, utile au tabletier, supplée au buis; ses branches servent à faire des lignes à pêcher; ses fleurs blanches sont recherchées des abeilles, parfument le vinaigre, se mangent frites. Le sureau fait de bonnes haies; celui du Canada est agréable en bosquet, par la beauté de ses fruits rouges. 17.

*Pavot*, plante annuelle, laiteuse; 18.

fleurs simples ou doubles, couleur
18. variée. Les simples sont cultivées en grand pour la graine qui est abondante, se mange verte, donne une émulsion douce, agréable, saine. On fait avec la graine mûre, sèche, l'huile d'*œillette*, bonne à manger, utile aux peintres. Le suc laiteux de la capsule fournit l'*opium*, dans les pays chauds; c'est la seule partie de la plante qui soit narcotique.

19. *TILLEUL*, grand arbre de l'Europe qui acquiert jusqu'à cinq pieds de diamètre, aime les terreins frais. Il y a des variétés à grandes, à petites feuilles, à bourgeons rouges ou de Hollande. Ses fleurs odorantes sont très-recherchées des abeilles qui en retirent un miel qu'elles séparent soigneusement de celui des autres plantes. Avec la fleur on fait une boisson théiforme; avec la graine, une sorte de chocolat; avec la seconde écorce, des cordes, des nattes plus ou moins fines, et des chaussures. Son bois tendre, mou, ploye facilement, sert à la sculpture commune.

20. *FOURCHE*, instrument aratoire de deux espèces; la première en bois, à deux, trois ou quatre branches

ordinairement d'une seule piece; on durcit les fourchons en les passant au feu. On les arme de cornes de chèvre, afin de les rendre plus durables, plus pénétrans, plus faciles, pour remuer, retourner, mêler, écarter, rassembler, enlever, charger, décharger le foin, la paille, les gerbes. La deuxieme en fer, à deux ou trois branches, plus courtes, recourbées, pour remuer, charger, décharger, étendre le fumier, ou pour remuer la terre des jardins, et en retirer les mauvaises herbes avec leurs racines. | 20.

*Barbeau*, plante annuelle des champs, cultivée dans les jardins; se seme avant l'hiver dans un terrein léger, offre beaucoup de variétés à fleurs bleues, blanches, roses, puces, violettes, panachées. | 21.

*Camomille Romaine*, plante vivace, basse, traînante, fleurs simples ou doubles; cultivée dans les jardins: les bestiaux ne l'aiment pas. Les fleurs, sur-tout les doubles, sont employées comme du thé. Elles donnent, par la distillation, une huile essentielle d'un beau bleu. | 22.

*Chevrefeuille*, arbrisseau sar- | 23.

menteux, sauvage, cultivé ; fleurs en
23. bouquet agréables, d'une odeur suave, de couleur variée. Ses branches flexibles forment des palissades, grimpent le long des arbres et retombent en guirlandes. L'espece d'Italie est la plus connue ; elle est printaniere et se dépouille. Les variétés sont : 1°. une toujours verte à fleurs rougeâtres très-odorantes ; 2°. de Masboix, fleurs odorantes ; 3°. de Hollande, tardive, feuille de chêne, verte, panachée ; 4°. de Virginie, fleurs très-rouges, inodores ; 5°. de Mahon, de l'Amérique septentrionale, fleurs petites.

24. *Caillelait*, plante vivace : deux especes ; l'une à fleurs jaunes, l'autre à fleurs blanches. Ses racines fournissent une couleur semblable à la garance ; elles n'ont pas, comme on le croit, la propriété de cailler le lait.

25. *Tanche*, poisson d'eau douce du genre de la carpe ; corps plus alongé, couvert de très-petites écailles et d'une mucosité savonneuse, abondante ; front plus large ; yeux plus petits ; de très-petits barbillons à chaque coin de la bouche ; nageoire de la queue arrondie,

arrondie, sans échancrure; onze arêtes à la nageoire de l'anus ; celle du ventre plus grande dans le mâle. couleur noirâtre tirant sur le verd, le jaunâtre, suivant son âge et la qualité des eaux. La tanche est très-vive, très-vivace ; elle se plaît dans les fonds limonneux des étangs, des rivieres ; multiplie beaucoup : on la prend à la ligne amorcée de vers dont elle est très-friande. Sa peau est épaisse ; sa chair blanche, mollasse cuit difficilement, est peu savoureuse, est indigeste. 25.

*JASMIN BLANC*, originaire d'Asie, arbrisseau sarmenteux, cultivé dans les jardins ; il craint les grands froids ; ses fleurs très-odorantes communiquent leur parfum aux huiles grasses, à l'esprit-de-vin. Le jasmin d'Espagne à grandes fleurs se greffe sur le commun. 26.

*VERVEINE*, plante annuelle, devenue célebre dans l'antiquité par le charlatanisme des prêtres. 27.

*THYM*, plante basse, ligneuse, très-aromatique, cultivée en bordure dans les jardins ; variétés à feuilles larges ; contient du camphre ; entre 28.

28. dans les parfums ; sert d'assaisonnement dans les alimens.

29. *PIVOINE*, plante vivace, fleur simple, double, racines charnues contenant de l'amidon ; cultivée dans les jardins. On distingue deux variétés improprement nommées *mâles*, *femelles*. La premiere a ses feuilles d'un verd foncé, son fruit plus rond, plus gros.

30. *CHARIOT*, *Char* à quatre roues, dont les deux antérieures sont plus petites, quelquefois de même grandeur que les postérieures. *Charrette*, *tombereau*, *fardier* à deux roues, à bascule ou non, à timon ou à limonniere ; à essieu de fer ou de bois, dont un sert pour deux roues ; ou à essieu plus court, dont un pour chaque roue. Dans le premier cas, l'essieu est fixé au char, les roues tournent autour des extrêmités ; dans le second, il est fixé dans le moyeu de la roue, et tourne avec elle. Cette derniere disposition laisse libre le milieu du char, et permet de descendre le fardeau, pour que le centre de gravité soit dans la ligne de *tire*. Pour diminuer le frottement de l'essieu, on l'entoure de petites roulettes placées

dans le moyeu, où l'on y met du cambouis, de la graisse. Les Tartares de Crimée emploient à cet usage le bitume liquide dont ils ont plusieurs sources. Le diametre des roues devroit être tel que le centre répondît à la poitrine de l'animal. Les jantes larges de 9, 12, 15 pouces, sont préférables pour applanir, consolider, conserver les chemins. On fait des roues à une seule jante, en recourbant la piece de bois encore verte, ou en la ramollissant à la vapeur de l'eau. En Russie où ces jantes sont fort communes, les deux bouts de la piece de bois recourbée ne se touchent pas; on laisse un intervalle d'environ deux pouces. On recouvre la jante de plusieurs ou d'une seule bande de fer forgé ou coulé, fixée avec des clous saillans, ce qui est pernicieux pour les chemins, ou à clous noyés, ou même sans clous. 30.

On attèle au char des chevaux, bœufs, mulets, ânes, en en mettant un, deux, trois ou quatre de front ou de file. Dans cette dernière disposition les animaux sont attachés aux mêmes traits; les plus ardens ont alors à traîner et le char et les pa-

30. résseux. Dans quelques endroits les traits de chaque couple viennent se rattacher au timon ; on rassemble, on soutient tous ces traits dans un tuyau aisé de cuir. On peut faire tirer ensemble et de front deux animaux d'inégale force, en les attelant à un même palonnier, plus long du côté de l'animal le moins fort.

## MESSIDOR, Xe. MOIS.

*Mois des Moissons.*

1. SEIGLE, plante céréale, annuelle. On cultive deux variétés : celle d'hiver, *gros seigle ;* celle d'été, *petit seigle.* Il réussit dans les terres légères, meubles, et dans les climats froids. Semé de bonne heure, on peut le faucher pour fourrage avant que le tuyau monte ; il repousse ensuite sans que la récolte en souffre, sur-tout s'il survient de la pluie peu de temps après. Le seigle voulant être confié à une terre sèche et le froment à une terre mouillée, on a tort de les mêler en les semant

pour faire du *meteil* ou *conſeigle* ; l'un des deux manque ordinairement ; ils ne mûriſſent pas également & la mouture s'en fait mal : il vaut mieux les semer, les moudre séparément, mêler ensuite les farines ; elles donnent un pain savoureux, long-temps frais. Le seigle bien mûr donne moins de son, plus de farine. 1.

Dans le Nord, on préfère pour le pain, le seigle au froment. On en fait des galettes dures comme le *biſcuit de mer* ; elles se conservent toute l'année.

Le grain mis à germer, ensuite paſſé au *touroir*, eſt réduit en une farine rousse, sucrée, qui se conserve & sert dans les voyages. En la pêtriſſant avec de l'huile, du lait ou des sucs de fruits, selon la saison, les ressources, on la mange dans le Nord, sans autre apprêt et sans être cuite : elle eſt très-nourrissante. Avec de l'eau, elle fermente, donne de l'eau de-vie par la diſtillation. Le seigle entre dans le café, dans le pain-d'épice. Lorſque le seigle ne mûrit pas on le sèche au four, on sépare le grain non mûr qu'on mange en hiver, préparé comme des petits pois.

La paille longue, flexible, soignée

dans le battage, sert à attacher la
1. vigne, les jeunes arbres; à faire des liens, empailler des chaises, couvrir les habitations. Pour rendre ces couvertures plus solides, plus unies, et les mettre à l'abri du feu, on trempe la paille verticalement dans de la terre glaise délayée, et après l'avoir placée, on fait un enduit général avec la même terre.

Le seigle est sujet à une maladie; le grain grossit dans l'épi, s'alonge quelquefois de plus d'un pouce, se courbe; c'est l'*ergot* noir en dehors, blanc en dedans, ferme: il est dangereux pour les hommes et les animaux.

2. *AVOINE*, plante céréale, annuelle. Deux espèces sont cultivées: la *commune*, la *nue*. La première donne les variétés *noire*, *blanche*, *blanche du Nord*. Il y a une noire d'hiver et une de printemps; la blanche se sème dans cette saison; la blanche du Nord, en automne dans les climats tempérés et au Sud; au printemps, dans le Nord et le Sud. La *nue* quitte facilement sa balle, se sème avant et après l'hiver.

L'avoine fauchée ne doit pas javeler; sa paille verte, sèche, convient aux bestiaux, sur-tout aux vaches. Son grain a peu de farine; on en fait

des gruaux, du pain, de la bière, de l'eau-de-vie; il excite les poules à pondre, fait une bonne nourriture pour les chevaux, les soutient dans le travail. On ne doit pas les faire boire après qu'ils en ont mangé. 2.

*OIGNON*, plante bisannuelle, potagère, bulbeuse, originaire d'Afrique: variétés, rouge, pâle, blanc, rouge et blanc (oblong), blanc de Florence, hâtif et rond, prolifère, ou qui donne des bulbes sur sa tige; saveur forte et piquante, sur-tout dans le Nord; plus douce au Midi. L'oignon contient du sucre et du soufre; se mange crud, cuit, confit; assaisonne les mets: les variétés rondes, rouges, pâles et blanches, sont les plus cultivées; la rouge se conserve plus long-temps, a un peu plus d'âcreté. 3.

*VÉRONIQUE, Thé d'Europe*, improprement nommée mâle; plante vivace, rampante des bois; fleurs en épi bleu; peut se cultiver dans les jardins; est d'usage en médecine. 4.

*MULET*, produit de l'âne et de la jument; *bardeau*, produit du cheval et de l'ânesse, espèce mêlangée. 5.

Le mulet est plus grand, plus gros, a l'avant-main mieux fait, l'encolure plus belle, mieux fournie, les côtes

5. plus arrondies, la croupe plus pleine, la hanche plus unie.

Le bardeau a l'encolure plus mince, le dos plus tranchant, la croupe plus pointue et avalée.

L'un et l'autre tiennent plus de leur mère que de leur père pour la grandeur et la forme du corps.

Le mulet a la tête plus courte, plus grosse que celle du cheval, les oreilles plus longues, la queue presque nue, les jambes sèches comme l'âne.

Le bardeau a la tête plus longue, moins grosse à proportion que celle de l'âne, les oreilles plus courtes, la queue garnie de crin, les jambes fournies comme le cheval.

L'un et l'autre tiennent plus de leur père que de leur mère par la tête et les extrêmités du corps.

Le mulet est sobre, peu maladif; soutient de longues fatigues, porte de gros fardeaux, a le pied sûr; va hardiment sur le bord des précipices, dans les montagnes, les mauvais pas, si on l'y accoutume jeune. Il est craintif, rusé, souvent capricieux. Le mulet est plus fort pour le travail, la mule préférable pour la monture.

Dans les climats chauds, le mulet

peut engendrer, la mule peut produire, mais rarement. 5.

*ROMARIN*, arbrisseau du midi de la France, toujours verd, très-aromatique, cultivé dans les jardins; craint le grand froid; fournit beaucoup aux abeilles; donne une huile essentielle, qui peut remplacer le camphre; entre dans les parfums; assaisonne certains mets; vient aisément de bouture. 6.

*CONCOMBRE*, plante cucurbitacée, annuelle. Ses variétés sont le blanc, le jaune, celui à gros fruits; des variétés hâtives donnent un fruit plus petit; une verte dite *à cornichon* se blanchit et se confit au vinaigre, au sel. L'usage du cuivre pour augmenter, conserver leur couleur verte eſt très-dangereux et sans but. La culture ordinaire fournit des concombres pendant cinq mois; sous le chassis, on en a plus long-temps. Il se mange crud, cuit; ses semences donnent de l'huile, font partie des quatre semences froides. 7.

*ÉCHALOTE*, plante vivace, bulbeuse, potagère, originaire de Palestine; demande une terre légère; se plante plus avantageusement avant qu'après l'hiver; sert d'assaisonnement 8.

aux alimens; a une saveur moins forte
8. que l'ail, l'oignon. Quelques variétés sont plus grosses; mais la petite se conserve plus long-temps.

9. *ABSYNTHE*, plante vivace, ligneuse, très-amère, aromatique, cultivée dans les jardins. Elle assaisonne les boissons fermentées, notamment la bière; on en fait un vin médicinal et une liqueur de table.

10. *FAUCILLE*, instrument du moissonneur: lame mince de fer & d'acier courbée dans son plan en demi-cercle plus ou moins ouvert, pointue par un bout, emmanchée par l'autre dans le même plan, ou dans un plan parallèle; cette dernière manière fatigue moins l'ouvrier, coupe la paille de plus près. La longueur, la largeur de la lame varient suivant les lieux; elle est sans dents au tranchant, ou avec des dents très-fines sur une seule face, inclinées du côté du manche. On en fabrique dans plusieurs départemens. Cet instrument est plus usité qu'aucun autre pour *scier* les *blés*.

11. *CORIANDRE*, plante annuelle, originaire d'Italie, cultivée en grand; fraîche, son odeur est désagréable; sa graine sèche est agréable, aromatique. On l'emploie dans la bière blanche, les ratafias: on en fait des

dragées. Elle se sème avec plus de succès avant l'hiver, sur-tout dans les parties tempérées et méridionales. 11.

*ARTICHAUD*, plante vivace, de la famille des chardons, originaire de Barbarie. Ses variétés sont le verd, le blanc, le violet, le sucré de Gênes. Il craint le froid. Le cul de l'artichaud se mange crud, cuit; se conserve desséché après une demi-cuisson, ou confit au sel. La côte des feuilles de la plante blanchies à la manière des cardons, se mange aussi. L'artichaud se multiplie de graines, d'œilletons, de drageons; de graine, est sujet à dégénérer, sur-tout les petites variétés. La graine de deux à trois ans dégénère moins; elle lève encore la sixième année. 12.

*GIROFLÉE* (*grosse espèce*), plante bisannuelle, du sud de l'Europe; fleurs simples ou doubles, blanches, rouges, violettes, ou couleur de chair, d'une odeur agréable; variété à grand rameau, a l'odeur du girofle. La giroflée orne les jardins; craint le froid. 13.

*LAVANDE* (*commune*), arbuste très-aromatique, du sud de la France, à fleurs bleues, blanches. Elle craint le grand froid, est cultivée dans les jardins; entre dans les parfums; donne 14.

14. à la distillation une eau odorante, une huile essentielle.

15. *CHAMOIS*, *Ysar*, quadrupède de la grandeur de la chèvre, à pied fourchu, jambes hautes, dégagées, poil extérieur rude, court, fauve, bruniſſant avec le froid; poil intérieur plus court, fin, touffu; cornes de 6 à 9 pouces, noires, inclinées en avant, droites, pointues, le bout recourbé; yeux grands, ronds, pleins de feu; odorat, ouie très-fins.

Il habite la région des neiges, les rochers sourcilleux, les plus hautes forêts de sapins, mélèses, hêtres; craint la chaleur et le froid excessifs; cherche en été le nord des montagnes, et en hiver le midi, les vallons; va à la pâture le matin, le soir, jamais dans le jour; se nourrit des parties tendres, délicates des plantes aromatiques, chaudes, comme de la *carline*, du *génipi*; en hiver, gratte la neige pour découvrir des feuilles; boit peu, rumine, lèche les rochers salpêtrés juſqu'à les creuser.

Les chamois vont par troupeau de 5, 10, 20 et jusqu'à 100; les gros mâles s'en tiennent éloignés. Ils entrent en rut vers brumaire; ont alors l'odeur du bouc, mais plus forte. La femelle

prend le mâle à un an et demi, porte environ cinq mois, un, quelquefois deux petits. Le chamois a un bêlement fréquent et fort bas, la femelle s'en sert pour appeller ses petits. 15.

Il est vif, agile, vigoureux, timide; s'élance de rocher en rocher; en bondissant deux ou trois fois sur leur escarpement le plus rapide, il se précipite de 20 à 30 pieds de hauteur; il marche d'un pas ferme sur la glace, si elle n'eſt pas trop unie.

Le plus léger bruit fixe son attention; il peut sentir un homme de demi-lieue à la faveur du vent; il est alors inquiet, cherche de l'œil, en s'élevant sur une éminence, ce qui frappe son oreille, son odorat; jette l'alarme dans le troupeau en poussant un sifflement très-aigu, prolongé; frappe la terre du pied; et aussitôt qu'il découvre quelque chose, il fuit, et toute la bande avec lui.

Sa chasse est difficile, pénible, périlleuse; le chien ne peut le suivre dans les précipices. Le chasseur doit être adroit, intrépide, patient, infatigable. On l'atteint à l'aide d'une carabine rayée, chargée à balle forcée, à deux coups dans un même canon. Sa chair est bonne à manger; il donne

10 à 12 livres d'un suif excellent ; son
15. sang est recherché ; ses cornes se détachent aisément de leur noyau et sont employées ; sa peau bien préparée, est forte, nerveuse, souple, très-estimée pour faire des gants, des veſtes, des culottes de fatigue.

Le chamois se mêle quelquefois de lui-même aux chèvres ; comme elles, est sujet au vertige ; il descend alors dans les pâturages, et se laisse prendre. Il peut s'apprivoiser, vivre avec les chèvres, en prendre les mœurs. Il vit de 20 à 30 ans.

16. *TABAC*, plante annuelle, originaire de l'Amérique méridionale, en Europe depuis 1560 ; demande une bonne terre, multiplie beaucoup. Sa culture, la récolte de ses feuilles, leur dessiccation, leur préparation exigent de très-grands soins, occupent beaucoup de bras de tout âge, font tort à d'autres cultures plus utiles. Il y a une variété à feuilles étroites, une autre appellée tabac du Mexique ou rustique : tous les noms du commerce se rapportent à la première. Le tabac de *Clérac*, de *Tonneins-la-Montagne*, jouissent d'une grande réputation. La feuille séparée de sa *côte* ou *nervure*, et préparée, se mâche, se fume, ou

se prend en poudre; on fait avec la côte un tabac de moindre qualité et moins foncé en couleur. La fumée de tabac fait périr les insectes ses tiges, ses côtes brûlées, donnent beaucoup de potasse. Sa graine est très-fine, abondante, et fournit de l'huile. 16.

Elle doit être semée en terre bien préparée et peu couverte.

*GROSEILLE*, fruit du groseillier arbuste, dont trois espèces sont cultivées dans les jardins: la première originaire des bois, à fruits rouges, couleur de chair, ou blancs, en grappes, qu'on peut conserver sur la tige, sans se dessécher, jusqu'au commencement de brumaire, en les empaillant un peu avant la maturité: ils perdent de leur acidité. On mange ces groseilles fraîches, en gelée ou confites au sucre; on en fait du sirop et du vin. 17.

La seconde espèce est le *cassis* originaire des bois humides, à fruits noirs en grappes, dont on fait un ratafia, en y ajoutant une poignée de ses feuilles.

La troisième épineuse donne la groseille à maquereau, auquel elle sert d'assaisonnement en place de verjus.

Ce fruit qui varie en forme, couleur, saveur, a sa peau lisse, ou

17. couverte de poils; il se mange frais, cuit, et fournit une boisson fermentée très-agréable.

18. *GESSE*, plante annuelle, cultivée en grand pour sa graine, dont on nourrit la volaille, les pigeons, et pour le fourrage qu'elle fournit aux bestiaux. Une variété à fleur, à fruits blancs, improprement appellée *lentille d'Espagne*, se mange en verd comme les petits pois; sèche, fait une bonne purée.

19. *CERISE*, fruit à noyau du cerisier, arbre originaire de l'Asie, de l'Europe, sauvage, cultivé. Tous les fruits de ce genre forment deux divisions.

1°. Les cerises en cœur, *merise*, *guigne*, *bigarot*; chair ferme, cassante, douce: les arbres de cette division sont plus élevés, plus gros, moins garnis que ceux de la suivante.

2°. Les cerises rondes, *cerise* proprement dite, *griotte*. La *cerise* varie du rouge foncé au rouge pâle; il y en a d'ambrée, de jaunâtre: sa saveur est plus ou moins douce, acide: la *griotte* est noirâtre, sucrée.

Ce fruit donne de prairial en fructidor; se mange crud, cuit, confit au sucre, à l'eau-de-vie; se conserve sec: on en fait du vin, de l'eau-de-

vie (*kirschvasser*), et du ratafia. 19.

On greffe ordinairement les cerisiers en fente, en écusson, sur merisier et sur leur espèce levée de noyaux, de drageons; on préfère le merisier pour avoir de grands arbres; l'écusson reprend mieux sur le merisier à fruit rouge que sur celui à fruit noir.

Les cerisiers venus de noyau peuvent donner des variétés intéressantes.

*PARC*, enceinte faite dans les champs pour renfermer pendant la nuit, les bêtes à laine, à l'aide de claies mobiles, légères, en branches tressées, ou autrement, soutenues par des piquets, et assez élevées pour être inaccessibles aux loups; il doit être changé de place au moins chaque jour. L'usage du parc, si utile à la santé des moutons et à l'engrais des terres, sur-tout lorsque le labour suit immédiatement, devroit être adopté dans tous les départemens. 20.

*MENTHE* : deux espèces; vivace, cultivée dans les jardins; l'une, le *baume* très-aromatique, se mange dans les salades; l'autre, la *menthe poivrée*, saveur piquante, aromatique, fournit beaucoup d'huile essentielle avec laquelle on fait des pastilles qui laissent dans la bouche une sensation de fraîcheur. 21.

22. *CUMIN*, plante annuelle, originaire d'Egypte; graine très-chaude, aromatique; cultivée en grand à Malthe; les pigeons l'aiment beaucoup. Il ne faut pas le confondre avec le cumin recherché par les Suisses et les Allemands, qui est le *carvi*.

23. *HARICOT*, plante légumineuse, annuelle, originaire de l'Inde, sensible au froid, grimpante sur des rames, ou basse et sans rames; semences ordinairement en rognons, contenues dans une gousse avec ou sans parchemin, de couleur, de grosseur différentes. On compte plus de cinquante variétés.

L'haricot verd se mange cuit, se conserve confit, séché. L'haricot mûr se conserve dans sa gousse, ou écossé; n'est attaqué par aucun insecte, se mange cuit, se réduit en farine pour les voyages, se conserve plusieurs années dans cet état. La farine d'haricot fait un mauvais pain et une bonne purée.

24. *ORCANETTE*, petite plante du sud de la France; racine pivotante, dont l'extérieur fournit une couleur rouge à la teinture et autres arts; les ébénistes la font bouillir dans l'huile pour en colorier leurs bois.

*PINTADE*, *Poule perlée*, originaire d'Afrique : oiseau de basse-cour ; tête petite, nue, surmontée d'une corne, d'une callosité ou d'une huppe ; bec court, fort, en cône recourbé ; corps arrondi sur le dos ; la queue pendante en continue la courbure ; plumage marqué de petites taches rondes. Elle est hardie, inquiète, pétulante ; attaque les poules, les dindons à coups de bec, les met en fuite ; est criarde ; se perche pour dormir ; s'apprivoise très-bien. La femelle sauvage pond dix à douze œufs à terre, dans les broussailles. La femelle domestique dépose dans son nid jusqu'à cent cinquante œufs, pourvu qu'il en reste toujours quelques-uns. Ils sont d'un rouge blanchâtre, tachetés, plus petits, plus arrondis que ceux de la poule ; la coque en est épaisse. La chair de la pintade, sur-tout celle des pintadeaux, est très-estimée. 25.

*SAUGE*, arbuste toujours verd, aromatique, du sud de la France ; à grandes, moyennes ou petites feuilles ; à fleurs bleues, blanches ou panachées. Elle craint le très-grand froid ; entre comme assaisonnement dans plusieurs mets, sert à parfumer, fournit par la distillation une huile essentielle. 26.

27. *AIL*, plante vivace, bulbeuse, potagère, originaire de Sicile; ses racines, ses feuilles ont une odeur pénétrante. L'ail est cultivé en grand, se mange crud, cuit; assaisonne les viandes, est plus âcre dans le Nord, fait un objet de commerce dans le Midi. Il contient du soufre tout formé.

28. *VESCE*, plante légumineuse annuelle, cultivée en grand pour sa graine qui est la nourriture principale des pigeons. Mêlée en petite quantité à l'avoine, elle en augmente, pour les chevaux, la qualité fortifiante. La plante fait un bon fourrage en verd, en sec, sur-tout pour les agneaux; le grain semé après la vesce est moins beau qu'après le trèfle. Il y a une variété d'hiver, une autre de printemps, et une à graine blanche dont on fait une purée saine. La vesce enterrée lorsque la fleur paroît, fait engrais.

29. *BLÉ*, *bled*, nom de toute la famille des céréales qu'on donne aussi, mais improprement, au *froment* qui fait le sujet de cet article.

On compte plusieurs espèces ou variétés de froment;

1°. Le printanier ou *marsin*; il supplée à celui d'automne;

2°. Le printanier de Pologne à

29.

longue barbe; il croît vîte, produit plus dans les climats chauds et tempérés, en le semant en automne;

3°. Le froment d'automne, de printemps à barbe variable;

4°. Celui d'automne à barbe très-courte ou sans barbe;

5°. Le froment renflé d'automne avec ou sans barbe;

6°. L'*épéautre* d'automne, de printemps avec ou sans barbe, à une seule loge, à épi blanc, rouge.

On doit ajouter le *bled de Smyrne* ou d'*abondance* qui exige une terre excellente, se sème très-clair en automne, au printemps, doit être plus enterré que les autres. Les oiseaux en font un grand dégât; il est sujet à dégénérer.

La *tourzelle* est regardée comme une variété du froment.

Celui d'automne se sème de vendémiaire en frimaire, même en nivôse; celui de printemps se sème en ventôse. On préfère celui d'automne à grain et épis blancs sans barbe; froment de Barbarie à paille pleine.

Le froment est sujet à deux maladies:

1°. *La carie* connue sous les noms de *cloque*, *boque*, *chambuque*; pous-

29. sière fine, d'un brun foncé, odeur fétide, grasse au toucher, s'attachant à tout, contagieuse, attaque l'épi; on l'en garantit par un bon chaulage de la semence;

2°. Le *charbon*, poussière fine, noire, sèche, légère, que le vent emporte; il ne reste que le squelette de l'épi; elle n'est pas contagieuse.

Le froment se sépare aisément de sa balle, contient plus que tout autre grain de la *matière sucrée*, de l'*amidon*; il contient en outre un *gluten*: aussi est-il le plus propre

1°. A donner de l'*eau-de-vie*; mais cet usage seroit un crime au milieu de nos riches vignobles qui produisent une eau-de-vie supérieure;

2°. A faire de l'*amidon*; plusieurs plantes très-communes dans tous nos climats, et encore inutiles, abondent en amidon, et doivent pour cet usage remplacer le froment;

3°. A faire un très-*beau pain*, le *bsicuit de mer* qui se conserve le mieux, de bonnes pâtisseries, le *vermicelle*, les *lazanes*, etc.

C'est à cette troisième destination que doit être consacré tout le froment de la République, qui ne doit plus permettre qu'on enlève à l'utile ou-

vrier une partie de son pain, pour le convertir en eau-de-vie inférieure à celle du vin, et en amidon qu'on peut se procurer autrement et à moindre frais pour fournir aux besoins moins pressans de la toilette. 29.

La mouture économique retire huit produits distincts du froment. On peut obtenir de 85 à 90 livres de farine par quintal. Pour connoître l'état d'une farine, on en fait une boulette qu'on pêtrit ensuite dans la main, sous un petit jet d'une eau propre, froide; l'amidon, la matière sucrée, le son s'écoulent avec l'eau; il reste une matière tenace, élastique, collante, c'est le *gluten* qui abonde dans les bonnes farines, diminue, disparoît dans celles qui s'altèrent. La paille nourrit les animaux, couvre des habitations, sert à d'autres usages.

*CHALÉMIE, Cornemuse, Chèvre*, instrument à vent de musique champêtre composé d'un chalumeau, de deux bourdons inégaux à l'unisson, d'un porte-vent et d'un sac de peau destiné à donner un vent continu en soulageant celui qui en joue. La *musette* n'est que la cornemuse perfectionnée. 30.

Que les enfans de l'égalité se rassemblent les décadis pour chanter

30. l'amour de la patrie, les vertus, le courage, les victoires de ceux qui la servent et la défendent, et pour danser au son de la chalémie, sous l'arbre de la liberté !

## THERMIDOR, XI^e. MOIS.

*Mois de la Chaleur.*

1. *ÉPÉAUTRE*, espèce de froment d'automne, de printemps, à épi blanc ou rouge, avec ou sans barbe. On distingue une grande, une petite variété. Le grain de la première adhère à la balle, donne beaucoup de son et une farine dont on fait un pain de bon goût, très-blanc, léger, mais qui sèche promptement; elle est recherchée pour la pâtisserie.

L'épéautre réussit dans les terres légères, est long-temps à mûrir, doit être semé de bonne heure. Les bestiaux se soucient peu de sa paille; sa balle mêlée avec un peu d'avoine, fait une bonne nourriture pour les chevaux.

2. *BOUILLON-BLANC*, *Moline*, plante

plante bisannuelle, des lieux secs ; beau port ; belles feuilles couvertes d'un duvet ; fleurs jaunes, odorantes, attachées en pyramide sur une tige droite, forte. Cette plante mériteroit d'être cultivée dans les jardins; elle est d'usage en médecine. 2.

*MELON*, plante cucurbitacée, rampante, annuelle, à fleurs mâles et femelles séparées sur le même pied, originaire d'Afrique, cultivée dans les jardins. Le fruit porte le nom de la plante. Le melon aime la chaleur, la sécheresse, veut une terre substantielle, amendée, ameublie. Dans les climats tempérés, froids, on le cultive sous cloches, vitraux, ou mieux, sous chassis. Les fleurs femelles sont suivies de fruit, lorsqu'elles ont été fécondées par la poussière des fleurs mâles ; si l'on coupe celles-ci trop tôt, les premières restent stériles. On garantit le melon de l'humidité de la terre, et l'on aide à sa maturité en le plaçant sur une tuile, dès qu'il a besoin d'être soutenu. Les variétés nombreuses de cette plante sont dans la forme, la grosseur, la couleur, la broderie des côtes et la saveur du fruit. Les melons dégénèrent lorsque, trop voisins, ils se communiquent la poussière de leurs 3.

3. fleurs, ou peuvent recevoir celle de la citrouille, du potiron. Quelques melons pèsent de trois à quatre onces; d'autres jusqu'à trente-six livres. Le melon le plus commun est le *maraicher*; ceux de *Coulommier*, de *Honfleur*, sont très-gros; le premier est rond, plein, bien brodé; le second est long, à côtes peu saillantes, grosse broderie; celui-ci est plus franc lorsqu'il est semé de petites galles sur un fond verd. Les meilleurs melons sont les *cantaloups* remarquables par leurs grosses galles; on estime sur-tout ceux de moyenne grosseur à chair rougeâtre. Il y a des melons d'hiver à chair verte, à chair blanche ou *cavaillon*.

Le melon encore verd, petit, se confit au vinaigre: mûr, se mange crud. La côte de melon est bonne confite au sucre. La graine donne de l'huile. Les chevaux sont très-friands de la côte de melon.

4. *IVRAIE*, plante graminée, annuelle, à épi long, avec ou sans barbe, commune dans les terres à grain mal préparées, sur-tout dans les fromens, les orges qui n'ont pas été soignés. Son nom lui vient de sa qualité enivrante qu'elle communique au pain où elle entre en certaine quantité. C'est par de bons labours, de fréquens sar-

clages, qu'on détruit cette mauvaise plante, qui, sous le nom de *zizanie*, est devenue par-tout l'emblême de la discorde. 4.

*BELIER*, le mâle de la *Brebis*, originaire d'Asie; quadrupède domestique sans analogie dans l'état de nature, si ce n'est peut-être le *Mouflon*. Sa tête est petite, busquée, à deux ou quatre cornes rugueuses, tournées en spirale, quelquefois sans cornes: ses jambes sont déliées, son pied fourchu; sa queue plate épaisse, ou cylindrique et grêle; son corps long de deux à trois pieds, haut jusqu'à trente pouces, est couvert d'un poil lisse grossier, ou d'une *laine* courte, fine, frisée, douce, onctueuse dans quelques races; longue, sèche, forte, soyeuse dans d'autres. 5.

Un bon belier a l'œil vif, alerte, la tête large, les oreilles courtes, le chignon épais, le cou court, le fanon pendant, le dos large, les hanches bien effacées, les jambes courtes, le corps trapu; sa marche est libre, cadencée, ses mouvemens prompts; sa laine est fine, serrée, huileuse, d'un beau blanc, sans mêlange de *jarre* (1);

(1) Poil dur, luisant, cassant, plus

5. elle couvre le front, le ventre, les bourses, les cuisses et les jambes jusqu'au sabot. La pureté de la race se reconnoît à la ligne séparant les bourses, qui doit être très-marquée.

Le belier a peu d'intelligence, ne s'anime, ne se passionne que dans l'amour; alors il *dogue* de la tête, des cornes, prend des habitudes vicieuses contre les autres mâles, les brebis, l'homme même; il s'élance contre les arbres, les murs, les rochers; devient dangereux au troupeau, aux enfans, à lui-même, se blesse, périt quelquefois en doguant.

Dès l'âge d'un an il pourroit féconder les brebis; il se conservera plus long-temps, s'il ne commence qu'à dix-huit mois, deux ans, et si on ne lui donne que vingt, trente, jamais au-delà de cinquante femelles. Il produit jusqu'à huit ans.

Un bon belier peut, avec des brebis communes, régénérer un troupeau, en éloignant soigneusement ou coupant les agneaux mâles de chaque portée et laissant au troupeau les jeunes femelles. Après trois générations on

ou moins gros; il prend difficilement la teinture.

à une race presque égale à celle du belier, et les mâles de la quatrième peuvent être employés. La régénération est plus prompte avec des brebis à toison fine. 5.

Les belles races à laine courte sont dans l'Inde, en Afrique, en Espagne. Il en existe à Rambouillet un superbe troupeau à grand corsage, qui se soutient depuis neuf ans. On en vend tous les ans aux cultivateurs reconnus soigneux. Un troupeau de même qualité, mais de petite taille, se soutient à Montbard depuis trente ans. Cette espèce réussit par-tout où elle trouve une nourriture abondante, non aqueuse.

L'espèce à laine longue réussit mieux dans les climats humides, les terreins herbeux, comme l'Angleterre, la Flandre, la Hollande. La première est plus recherchée. Un beau troupeau de la seconde existe à Boulogne-sur-mer.

Les bergeries étroites, fermées de toute part, sont meurtrières; des hangards, des parcs sont préférables aux étables.

Dès l'âge de deux décades, & jusqu'à cinq mois, on coupe les *agneaux* mâles pour en faire des *moutons*. La castration les rend timides, stupides,

craintifs, plus foibles que le belier. Ils
5. s'effraient de peu de chose, se serrent alors les uns contre les autres, ou fuient tous ensemble. Ils grandissent moins que le belier; leur laine est plus courte, plus fine; leur chair plus tendre, plus grasse, plus agréable, sur-tout dans les terreins secs, élevés, couverts de plantes aromatiques, dans les terreins salés, et sur le bord de la mer.

Pour conserver une bonne race dans toute sa pureté, on doit réserver les plus beaux agneaux pour la reproduction, et ne faire subir la castration qu'à ceux qui ne sont pas dignes du choix.

Les bêtes à laine stupides, sans défense, exposées à la voracité d'une foule d'ennemis, devoient entrer dans le domaine du plus intelligent de tous: elles fertilisent les champs de l'homme, fournissent à ses besoins; elles furent le sujet de la première empreinte des monnoies, parce qu'elles furent de bonne heure un objet d'échange et un des plus puissans moyens de la prospérité des nations. *L'agneau* est le symbole de la douceur; le *mouton* est le symbole d'une imitation stupide et servile; le *belier*, chef du troupeau,

fut placé parmi les signes du zodiaque, et ouvre le printemps. 5.

C'est au milieu de cette saison que se fait la *tonte:* une forte *toison* en *suint* pèse jusqu'à quinze livres. La laine préparée, cardée, filée, sert à la fabrication des draps, ratines, serges, étamines et autres tissus; on en fait des bas, des gants, des bonnets tricotés, des étoffes, des chapeaux, des chaussures, des gibernes, des ceinturons feutrés.

La peau garnie de sa laine fait des pelisses, des manchons, des bonnets. Les fourrures d'Astracan sont des peaux d'agneaux morts-nés dont la laine est courte, noire, fine, luisante, moirée, satinée. La peau du mouton dépouillée de sa laine, préparée diversement fait des gants, des culottes, est employée sous le nom de *basane* à couvrir des livres, des porte-feuilles, des meubles; on en fait aussi le *parchemin* qui a servi à l'écriture avant le papier. Avec les rognures, les ratissures, on fait de la colle pour l'apprêt de la chaîne des étoffes de laine, de coton, & pour coller le papier à écrire.

*PRÊLE, Queue de cheval.* Sous ce nom sont comprises six espèces; 6.

trois des lieux très-humides, et trois
6. des lieux secs. Elles multiplient beaucoup ; sont difficiles à détruire à cause de leurs racines profondes. Une espèce sert dans plusieurs arts à polir et à recurer.

7. *ARMOISE*, plante vivace des lieux incultes ; feuilles très-découpées, très-petites ; d'usage en médecine.

8. *CARTHAME*, *Safran bâtard ;* plante annuelle, originaire d'Egypte, cultivée en grand ; ses fleurs sèches sont couleur de safran. On en retire un rouge pour les peintres et les femmes ; la teinture emploie le carthame pour teindre en rose, cerise, ponceau ; ses graines blanches, huileuses, connues sous le nom de graines à perroquet, sont bonnes pour la volaille. Le carthame peut orner les jardins.

9. *MURES*. Sous ce nom on peut comprendre deux espèces de fruits ; l'un, noir, bon à manger ; l'autre, blanc, sucré, fade, c'est celui du mûrier dont la feuille nourrit les vers-à-soie. Avec la mûre noire, on peut faire un vinaigre ; avec la blanche, un sirop qui suppléeroit au sucre.

10. *ARROSOIR*, vase en cuivre, en fer-blanc ou en terre, propre à arroser les plantes dans les jardins. L'eau se

verse par un goulot de grosseur, de longueur différentes, ou par une pomme percée de trous, et tombe en pluie afin d'humecter la terre sans la battre. L'arrosoir doit être large, bas. 10.

*PANIS*, petit millet à épi, annuel, originaire de l'Inde, cultivé en grand pour sa graine qu'on mange préparée de diverses manières. Les oiseaux en sont friands. 11.

*SALICOR*, plante annuelle des côtes maritimes, qu'on multiplie par la culture. Séchée, brûlée à petit feu dans un creux fait en terre, elle donne une *soude* sonnante, d'un gris bleuâtre, qu'on emploie dans la fabrication du savon, du verre, dans les lessives et le dégraissage des étoffes. La soude est une des bases du sel marin ou muriate de soude. On donne aussi le nom de salicor, *salicote*, à la cendre des *kalis*. On ne doit pas confondre la plante salicor avec la *passe-pierre* qu'on confit et qu'on mange comme les cornichons. 12.

*ABRICOT*, fruit à noyau de l'abricotier, arbre originaire d'Arménie, acclimaté dans les pays chauds, tempérés de l'Europe. 13.

Ses variétés sont le précoce, le

blanc, le commun, le Portugal, le
13. violet qui est médiocre, l'alberge, l'abricot pêche le plus gros de tous; sa chair rougeâtre a un goût vineux relevé. Les abricots *Angoumois*, d'Alexandrie, de Provence, de Hollande, ont l'amande douce.

Les noyaux mis en terre à la fin de l'été ou en automne, germent au printemps. On retarde d'un an, si on ne les met qu'après l'hiver. Ils donnent des variétés nouvelles.

L'abricotier se greffe sur *pruniers*; son fruit est meilleur sur les pruniers *damas* rouge, cerisette.

Les alberges et ceux à amande douce doivent se greffer sur pruniers élevés de noyaux; sur les autres sujets, ils sont pris par la gomme et ne s'unissent pas.

L'abricot verd est confit avant que son noyau ait durci; en maturité, on le mange crud, cuit, en compote, en marmelade; on en fait des confitures, des pâtes sèches qui se conservent long-temps; on le confit à l'eau-de-vie. Le noyau entier ou cassé entre dans le ratafia de noyau. Son amande fait l'orgeat et peut donner de l'huile.

14. *BASILIC*, plante annuelle aromati-

que, originaire de Perse, aime la chaleur ; on cultive plusieurs variétés dont les feuilles sont violettes, vertes, grandes, petites ou frisées. Le basilic sec conserve son odeur aromatique, entre comme assaisonnement dans quelques alimens, donne de l'huile essentielle. 14.

*BREBIS*, la femelle du belier ; sa laine est d'ordinaire plus fine et moins abondante que celle du mâle de même race. Elle peut recevoir le belier dès l'âge de 8 à 10 mois ; il convient à la conservation de la race, de retarder jusqu'à un an et demi ou deux. Elle entre en chaleur en été ; la fin de fructidor est le temps qu'on doit choisir pour la monte, afin qu'elles mettent bas à l'époque où elles pourront manger de nouvelles herbes. 15.

On dégrade un troupeau, si le mâle qu'on allie aux femelles leur est inférieur par la taille, les formes et le lainage.

L'amélioration des laines demande que les brebis soient bien nourries pendant la gestation ou la portée, surtout dans les premiers mois qui suivent l'approche du mâle. Les bons cultivateurs leur donnent alors de l'avoine et du son ; ils en reçoivent en re-

15 tour de beaux agneaux, de belles toisons.

La brebis porte cinq mois, un ou deux petits. Dans l'Inde, et en Hollande où il se trouve une race originaire de l'Inde, des brebis portent jusqu'à quatre agneaux.

Elle a quelquefois deux portées dans l'année, ce qui l'énerve et peut nuire à l'espèce.

Si une agnelette trop jeune est fécondée, on fait élever son fruit par une autre, le nourrissage pouvant lui nuire plus encore que la gestation.

Le lait de brebis est gras, agréable; on en fait des jonchées (fromage blanc); le fromage de Roquefort lui doit sa réputation; mais en privant les agneaux de leur lait, on appauvrit l'espèce. Cet usage doit être combattu par tous les amis de la prospérité publique, ainsi que l'usage plus funeste encore de livrer à la boucherie de tendres agneaux dont la chair est d'ailleurs indigeste et peu nourrissante.

Un terrein maigre, peu herbeux, ne convient qu'à la race de petite taille; on doit alors s'attacher à la finesse de la laine plutôt qu'à la quantité. Dix moutons de grande taille périroient sur un terrein maigre qui

pourroit cependant nourrir cent moutons de la petite taille. 15.

Dans un pâturage riche et sain, on doit préférer la race à grand corsage, telle que celle de Rambouillet.

Sur un terrein herbeux, mais frais, on doit placer la race d'Angleterre, de Flandre, de Hollande. Il existe un troupeau très-considérable de race angloise, au domaine des frères Delportes, à Boulogne-sur-mer.

*GUIMAUVE*, plante vivace des terres fortes cultivées ou incultes; sa racine charnue pivotante, très-mucilagineuse, entre par infusion dans la pâte de ce nom, dont la base principale est la gomme arabique. Sa feuille, sa fleur et sa racine sont d'usage en médecine; sa tige fourniroit une filasse qu'on pourroit utiliser. 16.

*LIN*, plante annuelle, cultivée en grand. Semé au printemps, en terre franche bien ameublie. Le lin se récolte en été et laisse la terre libre pour une autre récolte. On peut semer avec le lin quelques racines, comme panais, carottes. Ses tiges donnent une filasse douce, fine, forte, dont on fait les fils, les toiles les plus estimés. La graine est employée pour le mucilage abondant qu'elle contient; on en re- 17.

17. tire par expression une huile grasse, très-employée, sur-tout en peinture; le marc se donne aux bestiaux. Le lin, cultivé pour la graine doit être semé clair, sarclé et soigné; pour la filasse, il doit être semé dru.

18. *AMANDE*, fruit de l'amandier, grand arbre originaire d'Afrique. L'amande est douce ou amère; encore tendre, on en fait des compotes. On mange les amandes fraîches, sèches, en dragées, en pâtisseries; on en fait une émulsion, de l'orgeat; on en retire, par expression, une huile qu'on mêle avec de l'huile de noix pour les usages domestiques. Le marc en est employé sous le nom de pâte d'amande. Ses variétés sont à *petit fruit*, coque tendre ou dure, amande amère; à *gros fruit*, amandes douces ou amères.

19. *GENTIANE*, grande plante vivace, des montagnes; racine grosse, charnue, amère; feuilles larges; fleurs en épi, propres à orner les jardins; d'un grand usage en médecine, pour les hommes et les animaux.

20. *ÉCLUSE*, ouvrage de maçonnerie et de charpente destiné à retenir, élever, conduire les eaux, selon le besoin, dans un canal, une rivière, un port de mer. Elle sert:

20.

1°. A faciliter l'arrosement des terres arides, des prairies;

2°. A dessécher les marais pour étendre le domaine de l'agriculture;

3°. A donner le mouvement aux moulins, aux machines des ateliers, des manufactures;

4°. A empêcher l'invasion de la mer, des grandes eaux, dans une contrée;

5°. A gonfler les eaux d'un terrein bas pour en faciliter l'écoulement;

6°. A rendre une rivière navigable;

7°. A transporter une barque d'une rivière à l'autre, de l'Océan à la Méditerranée, en passant sur le sommet des montagnes, dans le fond des vallées, sur des ponts, des aqueducs et par des canaux souterrains;

8°. A curer, approfondir les ports, les chenaux. On charge l'écluse à marée haute, on l'ouvre à marée basse; le courant emporte la vase, le sable;

9°. A tenir les vaisseaux à flot dans le bassin où on les retire, afin de les garantir de la pourriture; à remplir ou vuider à volonté les formes où on les radoube;

10°. A introduire l'eau dans les fossés d'une place de guerre, ou en inon-

20. der les environs. Ce moyen a été employé pour la première fois, en 1426, pour la défense de Montargis.

C'est vers la fin du seizième siècle qu'on a commencé à se servir des écluses, pour l'avantage du commerce et des places maritimes.

Pour quelques-uns de ces usages, une *digue* et des *vannes* suffisent; pour les autres, l'écluse est composée:

1°. D'un fondement en pilotis lié par un grillage en bois et de la maçonnerie;

2°. De deux ailes de maçonnerie appellées *bajoyers*, qui s'élèvent des deux côtés, et laissent entre elles un espace qui est la *chambre* destinée à recevoir une barque, un train de bois, etc.;

3°. D'un *radier* ou plancher formant le sol de la chambre;

4°. De deux paires de portes busquées, l'une d'*amont*, l'autre d'*aval*, dont les ventaux s'arcboutent mutuellement; elles ferment la chambre et lui donnent la forme d'un hexagone.

Dans les écluses de mer, on met du côté du rivage, deux paires de portes, afin de partager la pression des eaux;

5°. D'un aqueduc dans les bajoyers,

ou d'un guichet dans les portes, pour élever ou baisser l'eau de l'écluse, sans ouvrir les portes ; 20.

6°. De cabestans pour ouvrir ou fermer les portes.

Pour élever une barque par le moyen d'une écluse dont la chambre est supposée remplie d'eau, on ferme les portes d'amont ; on ouvre l'aqueduc ou le guichet des portes d'aval pour que les eaux de la chambre descendent ; lorsqu'elles sont au niveau des eaux basses, on ouvre les portes d'aval pour introduire la barque ; on les referme ensuite : on ouvre le guichet d'amont, la chambre se remplit d'eau ; la barque s'élève : lorsqu'elle est au niveau des eaux supérieures, on ouvre les portes d'amont, et la barque sort de l'écluse.

Pour descendre, on fait l'opération inverse.

*CARLINE*, plante vivace, sans tige, des hautes montagnes ; son réceptacle couché par terre est aussi large qu'un artichaut et se mange. La caline est la nourriture du chamois. Elle s'épanouit ou se resserre suivant que l'air est humide ou sec. 21.

*CAPRIER*, arbuste des terres maigres, sèches ; belle fleur dont le bouton 22.

ppellé *capre* confit au vinaigre, sert
22. d'assaisonnement: on sépare les petites câpres des grosses, avec un crible. L'usage du cuivre pour leur donner la couleur verte, est très-dangereux; cet arbre craint le froid; doit être cultivé dans les endroits exposés au midi.

23. *LENTILLE*, petite plante légumineuse, annuelle, cultivée en grand dans les terres légères. Elle fait un bon fourrage en verd, en sec. Lorsqu'elle est mûre on la met en bottes, qu'on suspend pour la faire sécher sans qu'elle noircisse; ses gousses alors ne se vuident pas. C'est une mauvaise pratique que de la faire sécher sur la terre. La graine fournit une nourriture saine aux hommes, aux bestiaux; réduite en farine, on la mange en purée, ce qui vaut mieux que de la mêler au froment pour en faire du pain. Ses variétés sont la *blonde* large, la *rougeâtre* plus petite, plus délicate que les autres. Une petite blonde nommée *lentillon*, est cultivée pour fourrage.

24. *AUNÉE*, plante vivace des lieux humides; grandes feuilles; fleurs jaunes; sa racine, dans certains lieux se mêle aux alimens; contient du camphre; elle pourroit être cultivée dans les jardins.

25.

*LOUTRE d'eau douce*, quadrupède habitant les rivières, les lacs, les étangs, dans les parties septentrionales et tempérées de l'Europe, l'Asie, l'Amérique.

Elle a la queue épaisse, pointue, applatie; la tête petite, plate; le museau large; les moustaches longues rudes; les yeux très-près du nez; les narines en croissant; les oreilles petites, rondes; le cou court, gros; les cuisses courtes; cinq doigts unis par une membrane à chaque pied; le corps effilé, long de deux pieds, couvert d'un poil long, gris-cendré, la pointe d'un brun luisant, et d'un duvet court, touffu, soyeux la gorge, la poitrine, le ventre sont d'un gris blanchâtre.

Elle fait son nid sur le rivage, dans le creux d'un rocher, d'un arbre ou dans la terre, en pratiquant une entrée au-dessous de l'eau, un soupirail au-dessus. L'accouplement se fait en pluviôse; la femelle met bas en germinal trois à cinq petits.

Elle marche difficilement, nage bien, plonge, mais ne peut rester longtemps sous l'eau; se nourrit de grenouilles, d'écrevisses, de poissons, dont elle fait un grand dégât, moins

25. pour manger que pour détruire ; porte toujours sa proie à terre pour la manger ; se nourrit aussi d'herbe, d'écorce d'arbre. Elle est colère, se jette quelquefois sur l'homme, mord et ne lâche prise qu'en perdant la vie.

Les loutres vivent en société ; celle qui apperçoit un danger jette un cri ; à ce signal toutes plongent dans l'eau.

La chasse en est facile quand elles s'éloignent de l'eau, mais dangereuse pour les chiens. La peau en est meilleure en hiver, fait des gants, des bordures de bonnets ; son duvet sert dans la chapellerie ; sa chair a le goût de marécage.

La *loutre marine* est une fois plus longue, est légère à la course ; nage sur le ventre, le dos, le côté ; est alerte et gaie ; tendre, ardente en amour ; le mâle est fidèle à sa femelle qui porte huit à neuf mois un seul petit avec lequel elle joue sur l'eau, lui est attachée au point de suivre le chasseur qui le lui raviroit ; elle tombe dans le chagrin si elle le perd.

La loutre marine est recherchée pour sa peau, dont le poil touffu, d'un brun luisant, argenté à la pointe, est droit, et peut se coucher dans tous les sens ; le duvet en est épais, jaspé.

*MYRTE*, arbrisseau toujours verd des pays méridionaux; il craint le froid et l'humidité; ses feuilles très-aromatiques, entrent dans les parfums; ses baies astringentes servent dans la teinture et la tannerie. Ses variétés sont, à feuilles très-petites ou à grandes feuilles, à feuilles panachées, à fleurs doubles, dans celle-ci la feuille n'a pas d'odeur; le myrte à odeur de muscade, le romain; celui de Tarente et d'Andalousie. Le myrte donne une huile essentielle par la distillation; on le multiplie de graines, de boutures, de marcottes; son bois est dur. 26.

*COLSA*, espèce de chou, cultivé en grand pour sa graine, qui fournit une huile abondante, bonne à manger, très-employée et confondue mal-à-propos avec celle de navette. Les bonnes terres donnent une récolte abondante; les terres légères donnent une huile plus fine. Le colsa se sème en pépinière en messidor, est replanté en fructidor; la graine se récolte en messidor suivant, lorsqu'elle est bien mûre; les bestiaux mangent le marc qui reste après l'extraction de l'huile. Cette plante est une des plus précieuses pour alterner. Cultivée comme fourrage, elle fournit plusieurs récoltes dans l'année. 27.

28. *Lupin*, plante annuelle, originaire du Levant; fleurs blanches. Cultivé en grand, il réussit dans les mauvaises terres, aime la chaleur; lorsqu'il commence à fleurir, on peut l'enterrer comme engrais. Ses graines sont amères; les hommes, les animaux s'en nourrissent. Des variétés à fleurs jaunes odorantes, à fleurs roses ou bleues, sont cultivées dans les jardins.

29. *Coton*, duvet qui enveloppe les graines du *cotonnier*, plante annuelle ou vivace de la famille des *malvacées*, formant un *arbre*, ou simplement *herbacée*; fleurs jaunes ou pourpres; capsule de la grosseur d'un œuf ou un peu moins, sphérique ou ovale, quelquefois pointue, à trois ou quatre loges, renfermant plusieurs graines verdâtres ou noirâtres, lisses ou velues, adhérentes entre elles ou isolées, enveloppées de coton blanc, jaunâtre ou rougeâtre, plus ou moins long, fin et soyeux. Le coton vient naturellement dans les climats très-chauds, est cultivé dans les quatre parties du monde, fait une des richesses de nos colonies, vient bien au Cap de Bonne-Espérance dont la température approche de celle du Sud de la France où l'on commence à le cultiver.

29.

Parmi les productions étrangères, le café, le chocolat et le sucre flattent notre sensualité ; le coton plus utile le dispute à la laine, au chanvre, au lin et à la soie pour vêtir l'homme et remplir un de ses premiers besoins. C'est aux voyageurs botanistes à étudier sur les lieux les variétés les plus propres à nos climats ; c'est au commerce à prendre un nouvel essor pour fournir cette matière précieuse à nos manufactures dont l'activité doit être digne de l'industrie nationale.

Les espèces connues sont :

1°. Le cotonnier de Malte qui vient dans les terreins arides, sablonneux, sur les bords de la mer, et réussiroit en France. Il est herbacé, annuel en Europe ; est vivace et forme un arbrisseau dans quelques parties de l'Afrique. Il fleurit, fructifie dans les serres du Muséum de Paris ;

2°. Le cotonnier à petites fleurs d'Ispahan ;

3°. Le cotonnier en arbre de 10 à 15 pieds ;

4°. Celui de l'Inde ;

5°. Le cotonnier velu, capsule fort grosse, coton beau, fin, abondant ;

6°. Celui des Barbades ;

7°. Le cotonnier à feuilles de vigne

29. qui fleurit, fructifie au Muséum de Paris. Dans le pays on en mange les feuilles cuites ;

8°. Du Pérou, coton très-long, très-blanc ;

9°. Du Cap de Bonne-Espérance, coton d'une blancheur éblouissante.

Les cotons les plus cultivés dans les colonies d'Amérique, sont le *mi-fin*, graines noirâtres isolées ; et le *coton-pierre* ainsi nommé, parce que les graines tiennent ensemble.

Le *bombax* ou *fromager* qui arrive à 50 pieds de haut dans nos colonies d'Amérique, donne un fruit dont les graines sont entourées d'une bourre fine, blanche, luisante, employée comme le coton.

En Amérique on prépare la terre en floréal, dans des lieux abrités des vents nord-est autant qu'il est possible. On fait des fosses d'un pied ou plus en quarré, dans lesquelles on met 10 à 12 graines aux premières pluies de prairial ; on couvre d'un peu de terre. On ne laisse que deux ou trois plants par fosse. On coupe la tige lorsqu'elle a deux ou trois pieds, afin de multiplier les branches ; le sarclage est nécessaire. Les fleurs paroissent en brumaire, frimaire ; les *cosses* ou capsules

capsules s'ouvrent en nivôse ; on récolte le coton vers la fin de ce mois jusqu'en germinal, en choisissant un beau soleil pour le faire sécher sur des draps. On fait le triage des qualités ; le coton passe ensuite à l'égrenage. On renouvelle les plantations au bout de quatre, cinq ou six ans ; avec des soins elles durent plus long-temps. 29.

Des insectes attaquent les tiges naissantes ; les *crabes* sur les bords de la mer détruisent les jeunes plants, si on n'entoure pas les fosses de piquets ; les chenilles dévastent quelquefois toute une plantation dans une nuit ou deux ; les vents nord-est sont funestes pendant la floraison. Enfin un insecte à bandes rouges vient quelquefois se poser sur les cosses ouvertes et tache le coton. On doit donner à cette plante des soins très-assidus.

Pour séparer le coton de sa graine, on le fait passer entre deux rouleaux de bois placés horizontalement l'un au-dessus de l'autre, mus par une manivelle à pedale comme le rouet et par un engrenage ; un volant est placé sur l'axe de la manivelle ; un contre-poids charge le rouleau supérieur.

Pour l'emballage on met le coton par nappe ou couche dans des sacs de

29. crin ou de forte toile, en le pressant avec les pieds; plus il est pressé, moins il souffre d'avarie dans le transport; on entretient le sac mouillé à l'extérieur pendant l'emballage, afin que le coton ne remonte pas. Les balles sont de deux, quatre et six cents livres.

Arrivé, on l'étale sur des claies d'osier, de ficelle; on le bat avec des baguettes pour ôter la poussière et des restes de graines; on épluche; on carde à la main ou par machine, après l'avoir passé au savon, si on doit filer au *rouet* ou à la *mécanique*. On file aussi au *mul-genny*, au *billy*, au moulin d'*Arckright* et à la machine à filer en gros, mais sans passer le coton au savon. Le rouet, la mécanique, le mul-genny filent la trame; les autres filent la chaîne.

L'apprêt de la chaîne se fait avec de la colle-forte et de la farine. La trame mouillée se soutient mieux, fait plus uni. Pour unir la chaîne et ensuite l'étoffe, on brûle le duvet en passant par dessus et rapidement un fer rouge arrondi.

On fait avec le coton, du tricot, du nankin, basin, draps, velours, mousselines. En le mêlant au chanvre, au lin, à la soie, aux poils d'animaux,

on en fait d'autres étoffes d'un bon usage. Les ciriers, chandeliers en font des mèches; celles des *lampes-quinquettes* sont cylindriques, sans couture. Le coton est aussi employé en forme de *ouate*. On blanchit le fil ou les toiles de coton sur le pré ou par la liqueur lixivielle de *Bertholet*. 29.

*MOULIN à farine*. Cette machine sert à émonder les grains de leur écorce, à les concasser, les réduire en gruau ou en farine. 30.

Les principales parties qui le composent, sont:

1°. Deux meules de pierre dure (silex, quartz, pierre meulière) de six à dix pouces d'épaisseur, de deux à six pieds de diamètre, placées horizontalement l'une au-dessus de l'autre.

La meule inférieure est fixe ou *gissante*, bombée d'environ sept lignes; on la nomme *bondinière*.

La meule supérieure est seule *tournante*, concave d'environ neuf lignes, soutenue par un axe, à un intervalle de la première qu'on diminue ou augmente, suivant le produit qu'on veut obtenir; on la nomme aussi *flanière*.

Les deux meules sont percées à leur centre d'un trou, l'*œillard*; leur sur-

30. face intérieure est piquée ou sillonnée en rayons ;

2°. La nille, forte pièce de fer fixée par quatre branches dans l'*œillard* de la meule tournante, percée au milieu d'un trou, ou ce qui vaut mieux, creusée en forme de chapeau ou de crapaudine renversée, dans laquelle vient se loger le bout arrondi de l'axe ;

3°. L'axe ou l'arbre, pièce de fer posée verticalement, traversant librement la meule gissante par l'*œillard*.

Le bas de l'axe forme pivot et tourne dans une crapaudine ; le haut appellé *papillon*, se loge sous le chapeau de la nille, soutient la *flanière* en équilibre, pendant qu'un crampon de fer fixé sur le quarré du papillon, se place par ses branches relevées entre les branches de la nille, pour communiquer le mouvement de rotation à la meule tournante ;

4°. La *trémie*, entonnoir quarré, de planches, placée au-dessus des meules. Son fond est formé d'un auget, qui, à chaque tour de la meule, reçoit un coup du *babillard*, et laisse échapper du grain qui s'écoule par l'*œillard* ;

5°. La *boîte* et le *boitillon* qui couvrent l'*œillard* de la bondinière, et di-

rigent le grain entre les deux meules ; 30.

6°. *L'archure* ou caissé de bois circulaire qui renferme les meules, reçoit le grain moulu et le verse par l'*anche* ou canal incliné placé au bas de la meule gissante ;

7°. La *huche* qui reçoit le grain moulu sortant de l'anche, lorsqu'on ne veut pas bluter ;

8°. Les bluteaux, longs tuyaux cylindriques formés d'un canevas ou d'un crêpe de divers degrés de finesse, fixé sur des cerceaux. Chaque bluteau est placé obliquement dans un grand coffre ; il reçoit le grain moulu et en sépare le son, le gruau, la farine blanche, bise, etc. par un mouvement de rotation et de trépidation qui lui est imprimé. La mouture soignée donne jusqu'à huit produits bien distincts ;

9°. Le crible à vent placé au-dessus de la trémie, pour y verser le grain nettoyé.

On emploie les hommes, les animaux, le vent, le feu et l'eau appliqués de diverses manières pour imprimer un mouvement de rotation à l'axe et à la flunière ; et par des poulies de renvoi, au crible à vent et aux bluteaux.

Une trop grande vîtesse dans la

30. meule échauffe, aglomère, altère la farine.

Le blutage se fait très-bien séparément du moulin, lorsque la farine est froide, sèche.

On relève souvent la flanière pour la repiquer. Cette opération se fait de diverses manières; la plus facile consiste à faire dans l'épaisseur de la meule, deux trous diamétralement opposés, pour y placer deux pointes arrondies de fer tenant à un demi-cercle d'un rayon un peu plus grand que celui de la meule. A l'aide d'une grue tournante, on enlève la meule par ce demi-cercle; on la redresse sur son épaisseur en la faisant basculer sur les deux pointes de fer comme sur deux pivots. On la replace avec la même facilité.

## FRUCTIDOR, XIIe. MOIS.

*Mois des Fruits.*

1. PRUNE, fruit à noyau du *prunier*, arbre moyen dont il existe un grand

nombre de variétés qui diffèrent par la forme, la couleur, la grosseur, la saveur, l'époque de la maturité de leurs fruits; quelques prunes tiennent au noyau, d'autres n'y tiennent pas; elles se cueillent de messidor en brumaire. 1.

Les plus précoces sont : la *jaune hâtive*, la *précoce* de Tours, la prune de *citoyen* (1).

Les meilleures crues sont : la grosse *claude verte* (2), les divers *damas*, l'*abricotée*, la *claude violette*, la prune *suisse*, le *perdrigon* rouge, la *catherine* bien mûre, le *damas d'automne*.

Celles à convertir en *pruneaux* dont on fait un grand commerce, et qui sont d'un excellent usage dans les voyages de mer, sont : la *catherine*, la *virginale*, la *roche-corbon* ou *diaprée* rouge, la *couetsch*.

La grosse claude verte est préférable pour confire à l'eau-de-vie, et la mirabelle pour confire au sucre.

Les prunes, sur-tout la couetsch, donnent par la fermentation et la dis-

(1) Ci-devant de *Monsieur*.

(2) Ci-devant *Reine-Claude*.

1. tillation, une eau-de-vie appellée *couetsch-vasser.*

Celles qui multipliées de noyau rendent leur espèce sans le secours de la greffe, sont : le *perdrigon* blanc, la *claude*, la *catherine*, le *damas* rouge et blanc, la *couetsch.*

Les autres varient par la semence, ce qui peut conduire à des variétés nouvelles et bonnes.

Les pruniers se greffent de préférence sur le damas rouge ou la cerisette venus de noyau ou de drageon.

2. *MILLET*, plante annuelle, originaire de l'Inde, cultivée en grand dans des terres fortes, bien ameublies, non humides; elle craint la gelée; porte sa graine en panicule flottante, dont on la sépare aisément à sa maturité. Elle est petite, blanche, quelquefois jaune, rougeâtre, plus ou moins foncée; donne une farine peu abondante, nutritive, excellente en bouillie.

La graine de millet bien sèche est employée pour la conservation des fruits tendres, des objets délicats dans les longs transports. On en nourrit aussi la volaille, les oiseaux.

*LYCOPERDE* (*vesse-de-loup*), plante des lieux stériles, forme ronde, de la famille des champignons, contenant à sa maturité une poussière très-fine de mauvaise odeur; c'est un préjugé de croire que cette poussière communique au froment la maladie du noir ou *carie*. 3.

*ESCOURGEON*, *orge d'automne*, *orge quarré*, plante annuelle, cultivée en grand, qu'on ne doit pas confondre avec l'escourgeon de printemps; son épi est à quatre, quelquefois six rangs de grains. Il se sème en fructidor, se coupe en vert avant que l'épi soit formé, donne le fourrage le plus précoce, le plus abondant; produit encore son grain qu'on récolte vers la fin de prairial. Son abondance, sa précocité, le rendent d'un grand secours dans les temps de disette. 4.

On en fait du pain sans le mêler à d'autres grains; dépouillé de son écorce, en le passant entre les deux meules du moulin plus séparées qu'à l'ordinaire, on a l'*orge mondé* ou *gruë*; en l'arrondissant au moyen d'une meule de bois, on a l'*orge perlé*.

Ce grain mis à germer, desséché

4. ensuite ou passé au *tourteur*, réduit en farine, donne le *malt*, qui fait une branche de commerce pour divers usages : délayé, brassé, fermenté, il donne la bière, et par distillation, de l'eau-de-vie.

Les chevaux, la volaille se nourrissent de ce grain ; les amidonniers en retirent de l'amidon.

L'escourgeon uniquement destiné au fourrage, peut se couper trois fois ; dans ce cas, on le sème plus dru.

5. *SAUMON*, poisson de l'Océan, qui remonte les rivières, les écluses ; voyage par troupe de plusieurs milliers ; parvient au poids de trente à quarante livres. Il est couvert de petites écailles rondes ; le dos est d'un bleu obscur, le ventre d'un blanc argenté ; le corps a des taches plus grandes dans la femelle que dans le mâle ; sa tête est petite ; la mâchoire inférieure recourbée en haut, garnie de dents longues, aiguës, ainsi que la mâchoire supérieure.

Il se nourrit de poissons, est très-vorace. La femelle nommée *becard*, dépose son *frai* sur le sable. Les jeunes saumons connus sous le nom de *tacons*, sont très-délicats. Ils descen-

dent à la mer, et remontent l'année suivante dans les eaux douces; ils reviennent ordinairement dans les rivieres où ils sont nés. 5.

On pêche le saumon en brumaire, frimaire, et jusqu'en prairial, en les attirant par des guides ou filets dans des enceintes formées sur l'eau, d'où ils ne peuvent plus sortir, ou dans des *verveux* ouverts pour les prendre en descendant, ou en remontant.

Le rouissage du chanvre les fait fuir; ils ne reviennent que lorsque les eaux ainsi corrompues se sont écoulées.

La chair en est blanche, grasse, nourrissante; elle devient rouge en cuisant ou dans le sel. On mange le saumon frais, salé, confit au vinaigre : cette dernière préparation est agréable, saine. Il fait une branche de commerce qu'on pourroit étendre.

*Tubéreuse*, plante vivace, bulbeuse, originaire de Ceylan; tige élevée, garnie de fleurs blanches très-odorantes, qui épanouissent successivement, et durent trois mois. Il y a une variété à fleurs doubles qui dégénere par une mauvaise culture. La tubéreuse est cultivée en grand 6.

dans nos pays méridionaux où il s'en fait un très-grand commerce; elle se
6. cultive sur couche dans les climats tempérés et froids; aime beaucoup la chaleur; est employée dans les parfums.

7. *SUCRION* (*orge nud*), plante annuelle de Tartarie, arêtes très-longues; son grain quitte la balle facilement; son écorce est mince; il rend plus de farine; sa qualité le rend plus convenable pour la bière que l'orge carré; seul il fait un bon pain. Il peut se semer en automne dans les climats chauds et tempérés.

8. *APOCYN à ouate*, plante vivace, laiteuse, fort traçante, originaire de Virginie; se plaît dans les terreins ~~frais~~, multiplie beaucoup, est presque indestructible. Ses fleurs sont très-odorantes; ses graines portent un duvet fin, soyeux, doux, élastique, chaud, employé dans la bonneterie; on en fourre les habits, les courtepointes, etc. Lorsqu'il est court, il se carde, se file mieux. La tige de la plante donne une filasse.

Encore jeune, l'apocyn se mange cuit à l'eau comme l'asperge. Il est dangereux de le manger crud.

*RÉGLISSE*, plante vivace cultivée en grand dans plusieurs départemens, notamment dans celui d'Indre et Loire, pour sa racine traçante, ligneuse, très-sucrée. On l'emploie verte ou sèche; on en fait un extrait connu sous le nom de *sucre de réglisse*, *sucre noir*, varié de différentes manières par les parfums qu'on y ajoute. 9.

*ÉCHELLE*, simple ou double. On fait ordinairement les montans de bois d'aulne ou d'autres bois légers, et les échelons de cornouiller. L'échelle varie suivant ses usages; celle qu'on destine à la cueillette des fruits est très-étroite. La double est de deux especes; l'une à un pied sert aux opérations ordinaires des jardins; l'autre à deux pieds, sert à élaguer, tailler les grands arbres. 10.

*PASTEQUE* (*melon d'eau*), plante cucurbitacée, annuelle, originaire de la Jamaïque, cultivée sur-tout dans les pays chauds; fruit rond, oblong, très-rafraîchissant, très-aqueux; on le confit au sucre; sa chair est blanche, rougeâtre; sa graine blanche ou noirâtre. 11.

*FENOUIL*, plante vivace, aromatique dans toutes ses parties; ses 12.

12. feuilles sont employées dans les assaisonnemens, sur-tout dans les cornichons; ses jeunes tiges blanchies se mangent comme le céleri; sa graine qu'on nomme à Paris mal-à-propos *anis*, entre dans les ratafias, donne une huile essentielle. Cette plante sert à parfumer le linge. Quelques variétés sont plus douces.

13. *Epine-vinette*, arbrisseau épineux, propre à former des haies: bois jaune; fruit oblong, rouge, acide, qui peut suppléer le citron; il y a des variétés à fruit blanc, violet, moins acide. Ses fleurs en grappe ont une odeur désagréable; c'est à tort que l'on pense qu'elles sont nuisibles à la fructification des fromens. Les étamines donnent des signes de sensibilité quand on les touche: les fruits encore verds remplacent les capres; mûrs, on en fait d'excellentes confitures, un sirop; on les confit aussi au vinaigre. La racine, le bois, l'écorce fournissent une couleur jaune pour teindre les étoffes, le cuir et le bois.

14. *Noix*, fruit du noyer, grand arbre originaire de Perse, en Europe depuis un temps immémorial, très-

commun en France, borde les chemins dans plusieurs départemens. 14.

Il craint les grands froids, se greffe avec succès dans plusieurs endroits, ses feuilles ont une odeur pénétrante; son bois veiné, d'une belle couleur, solide, léger, fait de bons meubles, sert à la monture des fusils; son fruit est composé d'une amande qu'enferme une coquille enveloppée d'une *cale* verte, lisse, appellée *brou*.

La noix encore tendre se confit au sucre, ou se mange en *cerneaux*. Le brou fait un ratafia, est employé avec les racines à teindre en brun les étoffes, le cuir, le bois; la noix mûre se conserve dans un lieu sec; trempée quelques jours dans l'eau, elle s'adoucit, s'épluche mieux, est plus agréable à manger; l'amande séparée de sa coquille, grillée, écrasée sous une meule posée de champ, mise sous le pressoir, donne une huile qu'on mange, et qui sert en peinture. Tirée sans feu, elle est plus agréable, sur-tout en y ajoutant un quart d'huile d'amande, mais elle se conserve moins. Les feuilles, les coquilles et le bois font un très-bon chauffage; les cendres sont très-chargées de potasse.

14. Depuis un siecle, on a découvert dans l'Amérique septentrionale, les especes suivantes de noyers qui peuvent supporter nos hivers.

1°. Le *noyer noir* qui s'éleve à soixante, quatre-vingts pieds, prend trois à quatre pieds de diametre, résiste aux grands froids, fructifie dans nos jardins : la noix est grosse, ronde; son brou lisse, sa coquille dure, épaisse, son amande douce; elle se conserve fraîche six mois; écrasée sous le marteau, broyée dans l'eau, on en sépare une farine dont on fait une espece de pain. Son bois est dur, de couleur foncée; ce noyer se multiplie de graine, croît rapidement.

2°. Le *noyer cendré* qui s'éleve à trente, quarante pieds, prend trois pieds de diametre, porte des noix oblongues à brou velu, visqueux, coquille profondément sillonnée, amande douce, huileuse. Il vient bien de graine, ne gele pas.

3°. Le *noyer blanc*, à fruit aigu, s'éleve à quarante, cinquante pieds. La noix a deux pouces de long; l'amande est petite, douce.

4°. Le *noyer blanc odorant* s'éleve

très-haut ; ses noix sont petites, rondes, douces ; son bois dur, d'une belle couleur, fait des charrues, des essieux de chariot, des roues dentées de moulin, des manches d'outils. 14.

Il y a un noyer blanc à fruit comprimé, échancré aux deux bouts, à amande douce.

5°. Le *pacanier*, arbre très-grand, bois excellent pour la charpente, la menuiserie ; noix longues, lisses, de la grosseur du doigt, de la forme d'une olive ; amande douce, agréable ; huile fine, très-bonne à manger. Ce noyer résiste aux grands froids, est préférable en tout au noyer commun.

6°. Le *noyer* à petit fruit amer, qui s'éleve à quatre-vingts, cent pieds ; ses feuilles sont larges, la noix ronde, à brou mince, coquille fragile, amande très-amere.

7°. Le *noyer* à feuilles de frêne.

Tous ces noyers se multiplient de semence et de greffe. On fait germer les noix dans du sable, on les seme au commencement du printemps.

*Truite* d'eau douce, d'environ un pied dans sa plus grande longueur, mouchetée de taches noirâ- 15.

15. res ou rougeâtres; museau plus obtus que le saumon, langue épaisse, hérissée de pointes; elle habite les eaux vives, se plaît dans les rivieres à bords herbeux. Sa chair est blanche, délicate, molle, de facile digestion; lorsqu'elle est rougeâtre, on dit qu'elle est saumonnée.

La vraie truite saumonnée habite les lacs, acquiert jusqu'à trois pieds de longueur, et trente livres de poids. Sa tête est plus petite, les couleurs du dos plus vives, les taches plus multipliées, plus petites, la nageoire de la queue échancrée. Ces deux especes ne se trouvent point ensemble.

La truite brune a la queue très-échancrée, la tête courte, les taches rouges bordées de blanc.

La truite de mer a le corps plus large, le museau aigu, la queue profondément échancrée, les taches petites, nombreuses, irrégulieres.

La truite se conserve salée ou marinée.

16. *Citron*, fruit à pepin du citronnier, petit arbre originaire d'Asie, acclimaté dans le midi de la France. Le citron est oblong, jaune; son écorce épaisse contient une huile

essentielle d'une odeur agréable; l'intérieur du fruit est composé de vésicules remplies d'un jus acide qu'on retire par expression; on s'en sert pour enlever les taches d'encre encore fraîches; mêlé avec de l'eau, du sucre ou du miel, on en fait une boisson rafraîchissante, connue sous le nom de *limonnade* crue, cuite. Le citron entier ou seulement son écorce entre comme assaisonnement dans quelques alimens; frais, on le confit au sucre. Ce fruit varie dans sa forme, sa saveur; sa graine est amere. 16.

*Cardiere*, chardon à foulon ou à bonnetier, plante bisannuelle, cultivée en grand. La premiere année la cardiere ne pousse que des feuilles; la seconde année ses tiges paroissent, et portent chacune une tête ovoïde composée de plus de six cents fleurs, dont les calices plus longs qu'elles, se terminent par un piquant en crochet. L'instant à saisir pour la récolte, est celui où les crochets commencent à acquérir de la fermeté, sans être trop secs. Les têtes de cardiere servent, dans les manufactures, à peigner les draps. Les feuilles opposées de la plante forment une 17.

cuvette où se rassemble l'eau de pluie,
17. de rosée qui peut servir à désaltérer les voyageurs. Les abeilles recherchent les fleurs. La république récolte assez de cardieres pour ses manufactures, et pour en exporter. Il ne faut pas confondre cette espece avec le chardon des champs, dont les calices n'ont point de crochets.

18. *NERPRUN*, *Bourg-épine*, petit arbre épineux des bois, propre à faire des haies; son écorce, ses baies non mûres donnent une couleur jaune; à leur maturité elles donnent le verd de vessie. Ces couleurs sont employées par les teinturiers, les peintres; le suc qu'on en extrait est d'usage en médecine.

19. *TAGETTE*; deux especes automnales annuelles; *tagette*, originaire du Mexique, deux especes automnales annuelles; l'une connue sous le nom d'*œillet-d'Inde*, a une variété petite, simple, panachée; la seconde, *rose-d'Inde*, à fleur simple ou double, odeur forte; il y a aussi une variété moins grande, plus hâtive. La tagette est cultivée dans les jardins.

20. *HOTTE*, ustensile d'osier, commode pour les transports, d'usage

dans la plus grande partie des départemens ; elle varie dans ses formes, est pleine ou à claire-voie, à dos prolongé ou sans prolongement. Le centre de gravité du poids doit être à la hauteur des épaules : trop au-dessus, on perd l'équilibre ; trop au-dessous, on perd de sa force. Le dos de la hotte doit prendre les formes du corps, afin que le poids soit plus également réparti. 20.

*Eglantier*, *Rose de chien*, arbuste épineux des bois, des haies ; fleurs odorantes, fruit rouge, acidule, se mange frais, confit : on doit se garantir des poils qu'il renferme : il est connu sous les noms de *kinorhodon*, *gratte-cu*. La piqûre d'un insecte fait naître sur ses branches une excroissance en forme de mousse, appellée *bedigoire*, sur laquelle le charlatanisme abuse de la crédulité, en lui attribuant des effets extraordinaires. Des pousses gourmandes, longues, droites, sortent de l'églantier ; détachées avec des racines, elles servent à greffer en tiges les roses des jardins, et autres variétés à fleurs doubles. 21.

*Noisette*, fruit à amande du 22.

noisettier sauvage ou cultivé. La noi-
22. sette est douce, agréable; ses variétés sont la noisette franche, dont l'amande est à pellicules blanches ou rouges; l'huile que l'on en extrait, se rancit peu, est bonne à manger.

23. *Houblon*, plante vivace, traçante des lieux sauvages dont les fleurs mâles et femelles sont séparées sur différens pieds. On le cultive en grand; il exige une terre bonne, profonde; l'épuise beaucoup. Sa graine se seme plus avantageusement à l'époque de sa maturité; il s'éleve très haut, demande à être échalassé; dure dix à douze ans. On mange ses jeunes pousses comme les asperges. Les enveloppes de la graine récoltées avec soin, sont employées dans la bière, lui donnent de l'amertume, contribuent à sa conservation. On le multiplie aussi de drageons. On distingue quelques légeres variétés blanches, rougeâtres.

24. *Sorgho*, *grand millet d'Inde*, plante annuelle, racines nombreuses, graines rouges, noirâtres, disposées en panicule. On le cultive en grand; il veut une terre bonne, bien ameublie; gele facilement; de-

mande, pour mûrir, une chaleur soutenue. La graine, la farine du sorgho nourrissent les bestiaux, la volaille ; les hommes peuvent en manger. Les feuilles servent de fourrage ; les panicules dépouillées de leurs graines, font des balais. Le maïs est préférable au sorgho. 24.

*ECREVISSE* d'eau douce, dont deux variétés, l'une à pattes vertes, l'autre à pattes rouges ; celle-ci est préférée ; elle habite plus communément les ruisseaux, les bras de riviere ; se loge le long de leurs bords, sous les racines des arbres, des arbrisseaux, sur-tout entre les pierres ; s'éleve artificiellement dans des bassins garnis de retraites qui communiquent à une eau courante ; est plusieurs années à prendre son accroissement ; elle est vorace, se jette sur les substances animales qu'on lui présente ; c'est l'appât le plus assuré pour la prendre. Son test ou cuirasse, l'enveloppe de ses pattes, de sa queue, tombent chaque année à la ponte ; il succede une enveloppe molle qui durcit en peu de temps. L'écrevisse se mange cuite ; elle ne vaut rien dans la mue. 25.

26. *Bigarade*, *orange* plus ou moins acide que l'orange douce et plus cultivée dans le nord de la France, à cause de la facilité de sa culture et de l'abondance de ses fleurs : son fruit, en mûrissant, devient d'un verd jaune, sert d'assaisonnement aux viandes. Les variétés principales sont la bigarade violette, la pomme d'adam, la bigarade cornue, la petite bigarade chinoise.

27. *Verge d'or* (commune), plante vivace, fleurs jaunes, abondantes en miel; elles paroissent tard, sont d'usage en médecine.

28. *Maïs*, vulgairement *bled de Turquie*, *bled d'Espagne*, *bled d'Inde*, *gros millet*, *milloc*; plante annuelle, originaire d'Amérique, naturalisée dans toutes les parties tempérées de l'Europe. Tige grosse, haute de quatre à huit pieds, feuilles larges, racines chevelues, fleurs mâles en long bouquet terminant la tige, séparées sur le même pied des fleurs femelles disposées le long de la tige. Epi long, grain de la grosseur d'un pois, blanc, jaune, rouge, violet, bigarré, selon les variétés; les deux premieres sont préférables.

On

28.

On en cultive deux especes; l'une hâtive, peu féconde; l'autre plus répandue. Le maïs se plante comme les haricots, ou se seme derriere la charrue, assez espacé pour être sarclé, butté. Il est sensible au froid; ses semailles surprises par la gelée blanche, doivent être recommencées; son abondance, sa maturité dépendent de l'humidité, de la chaleur.

Chaque pied porte un épi dans les terres médiocres, deux, trois dans les bonnes, et jusqu'à six en Amérique. L'épi donne environ cinq cents grains. En Amérique, on fait aisément trois récoltes par an sur le même sol; dans le sud de la France, on pourroit en obtenir deux. Après le buttage, on plante dans les intervalles, des pois, haricots, féveroles, citrouilles.

Le maïs est sujet à une excroissance qui se convertit en une poussière noire, non contagieuse; on doit l'extirper dès qu'elle paroît. L'eau des pluies se rassemble quelquefois dans le fourreau de l'épi, et peut l'altérer; on la fait couler par une incision ou une déchirure dans le bas.

Dès que le grain est formé, on

28. le perfectionne en découvrant l'épi; la maturité en est plus complete.

Les épis encore tendres et en lait, se mangent rôtis ou pilés et réduits en pâte qu'on fait cuire. Cette préparation nourrissante se conserve et peut se transporter dans des feuilles fraîches. Les épis placés dans les aisselles des feuilles ne mûrissent pas; on les confit au vinaigre. Les épis mûrs se conservent en paquets sous le toit des maisons pour les semailles; au four ou à l'air, on les égrene pour l'usage. Le grain se conserve entier ou concassé, moins bien en farine qui peut s'aigrir; ce qu'on prévient en la passant légérement sur des plaques chaudes de fer.

On fait avec le maïs des potages, bouillies appellés *gaudes*, *polenta*, *miliasse*, *cruchades*, des galettes qu'on fait frire par tranches, et du pain en le mêlant avec du froment; seul, il donne un pain sec, lourd, échauffant. Le maïs contient une espece de gomme, du sucre, de l'amidon. On en fait une boisson fermentée. Il engraisse les porcs, la volaille, remplace l'avoine pour les chevaux. Les rejettons qui poussent au dessus

du nœud de l'épi, sont donnés au gros bétail; les feuilles font de bonnes paillasses; l'épi dépouillé du grain, les tiges et les racines, donnent un feu clair, vif, une cendre riche en potasse. 28.

*MARRON*, fruit d'une espece de châtaignier, recherché par sa saveur et sa délicatesse; différentes variétés paroissent devoir leur qualité à la greffe et aux terreins dans lesquels les arbres croissent. Les marrons de Lyon, ou plus exactement des départemens voisins et ceux du Luc sont les plus généralement estimés. On les distingue des châtaignes par leur forme plus arrondie, par leur grosseur, la finesse de leur chair et leur goût sucré. On les mange rôtis, bouillis. 29.

*PANIER*, ustensile d'osier blanc, d'osier noir, de coudrier, viorne, troëne, saule ou d'autres bois lians, à anse ou à poignée, très-varié dans ses formes, ses dimensions et ses usages. 30.

*Fin de l'Annuaire.*

*TABLE des Pesanteurs spécifiques de plusieurs Substances fluides, liquides ou solides, végétales, animales ou minérales, salines ou métalliques, dont il est parlé dans l'*Annuaire, *ou qui peuvent y avoir quelque rapport.*

| NOMS des SUBSTANCES. | POIDS d'un PIED CUBE. |
|---|---|
| *Fluides.* | |
| Gas inflammable. . . . . | 64 grains. |
| Air commun. . . . . | 11 gros. |
| Air très-pur ou vital. . . . . | 12 gros. |
| *Liquides.* | |
| Esprit-de-vin . . . . . | 58 livres. |
| Essence de térébenthine. . . . | 61. |
| Eau-de-vie. . . . . | 64. |
| Huile de noisette. . . . . | 64. |
| —de navette. . . . . | 64. |
| —de farine. . . . . | 64. |
| —d'olive. . . . . | 64. |
| —d'œillette *ou* de pavot. . . . | 65. |
| —de chenevis. . . . . | 65. |
| —de noix. . . . . | 65. |
| —de lin. . . . . | 66. |

| NOMS des SUBSTANCES. | POIDS d'un PIED CUBE. |
|---|---|
| Térébenthine. . . . . | 69 livres. |
| Vin. . . . . | 69. |
| Eau de pluie. . . . . | 70. |
| Cidre. . . . . | 71. |
| Eau de mer. . . . . | 72. |
| Lait de vache. . . . . | 72. |
| Bière . . . . . | 72. |
| Vinaigre. . . . . | 72. |
| Acide muriatique. . . . . | 84. |
| Acide nitrique. . . . . | 89. |
| Acide sulfurique. . . . . | 129. |

## *B O I S.*

| NOMS DES BOIS. | POIDS d'un pied cube | | RETRAITE par le dessèchement. |
|---|---|---|---|
| | vert. | sec. | |
| | liv. | liv. | |
| Écorce de liège. . . . | » | 17. | |
| Peuplier d'Italie. . . | 64. | 25. | un 24.e |
| Saule commun. . . . | 68. | 27. | un 16.e |
| Peuplier noir. . . . . | 69. | 29. | un 6.e |
| Cèdre du Liban. . . . | 43. | 29. | |
| Marronnier d'Inde . . | 58. | 31. | un 24.e |
| Sapin. . . . . | 47. | 32. | |
| Aulne, Verne. . . . | 61. | 36. | un 12.e |
| Tremble. . . . . | 53. | 39. | un 6e. |

| NOMS DES BOIS. | POIDS d'un pied cube | | RETRAITE par le dessèchement. |
|---|---|---|---|
| | vert. | sec. | |
| | liv. | liv. | |
| Peuplier blanc. . . . | 58. | 38. | un 4.e |
| Ypréau. . . . . | 54. | 39. | un 4.e |
| Lierre. . . . . | » | 40. | |
| Châtaignier . . . . . | 69. | 41. | |
| Chêne. . . . . | 80. | 41. | un 16.e |
| Genèvrier. . . . . | » | *ibid.* | |
| Marseau. . . . . | 70. | *ibid.* | un 12.e |
| Mûrier noir. . . . . | » | 42. | |
| Sureau. . . . . | » | *ibid.* | |
| Érable plane . . . . | » | 43. | un 24.e |
| Mûrier blanc. . . . . | » | 44. | un 10.e |
| Noyer. . . . . | 60. | *ibid.* | un 24.e |
| Cyprès. . . . . | » | 45. | |
| Houx. . . . . | » | 47. | |
| Tilleul . . . . . | 52. | 48. | un 6.e |
| Bouleau . . . . . | » | *ibid.* | |
| Noisettier . . . . . | » | 49. | |
| Coignassier. . . . . | » | *ibid.* | |
| Abricotier. . . . . | » | 50. | |
| Citronnier . . . . . | » | 51. | |
| Orme. . . . . | 83. | *ibid.* | un 16.e |
| Frêne. . . . . | 63. | *ibid.* | un 12.e |
| Épine noire *ou* Prunelier. . . . . | » | 52. | |
| Platane de Virginie. . | » | *ibid.* | |
| Sycomore . . . . . | » | *ibid.* | un 12.e |
| Charme. . . . . | 61. | *ibid.* | un 4.e |
| Alizier. . . . . | *ibid.* | *ibid.* | |
| Mélèse . . . . . | » | 53. | |
| Cytise des Alpes. . . | » | *ibid.* | |

| NOMS DES BOIS. | POIDS d'un pied cube vert. | POIDS d'un pied cube sec. | RETRAITE par le dessèchement. |
|---|---|---|---|
| | liv. | liv. | |
| Érable sucre. . . . . | » | 53. | |
| Pêcher . . . . . | » | 52. | |
| Poirier sauvage. . . . | 79. | 53. | un 12.e |
| Jasmin . . . . . | » | 54. | |
| Nerprun. . . . . | » | *ibid.* | |
| Racine de garance. . . | » | *ibid.* | |
| Hêtre, Fayard. . . . | 63. | 55. | un 4.e |
| Merisier. . . . . | 62. | *ibid.* | un 16.e |
| Prunier. . . . . | » | *ibid.* | |
| Néflier . . . . . | » | 56. | |
| Pommier. . . . . | » | *ibid.* | |
| Faux Acacia. . . . . | 59. | *ibid.* | un 6.e |
| Épine blanche *ou* Aubépine. . . . . | 69. | 57. | un 8.e |
| Laurier . . . . . | » | 58. | |
| Oranger. . . . . | » | *ibid.* | |
| If. . . . . | 81. | 61. | un 48.e |
| Mahaleb, ou Bois de Sainte-Lucie. . . . | » | 62. | |
| Buis. . . . . | 80. | 69. | |
| Olivier . . . . . | » | 69. | |
| Chêne vert. . . . . | 85. | 70. | |
| Cornouiller. . . . . | » | *ibid.* | |
| Lilas . . . . . | » | 71. | |
| Cormier. . . . . | » | 72. | |
| Vigne. . . . . | » | 93. | |
| Grenadier . . . . . | » | 95. | |

| NOMS des SUBSTANCES. | POIDS d'un PIED CUBE. |
|---|---|
| *Substances solides, combustibles.* | |
| | liv. |
| Cire Jaune. . . . . | 68. |
| Ambre Jaune, Succin. . . . | 76. |
| Bitume . . . . . | 77. |
| Jayet . . . . . | 88. |
| Charbon de terre. . . . . | 93. |
| Soufre . . . . . | 142. |
| Diamant. . . . . | 246. |
| *Substances solides, salines.* | |
| Potasse. . . . . | 102. |
| Sucre blanc. . . . . | 112. |
| Tartre crud . . . . . | 129. |
| Salpêtre, Nitrate de potasse. | 133. |
| Sulfate de fer, Vitriol *ou* Couperose verte. . . . . | *ibid.* |
| Sel commun *ou* Muriate de soude . . . . . | 149. |
| *Substances qui ont éprouvé l'action du feu.* | |
| Lave. . . . . | 162. |
| Porcelaine . . . . . | 164. |
| Basalte des volcans. . . . . | 170. |
| Verre de bouteille. . . . . | 191. |
| Laitier des fonderies. . . . . | 200. |
| Verre blanc. . . . . | 202. |

| NOMS des SUBSTANCES. | POIDS d'un PIED CUBE. |
|---|---|
| *Substances minérales. Pierres.* | |
| | liv. |
| Pierre à chaux, à bâtir. . . . | 116. |
| Pierre à plâtre, Gypse. . . . | 152. |
| Feld-spath rougeâtre. . . . . | 171. |
| Pierre meulière. . . . . | 174. |
| Caillou. . . . . | 182. |
| Feld-spath blanc. . . . . | *ibid.* |
| Quartz en masse. . . . . | 185. |
| Granit rouge de la Côte-d'Or. . | *ibid.* |
| —des Pyrénées. . . . . | 187. |
| —des Vosges. . . . . | 190. |
| —du Morbihan. . . . . | 192. |
| Marbre. . . . . | 193. |
| Ardoise . . . . . | 200. |
| Mica noir. . . . . | 203. |
| Schorl noir. . . . . | 235. |
| Grenat. . . . . | 293. |
| *Substances métalliques.* | |
| Molybdène. . . . . | 331. |
| Arsenic . . . . . | 403. |
| Antimoine. . . . . | 469. |
| Zinc. . . . . | 503. |
| Fer fondu. . . . . | 504. |
| Étain de Cornouailles. . . . | 511. |
| —de Melac. . . . . | 512. |

| NOMS des SUBSTANCES. | POIDS d'un PIED CUBE. |
|---|---|
| | liv. |
| Étain fin fondu, non écroui. | 524. |
| —écroui . . . . . | 526. |
| Fer forgé. . . . . | 545. |
| Cuivre rouge non forgé. . . . | *ibid.* |
| Cobalt. . . . . | 547. |
| Acier trempé. . . . . | *ibid.* |
| Acier non trempé. . . . . | 548. |
| Étain commun, fondu . . . . | 554. |
| Cuivre rouge fondu, non forgé. | 588. |
| Cuivre jaune fondu, passé à la filière . . . . . | 598. |
| Cuivre rouge fondu, passé à la filière . . . . . | 621. |
| Bismuth. . . . . | 688. |
| Argent fondu, non forgé. . . | 733. |
| —forgé. . . . . | 736. |
| Plomb fondu. . . . . | 795. |
| Mercure coulant. . . . . | 950. |
| Or fin fondu, non forgé. . . | 1348. |
| —forgé . . . . . | 1355. |
| Platine fondue. . . . . | 1365. |
| —forgée. . . . . | 1424. |
| —passée à la filière. . . . . | 1473. |

# TABLEAU COMPARATIF

*De la force et de l'élasticité de quelques Bois.*

| NOMS<br>Des Bois taillés en parallélipipède de mêmes dimensions. | ANGLE<br>De flexion avant de rompre. | | POIDS<br>Sous lequel a rompu le parallélipipéde. | |
|---|---|---|---|---|
| | deg. | min. | liv. | onc. |
| Peuplier d'Italie . . | 11. | » | 68. | » |
| Peuplier à feuilles blanches. . . . . | 16. | » | 116. | 8. |
| Sycomore. . . . . | 8. | 40. | 127. | 8. |
| Pin sylvestre. . . . | 9. | » | 127. | 8. |
| Tremble . . . . . | 10. | 30. | 132. | » |
| Aulne. . . . . | 9. | » | 135. | 8. |
| Ypréau. . . . . | 16. | 30. | 147. | 8. |
| Hêtre. . . . . | 10. | 30. | 162. | 8. |
| Chêne . . . . . | 12. | » | 185. | 8. |
| Frêne . . . . . | 21. | 30. | 189. | 8. |
| Bouleau. . . . . | 18. | » | 190. | 8. |

# EXPLICATION
## DE QUELQUES MOTS
# DE L'ANNUAIRE.

## A.

ACIDE, substance à l'état solide; mais plus souvent liquide ou fluide, saveur *aigre* plus ou moins forte, qui change en rouge la couleur bleue du tournesol, du sirop de violette; s'unit avec *effervescence* à la pierre à chaux, au marbre, à la *soude*, la *potasse*, l'*ammoniac*; forme avec eux différens sels suivant sa nature. Le jus de citron, le vinaigre sont acides.

On retire du sel marin, l'acide muriatique; du nitre, les acides nitreux et nitrique; du soufre, les acides sulfureux et sulfurique; du phosphore, l'acide phosphorique, etc.

AÉROSTAT, ballon sphérique ou ovoïde, fait de taffetas tissu avec une soie préparée à la vapeur de l'eau, sans apprêt ni teinture, enduit d'un vernis de caoutchou, appellé improprement *gomme élastique*, rempli d'un fluide inflammable, beaucoup plus léger que l'air, accompagné d'une nacelle qu'il enlève dans l'athmosphère avec le poids dont on le charge. Création de la liberté, il

sert à la défendre, en facilitant les observations et reconnoissances militaires.

Aisselle des feuilles, angle qu'elles font avec ses branches : mais elle se dit aussi de l'angle des branches entr'elles ou avec la tige.

Ammoniac, *alkali volatil*, d'une odeur pénétrante, verdissant le sirop de violette, s'unissant avec les acides. Il forme, avec l'acide muriatique, le muriate d'ammoniac ou sel ammoniac du commerce, qu'on tire d'Egypte, et qu'on fabrique aujourd'hui en France ; il sert dans les arts ; on retire l'ammoniac des substances animales brûlées.

Annuelle, se dit des plantes herbacées qui germent, croissent, fleurissent, fructifient et périssent dans la même année.

Anthère, organe mâle des *fleurs*, bourse ou *scrotum* soutenu ou non par un filet. Il s'ouvre avec explosion à sa maturité, lance sur le *pistil* une *poussière* servant à la fécondation des embryons de l'*ovaire*. (*Voyez* Fleur, Poussière, Pistil, Ovaire.)

Arbre, plante ligneuse constituée de racines pivotantes ou traçantes, grosses, ramifiées, déliées ou *en chevelu* ; d'un tronc unique et nu, surmonté d'une tête arrondie ou pyramidale, étalée ou plate, formée de maitresses branches, branches à *bois*, à *fruits*, *chiffonnes*, *gourmandes*, *veules*, *aoûtées*, *faux-bois*, et de *feuilles*.

On distingue les arbres en petits, moyens et grands suivant leur élévation, qui va de dix-huit à cent trente pieds.

Arbrisseau, plante ligneuse qui se divise depuis sa racine en plusieurs tiges ordinairement rameuses dès le bas ; s'élève à la hauteur de six à dix-huit pieds ; pousse, ainsi que

l'arbre, en automne, dans l'aisselle des feuilles, des boutons qui se développent au printemps. Le noisettier, l'églantier, l'osier, la viorne, le troêne, sont des arbrisseaux.

Arbuste, *sous-arbrisseau*, plante ligneuse en buisson, s'élevant depuis six pouces jusqu'à la hauteur de l'homme, comme le thym, le groseillier, la bruyère, le romarin. L'arbuste ne pousse pas en automne, comme l'arbrisseau, des boutons aux aisselles des feuilles.

Aréomètre, *pèse-liqueur*, instrument en verre, en bois ou autre matière; assez léger pour flotter sur les liquides; il y plonge plus ou moins, suivant leur pesanteur spécifique dont il sert à déterminer le rapport.

Astringent. L'écorce de certains arbres est astringente, c'est-à-dire, qu'elle resserre les pores du cuir, le rend compact, ferme, solide. (*Voyez* Tan.)

## B.

Baies, fruits composés de graines ou pepins renfermés dans une pulpe succulente, comme le raisin, la groseille, la mûre.

Balle, espèce d'écaille servant d'enveloppe au grain en épi des plantes graminées, des *céréales* (*Voyez* Calice.)

Baromètre, instrument destiné à mesurer la pression de l'athmosphère, la hauteur des montagnes, l'ascension des aérostats. Le meilleur baromètre est composé d'un tube de verre d'environ trente-six pouces, recourbé en deux branches parallèles, égales en grosseur, inégales en longueur; la plus courte ouverte, la plus longue fermée à son extrémité. On remplit peu-à-peu le tube de

mercure; on le fixe sur une planche qu'on pose bien d'à plomb, la courbure du tube en bas. L'athmosphère pressant sur le mercure de la branche ouverte, le pousse dans la longue branche fermée, l'y soutient, sur le bord de la mer, à une hauteur de vingt-huit pouces environ au dessus de la colonne de la petite branche. Cette hauteur diminue à mesure qu'on s'élève sur une montagne, sur un aérostat. La planche est divisée en pouces et lignes. Il y a des moyens de rendre le baromètre portatif, afin de s'en servir dans les voyages.

Bisannuelle, se dit des plantes qui germent, poussent leurs feuilles radicales la première année; poussent leurs tiges, fleurissent, fructifient et périssent la seconde année.

Bouture, branche détachée d'une plante ligneuse qu'on pique en terre et qui reprend. Le figuier, le coignassier, le groseillier, le saule, le sureau, le buis, reprennent de bouture.

Bulbe, *oignon* composé d'écailles, peaux ou tuniques emboîtées les unes dans les autres. Les bulbes poussent aux racines comme dans la *jacinthe*, aux aisselles des feuilles comme dans le lys bulbifère, ou au sommet de la tige comme dans l'ail. Elles servent à la reproduction de la plante.

## C.

Calice, écailles ou folioles servant d'enveloppe ou de soutien aux autres parties de la fleur. La balle du froment, du seigle, les piquans ou crochets des chardons, des cardières, sont des calices. Il y a des fleurs sans calice, comme la tulipe.

Capsule, fruit composé d'une coque sèche, peu épaisse, qui s'ouvre naturellement à la maturité, et laisse échapper les graines qu'elle contient.

Caustique, corrosif, brûlant, cautérisant. La soude, la potasse dépouillées du gaz carbonique auquel elles sont unies, soit par l'action du feu, soit par leur mêlange avec la chaux vive, deviennent *caustiques*. Elles peuvent alors s'unir aux acides, sans effervescence. (*Voyez* Acide.)

Cayeux, *œilleton* pour les plantes *herbacées*, est analogue au *drageon* pour les plantes ligneuses. (*Voyez* Drageon.)

Céréales, se dit des plantes graminées, comme le froment, le seigle, l'orge, l'avoine, qu'on cultive en grand pour les besoins de l'homme, des animaux.

Chaton, assemblage de petites fleurs sans calice ni corolle, garnies d'écailles, disposées autour d'un même filet qui prend la figure d'une queue de chat. Les fleurs d'un même chaton, sont ordinairement d'un seul sexe. Les fleurs du châtaignier sont en chaton.

Corolle, partie de la fleur la plus remarquable par sa grandeur, sa position, l'élégance, la variété de ses formes, de ses couleurs, souvent par son parfum. Elle est d'une seule pièce comme dans la fleur du liseron, ou de plusieurs pièces nommées *pétales*, vulgairement *feuilles*, comme dans la rose. Soutenue par le calice, elle soutient, enveloppe, abrite les étamines et le pistil; c'est le rideau du lit nuptial. Elle porte quelquefois à son extrêmité inférieure un *nectaire*, réservoir du miel que les abeilles recueillent.

Couches, amas de substances susceptibles de fermenter, s'échauffer ou d'acquérir, conserver pendant quelque temps, de la chaleur, comme le fumier, la balle de bled, le tan, les feuilles, le marc de raisin, celui d'olive ou le grignon, etc. Ces couches faites sur un sol sec, abrité, servent à faire lever de bonne heure des graines, à obtenir des fruits dans une saison où par-tout ailleurs la nature est engourdie, à cultiver des plantes étrangères, en obtenir des semences, en préparer l'acclimatement.

Crucifère, se dit d'une plante dont la fleur est composée de quatre pétales et de six étamines, quatre grandes et deux petites.

Cucurbitacées. Les courges, concombres, melons, citrouilles, potirons, forment la famille des plantes cucurbitacées dont les tiges sont traînantes, à vrille; les fleurs mâles séparées des femelles. La corolle toujours d'une seule pièce, est placée au dessus de l'ovaire. Le fruit est pulpeux et porte sa semence dans une seule loge.

## D.

Distillation, opération par laquelle, à l'aide de la chaleur, on réduit en vapeurs, dans des vaisseaux clos, les substances qui en sont susceptibles. Ces vapeurs refroidies se condensent, passent à l'état liquide, ou prennent la consistance d'une gelée ou du beurre, suivant leur nature. C'est par la distillation qu'on retire l'eau-de-vie du vin, de la lie, du marc; qu'on fait l'esprit-de-vin avec de l'eau-de-vie; l'alkool, l'éther avec de l'esprit-de-vin; qu'on retire les huiles essentielles des plantes.

Double, *pleine*, se dit d'une fleur dans laquelle les étamines, par une abondance de nourriture, se convertissent en pétales et étouffent les pistils.

Drageon, branche repoussant des racines de quelques plantes ligneuses et qu'on détache pour la transplanter. C'est une sorte de marcotte naturelle.

Ductile, qui se façonne, s'étend, se file par la pression, le tirage, comme l'argent, le cuivre, le fer, etc.

## E.

Écrouir, resserrer, comprimer un métal, le rendre plus compact par le martellage, le tirage à la filière.

Effervescence, bouillonnement, dégagement de bulles plus ou moins tumultueux, qui s'opère avec ou sans chaleur, lorsqu'on verse un acide sur une terre calcaire, du marbre, un alkali.

Émoudre un canon de fusil, c'est le passer, après avoir été forgé, sur une meule de grès, pour l'user, l'arrondir, l'unir extérieurement en le réduisant dans toute sa longueur aux différentes épaisseurs qu'il doit avoir. Ce travail se fait aussi pour dégrossir les armes blanches.

Émulsion, préparation d'amandes ou de semences dépouillées de leur coque, de leur peau, réduite en pâte qu'on délaye dans l'eau. L'émulsion est un mucilage uni à une huile qu'il rend miscible à l'eau. L'orgeat est une émulsion.

Espèce. Plus de cinquante mille individus de plantes sont connus. Pour en faciliter l'étude, on les divise en classes, ordres, ou

familles; on sous-divise en genres, les genres en espèces, les espèces en variétés.

On reconnoît une espèce en ce que la graine reproduit la même plante sans dégénération. On ne peut conserver une variété par la graine; mais on la conserve par la bouture, la marcotte, le drageon et la greffe.

Étamines, organes mâles de la fleur, dont la partie principale est l'anthère soutenu ou non par un filet. (*Voyez* Anthère.)

## F.

Fécondation. Lorsque toutes les parties de la fleur sont mûres, le filet de l'étamine se courbe sur le pistil; l'anthère s'ouvre; la pousière qu'il contient se répand, s'attache à l'orifice humecté du stigmate; les globules de poussière éclatent; il en jaillit un fluide qui pénètre jusqu'à l'ovaire, en féconde les embryons. Après cette opération, le calice, la corolle, les étamines, le stigmate se dessèchent, tombent; l'ovaire survit, prend de l'accroissement, devient le fruit de la plante dans lequel la graine mûrit et devient propre à la reproduction.

Fécule, substance farineuse contenue dans quelques racines, tubercules ou semences, qu'on en sépare en divisant à la rape, au pilon, et broyant ensuite dans l'eau froide. La fécule se détache, se précipite; on la fait sécher; on la conserve dans un lieu sec.

Fermentation, mouvement intérieur qui s'excite naturellement dans le *moût* des fruits mûrs, succulens, écrasés, rassemblés dans un vase, comme raisins, cerises, mûres,

pommes, poires, sorbes, etc. ou dans les farines de grains germés, séchés, moulus, délayés, brassés, comme seigle, orge, etc. Il s'y excite de la chaleur; la masse gonfle, bouillonne; il s'en dégage un fluide pénétrant, invisible, acidule, qui suffoque les animaux, éteint les corps allumés qu'on y plonge, s'unit à l'eau, la rend piquante, rougit le tournesol, s'unit aux alkalis: c'est le gaz acide carbonique qui se trouve aussi dans les pierres à chaux, les marbres. Le moût se colore, devient piquant, parfumé, spiritueux; il en résulte le vin, le cidre, la bière, etc. Si la fermentation est continuée, elle conduit à l'aigre; fait du vinaigre.

C'est par la fermentation que les farines réduites en pâte, lèvent, s'échauffent, prennent de la saveur, donnent un pain léger, agréable; que les pyrites, les tourbes, les houilles mouillées s'échauffent et quelquefois s'enflamment; que le fumier, les feuilles, le foin, la paille, les écorces d'arbres, s'échauffent, lorsqu'ils sont humides, deviennent propres à l'incubation des œufs, à faire des couches de jardin.

Feuille, organe nécessaire à la plante pour absorber l'humidité et transpirer. Si un arbre chargé de fruits perd ses feuilles, ses fruits se dessèchent.

On donne vulgairement le nom de feuilles à des parties de la fleur dont le nom propre est *pétales*. (*Voyez* ce mot.)

Filasse, substance propre à faire du fil, des cordes, et qui se trouve dans l'écorce de plusieurs plantes, comme chanvre, lin, tilleul, mûrier, apocyn, etc.

Fleur, organe de la génération ou de

la fructification dans les plantes. La fleur complète est composée de *calice*, *corolle*, *étamines* et *pistil*; (*Voyez* ces mots.) elle est incomplète, si une de ces parties manque. La fleur est mâle, lorsqu'elle a des étamines et manque de pistil; elle est femelle, lorsqu'elle a un pistil et manque d'étamines; elle est hermaphrodite, lorsqu'elle a l'un et l'autre. La fleur mâle ne fructifie pas, mais elle rend la femelle féconde. La fleur femelle est stérile, si elle n'a pas dans son voisinage une fleur mâle. (*Voyez* FÉCONDATION.) La fleur est régulière ou irrégulière suivant le rapport de grandeur, la disposition de ses *pétales*; (*Voyez* ce mot.) elle est simple ou composée, semi-double, double ou pleine. Ces dernières, les plus riches en parure, sont des monstres en végétation, et ne fructifient pas. (*Voyez* DOUBLE).

FLUIDE, se dit de tout ce qui, comme l'air, est sans adhérence dans ses parties, compressible, élastique, expansif, s'échappe à travers l'eau, les liquides en forme de bulles. On contient un liquide en le soutenant par les côtés et le fond; on ne peut contenir un fluide qu'en le soutenant encore par le dessus, afin qu'il soit appuyé dans tous les sens. C'est ce que les physiciens appellent aussi *gaz*. L'eau, suivant que le calorique ou le principe de la chaleur lui manque ou y abonde, est à l'état *solide* (glace), à l'état *liquide* (eau proprement dite), ou à l'état *fluide* (vapeur). Tel est le sens dans lequel les mots *fluide*, *liquide* sont pris dans l'*Annuaire*: il seroit peut-être mieux d'appliquer le mot *fluide* à toute substance sans adhérence dans ses parties,

et susceptible de fluer, comme l'eau, l'air; d'appliquer le mot *liquide* à tout ce qui coule sans être sensiblement compressible, comme l'eau; et le mot *gaz* aux fluides compressibles et élastiques, comme l'air.

## G.

Gaz. (*Voyez* Fluide.)

Gomme, substance transparente, blanche, jaunâtre ou rougeâtre, plus ou moins molle, qui peut se dissoudre dans l'eau, et non dans l'esprit-de-vin. Les pruniers, cerisiers, abricotiers, amandiers, donnent une gomme qu'on pourroit employer davantage dans les arts. On donne mal à propos ce nom à quelques *résines*. (*Voyez* ce mot.)

Gousse, *légume*, *cosse*, capsule composée de deux valves qui renferment des graines, comme dans le pois, la lentille, etc.

Greffe, opération par laquelle un œil, un bourgeon, une petite branche pris sur un arbre, sont implantés frais dans l'écorce d'un autre arbre, dans une saison convenable pour avoir de meilleurs fruits. La greffe est par approche, en fente, en flûte, en couronne ou en écusson.

## H.

Herbacée. Une plante est herbacée lorsqu'elle a la taille, la consistance d'une herbe, par opposition aux plantes ligneuses, dont la consistance, la texture approchent de celle du bois.

Huile essentielle, substance liquide, volatile, odorante, inflammable, qui se dissout dans l'esprit-de-vin, l'eau-de-vie, entre dans les parfums. L'*huile grasse* n'est

soluble ni dans l'esprit-de-vin, ni dans l'eau; sert à la lampe, dans les alimens, dans les arts; entre dans la fabrication du savon.

Hygromètre, instrument destiné à mesurer l'humidité ou la sécheresse de l'air.

## L.

Labiée, se dit d'une plante dont la fleur a sa corolle d'une seule pièce, divisée en deux lèvres inégales, situées l'une au dessus de l'autre, renfermant quatre étamines, deux longues, deux courtes. Le fruit est formé de quatre graines nues, situées au fond du calice. La lavande, la mélisse, le thym, le serpolet ont leurs fleurs labiées.

Légumineuse, se dit d'une plante dont la graine est dans un *légume* ou gousse, comme le pois, la fève, le haricot.

Liber, *livret*, partie intérieure de l'écorce qui se convertit tous les ans en aubier; il s'en reproduit un nouveau.

Ligneuse : telle est la plante dont la tige, les branches ont la contexture, la solidité du bois.

## M.

Malléable, qui peut s'étendre sous le marteau, comme le fer, le cuivre, l'argent.

Marcotte, *provin*, *surgeon*, branche qu'on couche en terre; elle prend racine; on la détache ensuite de la plante-mère pour la transplanter.

## O.

Oeilleton. (*Voyez* Cayeux.)

Ombelle. Les fleurs en *ombelle* sont toujours posées au dessus de l'ovaire, et suppor-

tées par des pédoncules qui partent d'un même point comme les rayons d'un parasol. Elles ont cinq pétales, deux stiles courts; à la maturité la fleur tombe, l'ovaire se partage par le bas en deux graines nues, égales, tenant quelque temps par un filet. La carotte, le cerfeuil, le panais ont leurs fleurs en ombelle.

Ovaire, partie essentielle du *pistil*, contenant les germes ou embryons des graines qui sont sensibles même avant la fécondation.

Oxide, terre ou chaux métallique. Les métaux soumis à l'action du feu et de l'air pur, fondent, perdent leur éclat, passent à l'état terreux, augmentent de poids; c'est dans cet état qu'ils se nomment *oxides*.

## P.

Panicule, disposition des graines de quelques plantes sur des filets déliés, ramifiés, lâches, nombreux et disposés en pyramide.

Papilionacée : telles sont les fleurs des plantes légumineuses qu'on appelle aussi *irrégulières*.

Pédoncule, filet par lequel une fleur, un fruit tient à la plante; vulgairement, *la queue*.

Pétale, pièce de la corolle. (*Voyez* ce mot.)

Pétiole, filet par lequel la feuille tient à la plante.

Pistil, organe femelle des fleurs. Il en occupe toujours le centre, soit au dedans, soit en dessous. Il est composé d'un *ovaire*, d'un stigmate et souvent d'un stile ou tube

joignant

joignant l'un à l'autre. ( *Voyez* Ovaire, Stigmate. )

Pivotante, se dit des racines de quelques plantes qui plongent verticalement dans la terre.

Potasse, *salin*, *alkali végétal*, substance saline qui attire l'humidité de l'air, s'y réduit en liqueur, verdit le sirop de violette, s'unit aux acides, est une des bases du salpêtre, est employée dans sa fabrication. On la retire, par le moyen de l'eau, des cendres de végétaux. La cendre gravelée est une potasse. ( *Voyez* Raisin. )

Poussière des étamines. ( *Voyez* Anthère. ) Elle est composée de globules qui à la maturité s'ouvrent avec explosion, et répandent un fluide très-élastique, inflammable, subtil, expansif : c'est le principe fécondant qui pénètre par le stigmate dans l'ovaire.

Prolifère, se dit particuliérement des fleurs du milieu desquelles naissent d'autres fleurs.

Pyrite, cuivreuse, ferrugineuse ou arsenicale ; substance minérale, jaune, verdâtre ou chatoyante, ayant l'éclat du métal, crystallisée ou ayant une forme régulière, le plus souvent cubique. Une pointe de fer y fait une trace terreuse. Elle est composée de soufre, de terres métalliques, de terre d'alun, etc.

Elle noircit à l'air, s'y décompose, y effleurit. Des pyrites entassées à l'air, mouillées, s'échauffent, quelquefois s'enflamment, donnent dans leur décomposition selon leur nature, du sulfate de fer ou de cuivre, de l'alun, etc.

Disposées avec du bois par couches alternatives, en grandes pyramides tronquées, on obtient, par un feu étouffé, du soufre qui se rassemble au sommet.

## R.

Rampante, se dit d'une plante dont les tiges filent sur la terre et s'y attachent par des racines, comme le fraisier.

Résine, substance solide, fusible, odorante, inflammable, soluble dans l'esprit-de-vin, non soluble dans l'eau. Elle diffère essentiellement de la *gomme* dont on lui donne mal à propos le nom. Plusieurs plantes en fournissent.

## S.

Salin. (*Voyez* Potasse).

Sarmenteuses : telles sont les tiges ligneuses, grimpantes de la vigne. Un grand nombre de plantes ont leurs tiges sarmenteuses : c'est ce que, dans les deux Indes, on nomme *lianes*, qui rendent souvent les forêts impénétrables.

Saur-craute, *chou aigre*. Le chou coupé très-menu sur un rabot, est mis par couches avec du sel et de l'eau dans un tonneau. Il fermente, s'aigrit ; on retire l'eau. Cette préparation, qui sert d'assaisonnement aux viandes bouillies, se conserve bien, supporte le transport.

Savon, combinaison de l'huile avec la *soude* ou la potasse rendues *caustiques* par la chaux vive. (*Voyez* Caustique.)

Soude, *alkali minéral*, substance saline qui ne s'humecte point à l'air comme la potasse ; elle verdit le sirop de violette,

s'unit aux acides ; est une des bases du sel marin appellé en conséquence *muriate de soude* ; est préférable à la potasse pour la fabrication du savon. On trouve de la soude dans quelques grottes en France, sur les bords de quelques lacs salés en Asie ; on l'obtient par la combustion de plusieurs plantes maritimes et par la décomposition du sel marin.

Stigmate, partie essentielle du pistil des fleurs, placée au dessus de l'ovaire, immédiatement ou avec un tube intermédiaire. C'est une ouverture quelquefois bordée de poils, qui s'humecte au moment de la fécondation, pour que la poussière des anthères s'y attache. Le stigmate reçoit et transmet aux embryons de l'ovaire, le fluide fécondant qui jaillit des globules de poussière de l'anthère au moment de leur explosion.

## T.

Tan, écorce de différens arbres, pulvérisée pour le tannage des peaux. *Seguin* en a rendu le transport inutile et l'emploi plus simple, plus économique et plus sûr, en retirant de l'écorce, par le moyen de l'eau, deux principes essentiels, l'un propre à débourrer les peaux, l'autre à les tanner ; ce dernier est la matière tannante ou le *tannin*. On peut faire le lavage de l'écorce, obtenir une dissolution plus ou moins forte dans les forêts, même dans celles qu'on ne peut exploiter.

Tannage des peaux. Cette opération consiste, 1°. à les désaigner, les décharner ; 2°. à leur ôter le poil, *débourrer*, ce qui se fait de quatre manières ; à la chaux, à l'orge fermenté, au tan aigri ; ou par l'en-

tassement et l'échauffement des peaux ; 3°. à les tanner, ce qui se fait en mettant les peaux débourrées dans des fosses avec du tan sec, par couches alternatives. Tout ce travail demande deux à trois ans.

*Seguin* est parvenu à tanner les peaux de veau dans deux jours, les plus fortes peaux de bœuf dans huit à dix jours. 1°. Il débourre dans une dissolution d'écorce privée de *tannin*, acidulée par un millième d'acide sulfurique ; 2°. il tanne en suspendant les peaux débourrées dans une dissolution chargée de *tannin*. Ce principe pénètre, se combine avec la matière de la peau, la rend imputrescible, solide, en lui conservant sa souplesse quand il est nécessaire.

Thermomètre, instrument destiné à mesurer la température de l'air, de l'eau, etc. Il est composé d'un tube de verre terminé dans le bas par une boule, fermé dans le haut au feu de lampe, après y avoir introduit du mercure ou de l'esprit-de-vin coloré en rouge. Pour le diviser, on le plonge 1°. dans de la glace fondante ; on marque sur le tube le point où s'arrête le filet de liqueur ; 2°. dans la vapeur de l'eau bouillante, lorsque le baromètre est à 28 pouces ; on marque ce second point. L'intervalle entre ces deux points est divisé en quatre-vingts parties ; on continue cette échelle au dessous de la glace et au dessus de l'eau bouillante.

La retraite de l'argille dans le feu a fourni l'idée d'un thermomètre pour mesurer les grands degrés de chaleur dans les fourneaux de verrerie, de porcelaine, etc.

Touroir, *séchoir*, lieu où les brasseurs de bière font sécher l'orge après la germina-

tion. Le grain est étendu au dessus d'un gril de fer ; au dessous est un poële de fonte dont le feu est modéré. Les murs du touroir sont de briques ou de planches; le toit, de tuiles crues. Le grain séché est déposé dans un lieu très-sec ; on le nomme dans cet état *drèche*.

TRAÇANTE, se dit d'une plante dont les racines s'étendent horizontalement entre deux terres, et poussent des *drageons* comme l'*orme*.

TUBERCULE, corps charnu qui se forme aux racines de quelques plantes, comme la pomme de terre, le topinambour, le macjon, et sert à leur reproduction.

## V.

VARIÉTÉ. (*Voyez* ESPÈCE.)

VIVACE, qui vit plusieurs années. On le dit particuliérement des plantes dont les racines ne périssent pas tous les ans, mais dont les tiges périssent et se renouvellent comme la *luzerne*, le *houblon*.

FIN.

# TABLE
## DES
# MATIÈRES
## CONTENUES
## DANS CE VOLUME.

*Cette Table est refondue dans la Table générale des Matières.*

# TABLE GÉNÉRALE

## DES ARTICLES

Contenus dans les 14 années de cette Bibliothèque, formant jusqu'à ce jour 22 Volumes.

Nota. *Le chiffre romain indique le* Tome, *et les chiffres arabes indiquent l'*Année *et la* Page.

### A.

*Abeille*, 1795, II, 151.
*Abeilles* : recette d'une liqueur propre à remplacer le miel pour leur nourriture, 1783, I, 419.
—ruche nouvelle à deux hausses et en paille, 1783, I, 203.
—nourriture des Abeilles, 1786, I, 117.
—visites à leur faire : manière de les gouverner, 1786, I, 118 et 127.
—moyen de les conserver en hiver, 1789, II, 110.
—moyen de les préserver d'être détruites par le froid, 1790, I, 168.

*Abeilles* : manière de gouverner les ruches pour que l'hiver ne leur fasse pas de tort, 1792, I, 290.
—tableau pour se rendre compte du produit d'une ruche, 1794, I, 272.
—dans différens mois de l'année, les changer de ruches, 1786, I, 118 et 127.
*Abiponiens* : peuple du Paraguay ; leurs mœurs, 1787, I, 280.
*Abricot*, 1795, II, 225.
*Abricotée*, voyez *Prune*, 1795, II.
*Absinthe*, 1795, II, 202.
*Acacia* (faux), 1795, II, 187.
*Accidens* occasionnés par le feu, 1786, I, 229 *et suiv.*
—des moutons, 1787, I, 198.
—de voiture renversée quand l'essieu casse: moyen de les prévenir, 1788, I, 278.
—du pied du cavalier désarçonné, 1788, I, 279 et 280.
—de taureau, 1788, I, 282.
—de divers genres par diverses causes, 1790, I, 290.
—*idem*, 1790, II, 361 *et suiv.*
—occasionnés par les moules : préservatifs, 1791, I, 315 *et suiv.*
—occasionnés par les plâtres neufs, 1791, I, 312.
—occasionnés par les vases de cuivre, 1791, I, 315.
—de la vue, 1791, I, 362.
—causés par le plomb et l'étain, 1791, II, 337 *et suiv.*
*Acclimater* les arbres étrangers: observations et expériences, 1794, I, 152.
*Accouchées* : proportion de leur mortalité, 1788, I, 309.

*Accouchées* : comparaison du nombre des accouchemens où l'enfant se présente par la tête, à ceux où il se présente par les pieds, 1788, II, 325.
—récemment, 1790, I, 347.
*Achat* : manière d'être trompé en achetant, 1788, II, 290.
*Acide*, 1795, II, 276.
*Acides*. Karabique : manière de l'obtenir, 1784, I, 405.
—minéraux, végétaux, animaux : leur fermentation, 1786, I, 270.
—nouveau moyen de les reconnoître, 1786, I, 341.
—vitriolique, acquiert plus de poids en se gelant, 1787, II, 351.
—*idem*, conseil d'en mêler à l'eau qu'on embarque pour la conserver bonne longtemps, 1789, II, 182.
—acidité est le principe des vins agréables et les rend salubres, 1789, II, 188.
—spatique est un moyen de graver sur le verre, 1790, II, 422.
—nuisibles ou non dans les terres marécageuses : moyen de les découvrir, 1793, I, 12-13 *et suiv.*
—employés contre la rage, 1793, I, 433.
*Acier* : perfectionnement de la fabrique, 1786, II, 382.
—manière de préserver les instrumens d'Acier de la rouille, 1787, II, 307 et 309.
—manière de le garantir de la rouille, 1790, II, 382.
—procédé pour lui donner une couleur bleue, 1795, I, 388.
—voyez *Fer*, 1795, II.

*Aconit*: perd de son action nuisible en vieillissant, 1787, I, 295.
*Administration* domestique : conseils sur cette administration, 1790, I, 215.
—des biens: conseils des anciens, 1790, II, 246.
*Aérostat*, 1795, II, 276.
*Aérostatique* : précis sur l'Aérostatique, 1784, I, 104.
—du feu, 1784, I, 107.
—de l'air inflammable, 1784, I, 111.
—des Aérostats : de leur construction, 1784, I, 117.
—méthode de produire l'air inflammable, 1784, I, 125.
—de la direction, 1784, I, 127.
—instruction pour servir de calcul aux aérostats, 1784, I, 128.
—tableau de leurs principales dimensions, 1784, I, 137.
—gomme élastique pour les enduire, 1784, I, 398.
—autre gomme pour le même objet, 1784, I, 388.
—voyage de M. Tetu, 1787, II, 347.
*Affections* scorbutiques : élixir pour les guérir, 1782, I, 246.
—nerveuses: chroniques de l'estomac; remède pour les guérir, 1787, I, 309.
—spasmodiques : remède pour les guérir, 1787, I, 388.
—vaporeuses, 1788, II, 259 et 262.
—vaporeuse, causée par l'usage des chaufferettes, 1791, I, 293.
—de poitrine : rhume opiniâtre; remède, 1794, I, 307.

*Affermer* ses terres par petits lots est souvent un avantage, 1790, II, 247.
*Agaric*, voyez *Amadouvier*, *Champignon*, 1795, II.
*Age* de retour : état de l'estomac à cette époque, 1786, I, 304.
*Agenda*, ou journal de ce qu'on doit faire chaque saison, nécessaire aux fermiers, 1790, II, 1.
*Aglandou*, voyez *Olive*, 1795, II.
*Agneaux* qui refusent de teter : moyen de les élever; inconvéniens du biberon; procédé de castration des Agneaux désapprouvé, 1786, II, 159.
—soins qu'on doit leur donner, 1787, I, 123.
—manière particulière de les élever, 1787, II, 138.
—à quel âge et comment doit-on leur couper la queue, 1790, II, 118.
*Agriculture* : avantage qu'elle tire des décrets de l'Assemblée nationale, 1790, *préface*.
—observations-pratiques sur l'Agriculture, 1784, I, 38.
—de divers cantons des environs de Paris, 1790, I, 54.
—ses profits selon l'éloignement du propriétaire de sa terre, etc. 1791, I, 227.
—essais relatifs à l'Agriculture faits durant dix-huit ans, 1791, II, 59.
—angloise : livres anglois sur cette partie, 1792, I, 363.
—de la Normandie, du Bessin, 1790, II, 33.
—de la Picardie, 1790, II, 45.
—de la plaine de Caen, de la vallée d'Auge, 1790, II, 34.

*Agriculture* : du Cotentin, 1790, II, 36.
—du pays de Caux, 1790, II, 39.
*Aigues* (la Tour d') : sa culture, 1794, I, 19.
*Aiguille* de Vénus : seroit-elle un bon fourrage, 1791, II, 75.
*Aiguillon* de la raie, n'est pas venimeux, 1787, I, 290.
*Ail*, 1795, II, 212.
*Aillau*, voyez *Narcisse*, 1795, II.
*Aimant*, voyez *Fer*, 1795, II.
*Aimans* artificiels : manière d'en faire, 1785, I, 388.
—aiguille aimantée : ses propriétés ne sont pas suffisamment établies, 1788, I, 329.
*Air* : manière de purifier l'air d'un appartement, 1782, I, 203.
—moyen de diminuer les mauvais effets de l'air sur l'économie animale, 1783, I, 228.
—manière de retirer de l'eau un air supérieur en bonté à celui de l'athmosphère, applicable aux hôpitaux et prisons, 1785, I, 358.
—formation de diverses espèces d'air, 1786, I, 268.
—acide, 1786, I, 269.
—hépatique, 1786, I, 271.
—impur, 1786, I, 269.
—inflammable, 1786, I, 270.
—nitreux, 1786, I, 271.
—phlogistiqué, 1786, I, 274.
—déphlogistiqué, 1786, I, 272 et 274.
—athmosphérique, 1786, I, 274.
—des montagnes, pas plus pur que celui des terreins moins élevés, 1786, I, 267.
—pur, combiné avec le feu et la hu-

mière, forme diverses espèces d'air, 1786, I, 268.
*Air* : altéré par les parfums, 1786, I, 275.
—fixe, annoncé comme remède, 1786, II, 372.
—inflammable ; il n'est pas démontré qu'il soit un principe de l'eau, 1786, II, 349.
—des environs de Paris : son degré de salubrité, 1787, I, 269.
—de la pleine mer : sa salubrité, 1787, I, 269.
—rendu propre à la respiration par les émanations des végétaux exposés au soleil, 1787, I, 265.
—sa température, 1787, I, 272.
—moyen d'en reconnoître la pureté, 1787, II, 344.
—moyen d'en reconnoître l'électricité et son intensité, 1787, II, 346.
—des hautes montagnes, et spécialement du Mont-Blanc : ses qualités, 1788, I, 287.
—inflammable, employé à faire des feux d'artifice, 1788, II, 341.
—méphitique : préservatif contre ses effets, 1789, II, 241.
—athmosphérique, peut être rendu inflammable, 1789, II, 377.
—des granges, greniers, serres, fruiteries, n'est pas malfaisant, 1790, II, 371 et 374.
—fixe ou méphitique, fait mourir les poissons, 1790, II, 374.
—gaz azotique : espèce d'air mortel, 1790, II, 374-371.
—son état sert à prévoir le temps prochain, 1792, I, 383.

*Air* des appartemens : manière de le purifier, 1792, I, 426.
—causes qui le rendent mal-sain dans les bergeries et étables, etc, 1792, II, 229.
*Aire* : de grange, 1791, II, 329.
*Aisselle*, 1795, II, 277.
*Ajonc*, 1795, II, 69.
*Alaterne*, 1795, II, 129.
*Alcyon* de mer, 1787, I, 292.
*Algues* : plantes marines employées à reconnoître l'humidité de l'air, 1786, I, 288.
*Alimens* : ne doivent pas être préparés dans des matières de bronze, 1788, I, 268.
—dangers des vaisseaux d'étain pour préparer et conserver les alimens, 1789, I, 208.
—liquides et solides, lesquels sont les plus faciles à digérer, 1789, II, 297.
—très-difficiles à digérer, 1789, II, 299.
—faciles à digérer, 1789, II, 300.
—danger de les conserver dans des vaisseaux de cuivre, 1791, I, 315.
*Alizier*, 1795, II, 50.
*Alkali* volatil fluor : procédé pour l'obtenir, 1784, I, 390.
—son usage pour les cancers ulcérés, 1784, I, 312.
—nouveau moyen pour les reconnoître, 1786, I, 341.
—minéral : meilleure manière de le préparer, 1786, II, 390.
—volatil : ses effets contre les maux occasionnés par la morsure de la vipère, 1781, I, 317.
—volatil fluor, contre les maladies des bêtes à cornes, 1788, I, 183.
—fixe, employé dans les engrais, 1793, I, 113.

*Allaitement* prolongé des enfans, n'est pas préjudiciable à leur esprit, 1787, I, 261.
*Alleluia*, voyez *Oseille*, 1795, II.
*Alliage* pour étamer, annoncé nouveau, 1786, I, 384.
*Almanach*, ou calendrier du fermier et du laboureur, 1790, II, 3.
*Aloès* : notice sur ce végétal, 1795, I, 132.
*Alsace* : cours de ses moissons; observations, 1794, I, 5.
*Altération* du vin, 1789, I, 216 *et suiv.*
*Alterner* : méthode avantageuse; preuve de ses succès, etc. 1793, I, 96 *et suiv.*
*Alun* : procédé pour en former, 1792, I, 431.
—moyen de le reconnoître dans le vin, 1792, II, 413.
*Amadoue*, voyez *Amadouvier*, 1795, II.
*Amadouvier*, 1795, II, 114.
*Amande*, 1795, II, 230.
*Amandier*, voyez *Amande*, 1795, II.
*Amaranthe*, 1795, II, 27.
*Amaryllis*, 1795, II, 41.
*Ambre* jaune, voyez *Bitume*, 1795, II.
— ciré : son origine; où il se trouve, 1786, I, 255.
*Améthystes* factices : procédé pour les faire, 1787, I, 359.
*Amélioration* des terres, 1791, I, 100.
*Aménagement* des bois taillis, 1792, I, 257.
—le plus avantageux des bois de futaie, 1792, I, 277.

*Amendemens*, doivent être distingués des engrais, 1791, I, 15 *et suiv.*
—marne, gravier, terres, vases d'étangs, de mare, chaux. *Voyez* ces mots année 1791, vol. II.
*Américains* : de la province de Terre-Neuve ; observations sur leurs différentes espèces, 1788, I, 300.
—harengs d'Amérique, 1789, I, 296.
*Amérique* très-anciennement habitée par des peuples civilisés, 1788, I, 285.
—conjectures sur la séparation et la population de l'Amérique, 1789, II, 315.
*Amidon*, voyez *Bled*, *Maïs*, *Pomme de terre*, 1795, II.
*Ammoniac*, 1795, II, 277.
*Amphibie* : espèce de monstre, 1789, II, 341.
*Ane*, 1795, II, 31.
*Anémone*, 1795, II, 159.
*Ancolie*, 1795, II, 166.
*Anesse*, voyez *Ane*, 1795, II.
*Angélique* : manière de la confire, 1794, I, 337.
—*idem*, 1795, II, 181.
*Animaux* : acide vitriolique donné avec succès aux animaux, 1784, I, 334.
—manière de leur faire avaler une boisson, 1784, I, 339.
—autre manière, 1784, I, 47.
—ils ne s'empoisonnent pas réciproquement, 1786, I, 250.
—moyen de les conserver dans les cabinets d'histoire naturelle, 1786, II, 343.
—qui ne veulent pas sortir des écuries incendiées ; moyen à employer, 1787, I, 255.

*Animaux* frappés de la foudre : secours à leur donner, 1787, I, 253.
—mêlés, provenans d'une louve et d'un chien, 1789, II, 335.
—qui font du dégât dans un jardin, moyen de les détruire, 1790, I, 193.
—tarif fait pour chaque espèce à Saint-Germain, 1790, I, 196.
—dartres et gale auxquelles ils sont sujets, 1790, II, 225.
—leurs actions servent à prédire le temps, 1792, I, 379.
—carnassiers : moyen de les tuer, 1790, II, 433.
—signes qu'ils donnent comme pronostics des changemens de temps, 1793, I, 323-330.
*Anis*, voyez *Fenouil*, 1795, II.
*Années* froides, humides, chaudes, sèches, leur effet sur les grains, 1793, I, 269-273.
—bonnes ou mauvaises : tableau à ce sujet, 1794, I, 229.
*Anneau* hydrostatique : machine pour préserver d'être noyé, 1788, I, 266.
*Annuelle* (plante), 1795, II, 277.
*Anthère*, 1795, II, 277.
*Anthrax* : méthode éprouvée contre cette maladie des animaux ; méthode de les traiter, 1785, I, 334.
*Aphtes* à la langue des bestiaux, 1790, II, 220.
*Apothicaires*, ne devroient pas se servir de cuivre pour préparer les médicamens, 1791, I, 315 *et suiv.*
*Appareil* : arithmétique à l'usage des aveugles, 1788, I, 426.

*Apparence* de mort : soin qu'il faut avoir des personnes qui viennent de mourir, 1789, I, 254.

*Appartemens* : moyen d'en purifier l'air, 1782, I, 203.

—moyen d'en préserver l'humidité, 1782, I, 342.

—moyen d'en échauffer plusieurs par le feu d'une seule cheminée, 1784, I, 198.

—chauffés avec le charbon de terre et la tourbe, 1784, I, 204.

—moyens employés en Russie pour échauffer les appartemens, 1787, II, 267.

—moyen d'en rendre l'air plus sain, 1788, II, 389.

—moyen de leur procurer une chaleur douce, 1784, I, 198.

—chauffés avec le charbon de terre et la tourbe, 1786, I, 204.

—peuvent être rendus aussi chauds que les maisons russes, 1786, II, 245.

—moyen employé en Russie pour se garantir du froid, 1787, II, 267.

—moyen d'en rendre l'air plus sain, 1788, II, 389.

—au rez-de-chaussée, sont préjudiciables à la santé, 1792, I, 431.

*Appétit*, voyez *Civette*, 1795, II.

*Apocyn*, 1795, II, 252.

*Apprêt* nouveau du papier imprimé et non imprimé, 1786, I, 387.

*Araignée* des moutons : maladie de la tête, 1787, I, 182.

—crabe : notice sur cet animal et celui à mille pieds de l'Amérique, 1789, II, 352.

*Araire, Arau*, voyez *Charrue*, 1795, II.
*Arbres, Arbrisseaux et Arbustes* : moyens de hâter et favoriser leur accroissement, 1783, I, 422.
—méthode de marcotter un arbre, 1783, I, 391.
—fruitiers dont l'écorce auroit été mangée par le gibier : moyen d'y remédier, 1784, I, 85.
—fruitiers : manière de les élever en pyramide ou quenouille, 1785, I, 126.
—moyen pour en écarter le gibier, 1785, I, 131.
—avantages de nettoyer l'écorce, 1786, I, 99.
—avantages de laver et frotter la tige des arbres, 1786, I, 100.
—dont l'écorce a été rongée par le gibier : moyen d'y remédier; et inconvéniens, 1786, I, 102 et 103.
—fruitiers pour planter, 1786, II, 165, 166, 181.
—dont les feuilles peuvent servir à nourrir les bestiaux, 1786, II, 83.
—leurs feuilles et jeunes pousses données avec succès aux animaux, 1787, I, 77.
—dont l'écorce est vieille : moyen de la renouveller, 1787, I, 158.
—moyens de les multiplier par les racines, 1787, II, 175.
—moyen de multiplier les arbrisseaux par les racines, 1787, II, 175.
—*idem*, les arbustes, 1787, II, 175.
—disposition qu'on peut employer dans les plantations d'arbres pour qu'ils deviennent plus productifs, 1788, I 154.

*Arbres, Arbrisseaux, Arbustes* : étrangers, qui peuvent s'élever en pleine terre, 1788, I, 412.
—résineux, multipliés par boutures, marcottes, greffes, 1788, I, 162.
—désavantages des moyens de les multiplier, 1788, I, 16.
—fruitiers : moyens de les préserver de l'intempérie des saisons, 1788, I, 165.
—maltraités par la grêle : traitement employé dans ce cas, 1789, I, 129.
—pousses d'Arbres : moyens d'en tirer parti, 1789, I, 178.
—moyen d'en éloigner les lièvres et les lapins, 1789, II, 152.
—fruitiers : moyens de les mettre à fruit quand ils ne fleurissent pas, 1790, I, 144.
—jeunes : mauvaises pratiques de fendre leur écorce, et de couper leurs pousses latérales, 1790, I, 206.
—fruitiers : maladies auxquelles ils sont sujets ; remèdes à y apporter, 1790, I, 150.
—à fruit : manière de les multiplier par bouture, 1791, I, 122.
—leur ébourgeonnement, 1791, I, 122.
—préservés de la gelée, 1791, I, 435.
—sont en général plantés trop profondément dans ce pays, 1791, I, 119.
—moyens de préserver la tige des dégâts, 1791, I, 117.
—manière nouvelle conseillée comme préférable, 1791, I, 118.
—qui exigent la terre de bruyères, 1791, II, 179.
—ne s'accommodent pas de la terre de

bruyères au bout de quelques années ; ils sont moins susceptibles de geler, 1791, II, 181.
*Arbres*, *Arbrisseaux*, *Arbustes* : qu'on conseille de préférer pour garnir les bois et forêts, 1791, II, 163.
—fruitiers, endommagés par les exhalaisons marécageuses, 1792, I, 326.
—avantage de défoncer le terrein quand on plante des arbres, 1792, II, 225.
—espaliers, doivent être plantés à une grande distance, 1792, II, 327.
—de forêt : comparaison du profit en les aménageant en taillis ou en futaies de différens âges, 1792, II, 277.
—de futaie : leur accroissement observé, 1792, II, 283.
—composition pour guérir leurs plaies, 1792, II, 343.
—procédé pour multiplier les bonnes espèces d'arbres fruitiers par la greffe sur les racines, 1792, II, 333.
—préparation du terrein pour en faire les semis, 1793, I, 363.
—effeuillés pour n'être pas gelés, 1793, I, 221.
—dans les plaines : leur état et qualité, 1793, I, 361.
—sur la pente d'un côteau dans les vallées, 1793, I, 361.
—choix pour les plantations, 1794, I, 168 et 172.
—de remplacement, 1794, I, 173.
—doit-on les orienter ? 1794, I, 187.
—on doit ôter la surpeau, 1794, I, 192.
—on doit les scarifier dans le cas d'abondance de sève, 1794, I, 192.

*Arbres*, *Arbrisseaux*, *Arbustes* : moyens de les garantir de la gelée, 1794, I, 193.
—à fruit : il ne faut laisser aucune plante à leur pied, 1794, I, 205.
—nécessité de les multiplier dans les places, les cimetières, et le long des routes, 1795, I, 150.
*Arbre*, 1795, II, 277.
*Arbrisseau*, 1795, II, 277.
*Arbuste*, 1795, II, 278.
*Ardoise*, 1795, II, 91.
*Aréomètre*, 1795, II, 278.
*Argent et Argenterie* : méthode pour tirer l'argent et l'or du galon sans le brûler, 1782, I, 352.
—moyen de les nettoyer et blanchir, 1787, I, 262.
—extraction de l'argent de sa mine, d'après le procédé de M. Borne, 1788, I, 363.
—*vif*, voyez *Mercure*, 1795, II.
*Argille*, 1795, II, 89.
—moyen de la purifier et la rendre propre à faire des creusets, 1783, I, 377.
—avantage de la terre argilleuse pour conserver le feu nutritif nécessaire aux plantes, 1793, I, 16.
—graveleuse, 1793, I, 28.
—rutumescente, 1793, I, 30.
—mêlée de chaux, 1793, I, 27.
—nuisible si elle domine, 1793, I, 17.
—vitrioliquenuisible à la végétation, 1793, I, 113.
—employée comme amendement, 1791, I, 18.
*Aridité* : cause de la stérilité; moyens d'y remédier, 1791, II, 250.

*Armoiries* : généalogie, dessinateurs; ornemanistes pour armoiries, 1788, I, 429.
*Armoise*, 1795, II, 224.
*Arnica* : son infusion; remède contre la goutte seraine, 1788, I, 355.
*Arpent* : combien un Arpent contient de perches, etc., 1792, II, 397.
*Arrête-bœuf* : plante; moyens de la détruire, 1791, II, 65.
*Arroche*, 1795, II, 175.
*Arrosemens* des prés, 1785, I, 54.
—des prairies; moyen de les améliorer, 1790, I, 53.
—des prés par irrigations, 1791, I, 62.
—des pêchers en espalier, 1792, II, 335.
—des champs, 1793, I, 61 et 69.
—des plantes potagères, 1794, I, 210.
—des prés bas ou naturels, 1788, I, 56.
*Arrosoir*, 1795, II, 224.
*Arrosoirs* roulans, 1792, I, 301.
—roulans ou en brouette, 1792, II, 323.
*Arsenic* : remède éprouvé avec succès contre ses effets, 1785, I, 307.
—danger d'employer ce poison comme remède, 1786, II, 371.
—danger de son usage pour laver les moutons, 1787, II, 189.
*Art* polygraphique, 1790, I, 361.
*Artichaud*, 1795, II, 203.
—décoction de la feuille pour tanner, 1789, I, 337.
*Artois* : cours de ses moissons, 1794, I, 3.
*Asclepias*, syriaca, ou plante à soie, 1794, I, 117.
*Asfodel* (*Lys*), voyez *Hémérocalle*, 1795, II.
*Asperge*, 1795, II, 143.

*Asperges* : nouvelle manière de les cultiver, 1782, I, 133.
—manière de les préparer qui leur ôte l'odeur forte qu'elles donnent aux urines, 1785, I, 357.
—manière de faire des plants d'Asperges et de les entretenir, 1786, II, 177.
—de primeur : culture et soin pour les avoir, 1792, I, 309.
—leur culture, 1788, I, 166.
*Asphalte*, voyez *Bitume*, 1795, II.
*Asphixie* qu'on éprouve dans les endroits où il y a beaucoup de personnes, comme ateliers, hôpitaux, églises, spectacles, 1792, I, 434 *et suiv.*
—accidentelles ou cachées : moyens pour les reconnoître et les guérir, 1792, I, 34.
—*idem*, 1792, II, 429.
*Asphixies* : irritation dans l'intérieur du nez, conseillée dans l'Asphixie, 1788, II, 283.
*Asphixiés* traités comme morts et rappellés à la vie, 1789, II, 235.
—morts récemment, ou morts en apparence, 1790, I, 302.
—moyen de les secourir, 1790, I, 292-294.
—précautions et soins à prendre des Asphixiés, 1790, II, 364.
—détails sur l'Asphixie, et remèdes à employer, 1791, I, 325 *et suiv.*
—causée par la vapeur du charbon ou braise, 1791, I, 354.
—causée par la vapeur du vin et autres liqueurs en fermentation : moyens d'y remédier, 1791, II, 349.
—causée par les odeurs fortes, 1791, II, 351.
—causée par la vapeur des fosses d'aisance, puisards,

puisards, égoûts, cimetières, etc. 1791, II, 354 *et suiv.*
*Assafœtida*, 1786, II, 371.
*Assolomens*, ou succession de culture des mêmes terres, 1790, I, 118.
—*idem*, 1790, II, 89 *et suiv.*
*Asthme* : observations sur cette maladie, 1785, 278.
*Astringent*, 1795, II, 278.
*Athmosphère* : observations sur son électricité, 1787, II, 355.
—des hautes montagnes : ses qualités et effets, 1788, I, 287.
*Atrophie* des grains, 1793, I, 168.
*Attelage* de file, favorable pour labourer près des haies, avenues, vignes et murs, 1786, I, 11 et 12.
*Aubépine* : ses vieux pieds employés pour faire des haies, préférables aux jeunes plants, 1792, II, 300.
—observations sur les effets prétendus de l'odeur des fleurs de cet arbrisseau sur les poissons, 1795, I, 265.
—*idem*, 1795, II, 165.
*Aubergine*, 1795, II, 43.
*Aulne*, 1795, II, 148.
—erreur au sujet de cet arbre, 1792, II, 371.
*Aunée*, 1795, II, 234.
*Aurores* boréales, observées aux îles Shetland, 1789, I, 265.
*Auvergne* : sa culture, 1794, I, 19.
*Avantages* du cuivre en feuille pour couvrir les bâtimens, 1789, I, 338 *et suiv.*
*Avelinier*, 1795, II, 117.
*Averne*, voyez *Aulne*, 1795, II.
*Avertin* des moutons, 1787, I, 185.

*Aveuglement* des jeunes chevaux : moyens de le prévenir, 1783, I, 185.
*Avoine* : nouvelles précautions à prendre pour la donner aux bestiaux, 1795, I, 338.
—*idem*, 1795, II, 198.
*Avoines* : inconvénient de les laisser javellées ; prétexte pour les javeller, etc. 1786, I, 37-38 et 40.
—moulin pour l'écraser, 1787, II, 110.
—mouillée, conseillée pour les chevaux, 1788, II, 91.
—sur pied, est attaquée d'un ver, 1788, II, 325.
—culture de l'avoine plantée ou semée par paquets, 1789, I, 44.
—supprimée aux chevaux d'Angleterre, et remplacée par des carottes, 1790, I, 127.
—serrée humide, prend feu, 1790, I, 290.
—blanche et noire, cultivées en Angleterre, 1790, II, 25.
—sa culture dans le Hainault, 1791, I, 60.
—inconvénient de la semer avec du trèfle et du sainfoin, 1791, I, 44.
—son produit suivant la qualité employée pour semence, 1792, II, 66.
—procédé pour en obtenir une bonne farine qui, mêlée avec celle de froment, donne de bon pain, 1794, I, 333.
*Awols* : espèce de mets dont se servent les matelots indiens ; manière de le préparer, 1783, I, 405.
*Azaret*, 1795, II, 129.
*Azerole*, 1795, II, 56.
*Azur* : procédé pour en faire un, 1785, I, 380.

## B.

*Bacchante*, 1795, II, 55.
*Baies*, 1795, II, 278.
*Bains* froids : leur usage ; est-il salubre ? 1788, II, 296.
—de fauteuil : leur usage, 1790, II, 406.
—chauds : précautions à prendre, 1790, II, 400.
—de jambes : précautions à prendre, 1790, II, 406.
*Baleine* qui donne l'ambre gris, 1786, I, 255.
*Balle*, 1795, II, 278.
*Ballots* : machines propres à les charger sur les voitures, 1788, II, 364.
*Balsamine*, 1795, II, 27.
*Bananes* : moyen de conserver ce fruit et d'en extraire une bonne fécule, 1791, I, 260.
*Bandage* pour les cautères, 1786, II, 418.
*Barbeau*, 1795, II, 191.
*Bardeau*, voyez *Mulet*, 1795, II.
*Baromètre* : son usage pour mesurer la hauteur des montagnes, 1786, I, 283.
—*idem*, 1788, I, 333.
—animal : manière de le préparer, 1782, I, 291.
—observations faites avec ces instrumens 1785, I, 194.
*Baromètre*, 1795, II, 278.
*Bas* : moyens de moins crotter ses Bas en marchant, 1786, I, 196 et 197.
—chaussure pour les garantir de la boue, 1787, I, 227.

*Basalte*, voyez *Lave*, 1795, II.
*Basilic*, 1795, II, 226.
*Basse-Cour* gouvernée à la manière angloise, 1790, II, 52.
—soins qu'elle exige, 1791, II, 101.
*Bassins* : forme qu'il faut leur donner pour que l'eau puisse s'y conserver, 1790, II, 357 et 360.
*Bassiner* un lit sans charbon ni braise, 1787, II, 265.
*Bateau* : machine propre à enlever les Bateaux submergés, 1782, I, 229.
—machine propre à les remonter, 1788, I, 400.
*Bâtimens* de mer : méthode pour secourir un Bâtiment qui fait beaucoup d'eau, 1782, I, 239.
—leur construction pour prévenir les incendies, 1786, II, 218.
—neufs : risques de les habiter trop tôt ; préservatifs, 1786, II, 221 *et suiv.*
—peuvent être préservés de la destruction par les incendies ; procédé à ce sujet, 1787, 239 et 237.
—de fermes : leur disposition pour les garantir du feu, 1790, II, 352.
*Bâton* d'or, 1795, II, 171.
*Battoir* de grains, 1789, I, 358.
*Baumé* astringent de Richard, 1783, I, 312.
—voyez *Menthe*, 1795, II.
*Bayes* de cornouiller sanguin donnent de l'huile, 1795, I, 366.
*Bayonne* : son agriculture, 1794, I, 13.
*Bazane*, voyez *Belier*, 1795, II.
*Beauvais* : agriculture de ses environs, 1790, I, 56.
—culture d'une ferme de cette ville, 1791, II, 59.

*Beauvais* : culture et produit des terres de ses environs, 1792, II, 120.
*Beccabunga*, voyez *Cresson*, 1795, II.
*Bèche*, 1795, II, 130.
*Belette* rayée ou puante : sa description, 1789, II, 333.
*Belier*, 1795, II, 219.
*Beliers* : conseils pour améliorer les races, 1786, I, 1788.
—ne doivent être donnés aux brebis qu'en octobre et novembre, 1787, II, 142.
*Beligoire*, voyez *Eglantier*, 1795, II.
*Belladona* : spécifique contre la rage, 1793, I, 413.
*Belladone*, voyez *Amaryllis*, 1795, II.
*Belle-de-nuit*, 1795, II, 33.
*Bergerie*, voyez *Belier*, 1795, II.
*Bergeries* communes : leurs inconvéniens, 1786, I, 35.
—préférables aux hangards : leurs usages préférables aux parcs domestiques, 1786, II, 152.
—conseils sur les rateliers, 1787, I, 121.
—préférables aux parcs et hangards, 1787, II, 122-126.
—causes qui les rendent mal-saines ; moyen d'y remédier, 1792, II, 229.
—leur construction et tenue la plus avantageuse, 1792, I, 144.
*Berger* (choix d'un), 1794, I, 246 et 262.
—son âge, ses habits, son soin à la bergerie, 1794, I, 253 et 254.
—devroit connoître les maladies des bestiaux, 1794, I, 258.
—doit avoir quelques bêtes apprivoisées, 1794, I, 259.
—sédentaires, 1794, I, 246.

*Bergers* voyageurs des communes de ferme, 1794, I, 248 *et suiv.*
—de petits troupeaux, 1794, I, 250.
—dont les membres sont gelés : remède, 1794, I, 253.
*Berry* : qualité de son terroir, 1794, I, 41.
*Bessin* : agriculture de ce pays, 1790, II, 35.
*Bestiaux* qui pissent le sang, remêde, 1785, I, 338.
—herbe marine pour leur nourriture, 1785, I, 339.
—moyen de les nourrir quand on manque de foin et de paille, 1786, II, 77.
—*idem*, 1786, I, 50.
—changement de nourriture : précautions, 1786, I, 67.
—nourris de pommes de terre, pain, marc de raisin, turneps, 1787, I, 80 et 97.
—remède contre leurs maladies, 1787, II, 187 et 189.
—qui ont péri pour avoir mangé du navet : cause de cet accident, 1787, II, 178 *et suiv.*
—maladie nommée maladie de bois, 1789, I, 148 *et suiv.*
—nourris dans les prés bas y font amendement, 1789, II, 66.
—maladie commune et régnante parmi eux : soins qu'on leur donne en Angleterre, 1790, I 135 *et suiv.*
—leur nombre insuffisant pour fumer les terres en culture, 1790, I, 25.
—de consommation : avantage de leur destruction et reproduction, 1790, I, 215.
—aphtes et vessies à leur langue, 1790, II, 220.

*Bestiaux* : leur multiplication essentielle, 1791, I, 3.
—soin qu'on doit avoir des élèves, 1791, I, 95.
—mis à l'engrais, 1791, II, 161.
—nourris avec des carottes, 1791, II, 95.
—mis en pâture pour extirper les herbes parasites, 1793, I, 90.
—ravagent les bois, 1793, I, 363.
—cause de leur bon état au midi de la France, 1794, I, 9.
—châtrés ou tondus : précautions après ces opérations, 1794, I, 255.
*Bêtes* à cornes attaquées d'ulcères aux yeux, 1790, I, 210.
—à laine, 1792, I, 360 et 135.
—mises à l'engrais : compte de ce qu'elles rendent, 1792, II, 241-244.
—meilleure manière de les élever et gouverner, 1792, II, 212.
—remarques sur la manière de les gouverner, 1794, II, 278 *et suiv.*
*Bétoine*, 1795, II, 186.
*Beton*, espèce de mortier ; pourquoi n'est pas usité, 1788, I, 407.
*Betterave* nommée aussi Turlib, racine de disette : sa culture, 1787, II, 58.
—récolte de feuilles et leur produit, 1787, II, 61.
—récolte des racines : moyen de les conserver, 1787, II, 66.
—ses usages pour les bestiaux ; quantité qu'on peut en donner ; produit d'un arpent, 1787, II, 80 *et suiv.*
—pour la nourriture des bestiaux : sa culture, 1788, II, 84.
—champêtre : sa culture, 1789, I, 69.

*Betterave* champêtre : son usage, 1791, II, 97.
—ce qu'on doit croire des écrits sur ce végétal, 1792, I, 43.
*Betterave*, 1795, II, 48.
*Beurre* : moyen de le rendre meilleur et d'une belle couleur, 1787, I, 126.
—fort ou rance : moyen de le rétablir, 1787, I, 220.
—de Geret, grand Beurre, fort : fort de Geret, qui est verd, 1790, II, 295 *et suiv.*
—ses différentes qualités, 1791, II, 285.
—varie suivant la nourriture des vaches, 1791, II, 291.
—soins pour l'avoir bon et vîte, 1791, II, 292.
—quantité qu'on retire de la crême : moyen de le colorer, 1791, II, 292 *et suiv.*
—moyen d'avoir du lait qui ne contienne ni Beurre ni crême, 1791, II, 295 et 297.
—lait de Beurre, lait écrêmé pour le petit-lait, 1791, II, 298 *et suiv.*
—conseils pour le faire bon, 1792, I, 210.
—doux : ce que c'est ; manière de le faire, 1792, II, 411.
—moyen de le conserver sans rancir, 1788, II, 205.
—moulin à Beurre, 1783, I, 199.
*Biberon* pour les agneaux, 1786, II, 159.
*Biens* de campagne, qualités que doivent avoir le mari et la femme qui font valoir, 1785, I, 186 *et suiv.*
*Bière* : moyen de rétablir la Bière aigre, 1785, I, 360.
—moyen de reconnoître celle qui porte à la tête, 1787, II, 312.

*Bière* éventée : moyen de la rétablir, 1788, II, 189.
—faite avec le maïs, 1787, I, 201.
—fourneau propre à faire la Bière avec le charbon de terre, 1783, I, 202.
—voyez *Orge*, *Escourgeon*, *Sucrion*, *Avoine*, *Panais*, *Houblon*, *Sapin*, *Absynthe*, *Coriandre*, 1795, II.
*Bigarade*, 1795, II, 264.
*Bigarot*, voyez *Cerise*, 1795, II.
*Bijouterie* : plaqué d'argent, 1789, I, 334.
*Bijoux* d'or : moyen de les nettoyer, 1787, II, 310.
*Billons* : où sont-ils avantageux? 1793, I, 60.
—il est utile d'en changer la position tous les ans, 1793, I, 77.
—selon la méthode angloise, 1793, I, 83.
—quand sont-ils requis? 1793, I, 51.
*Bisannuelle* (plante), 1795, II, 279.
*Biscuit de mer*, voyez *Bled*, 1795, II.
*Biset*, voyez *Pigeon*, 1795, II.
*Bitume*, 1795, II, 81.
*Blanc* nouveau pour la peinture, 1786, II, 384.
—de baleine : son origine, 1786, I, 255.
*Blanchiment* du papier, estampes, livres et toiles, 1791, I, 377 *et suiv.*
—des toiles, perfectionné par l'acide muriatique, 1792, I, 465.
*Blanchissage* du linge : comment l'améliorer, 1792, I, 414.
*Blatte* des cuisines : moyen de les détruire, 1793, I, 437.
*Bled*, 1795, II, 212.
—*noir*, voyez *Sarrasin*, 1795, II.
—*de Turquie*, voyez *Maïs*, 1795, II.

*Bled* : préparation à lui donner avant de le semer ; préservatif contre la nielle, 1782, I, 299.
—germé : avis par le comité de boulangerie, 1782, I, 49.
—nouveau moulin pour le battre, 1782, I, 228.
—recette pour le conserver, 1782, I, 297.
—noir, 1783, I, 128 et 153.
—observations et expériences sur ses maladies, 1784, I, 15.
—carie, et moyens de l'empêcher, 1784, I, 18 *et suiv.*
—noir de Sibérie, observations, 1784, I, 101 et 43.
—différentes préparations pour le conserver, 1785, I, 84 *et suiv.*
—de Turquie, ou maïs, 1785, I, 1.
—moucheté, 1786, II, 23 et 24.
—carié, ne doit pas être battu dans la grange, 1786, II, 39.
—destiné à être semé : ses préparations, 1786, II, 14-57.
—moucheté : machine pour le laver, 1786, II, 400.
—moucheté rendu propre à la semence, 1786, II, 19.
—moucheté destiné à faire du pain : sa préparation, 1786, II, 191.
—effet du noir sur la germination de ce grain, 1786, II, 20.
—effet du noir sur la paille, 1786, II, 20.
—sur son prix, 1786, II, 21.
—sur les meules, 1786, II, 21.
—sur la farine, 1786, II, 21.
—sur le pain, 1786, II, 21.

*Bled* : moyens insuffisans pour empêcher la formation du Bled moucheté, 1786, II, 21.
—moyens assurés pour que ce bled n'en produise pas de semblable, 1786, II, 23 et 24.
—charbonné n'est pas la même maladie que le Bled carié, 1786, II, 37.
—noir moucheté : ses inconvéniens ; moyen de le préparer, 1786, I, 158 *et suiv.*
—nouveau, préjudiciable aux animaux, 1786, I, 168.
—maladies occasionnées par ce Bled, 1786, I, 169 *et suiv.*
—nouveau : ses mauvais effets sont douteux, 1786, I, 16.
—lavé, fait de beau pain, 1786, I, 165 *et suiv.*
—fauchage du Bled noir : avantage de cette pratique, 1786, I, 175 *et suiv.*
—moucheté : moyens de le purifier, 1786, I, 41.
—sarrasin difficile à moudre et à réduire en pain : attention pour le moudre, 1786, I, 173 et 174.
—pain de sarrasin, 1786, I, 174.
—farine de sarrasin, 1786, I, 175.
—de sarrasin : sa culture et ses préparations, 1786, I 33 et 34.
—moucheté, donne une récolte où il y a beaucoup de grains cariés, 1788, I, 16.
—moyen de rendre le Bled moucheté propre à la semence, 1788, I, 16 et 31.
—*idem*, 1787, II, 38.
—employé à faire de la soupe, 1787, II, 197.
—moucheté : autre procédé pour le nettoyer, 1787, I, 210.

*Bled* : sarrasin ; procédé pour le manger, 1787, I, 211.
—de semence : sa préparation, 1787, I, 37.
—rouillé, 1787, I, 39.
—dans quel temps il est plus sujet à la carie, 1787, I, 41.
—moyen de le conserver long-temps, 1788, II, 211.
—moucheté : terre propre à le nettoyer, 1789, I, 36.
—moucheté ou carié : cause et préservatif de cette maladie, 1789, I, 25 *et suiv.*
—moucheté, produit du grain de bonne qualité, 1789, II, 164.
—grains de Bled sain sur des épis cariés, 1789, II, 165.
—produit d'un seul grain de Bled dont on a plusieurs fois divisé les touffes, 1789, II, 4.
—pied ou touffe de Bled divisé, 1789, II, 20.
—moucheté ou carié peut être choisi pour semence, 1789, II, 23.
—nouveaux qui ne sont pas mûrs : avis à ce sujet, 1790, I, 233.
—et autres grains employés pour nourriture sans être en farine, 1790, I, 237.
—sarrasin grillé, remplace le café, 1790, II, 283.
—barbu de Pologne, 1794, I, 112 *et suiv.*
—voyez *Bled*, 1795, II.
*Blette*, 1795, II, 146.
*Bleu de Prusse*, voyez *Fer*, 1795, II.
*Buglose*, 1795, II, 178.
*Buis*, 1795, II, 119.
*Bulbe*, 1795, II, 279.

*Bocage* réduit en sablerie par une nouvelle machine, 1786, II, 397.
*Boëte* foudroyante pour la destruction des animaux carnassiers, 1790, II, 433.
*Bœuf*, 1795, II, 41.
*Bœufs* : le pan des Bœufs qui indique les plantes que mangent les bêtes à cornes, et celles qu'elles rejettent, 1782, I, 74.
—— remède contre les maladies des Bœufs, 1782, I, 275.
—— procédé pour saler sa chair, 1786, II, 209.
—— qu'on monte en selle, 1788, II, 247.
—— comparé au cheval pour le labourage : raison pour le préférer, 1789, II, 7.
—*idem*, 1790, II, 7 et 6.
—*idem*, 1791, I, 4.
—musqué de l'Amérique, 1789, II, 331.
—mauvaise manière de les atteler, 1790, I, 11.
—ils peuvent retenir une voiture à la descente, 1790, I, 13.
—de labours doivent travailler également, 1790, I, 125.
—à l'engrais : quantité ; nourriture qu'ils consomment, 1790, I, 137.
—avantages de leur rapide destruction avec remplacement, 1790, I, 216.
—moyens proposés pour qu'ils fatiguent moins et tirent plus fort, 1790, II, 8 et 9
—quelle quantité de choux est nécessaire pour nourrir des Bœufs à l'engrais, 1790, II, 100.
—leur fumier comparé à celui des chevaux 1791, I, 8.

*Bœufs* blessés par enclouure : manière de les guérir, 1791, I, 224.
—manière de les engraisser, 1792, I, 150.
—mis à l'engrais : comparaison de leur accroissement, 1792, I, 152.
—leur travail et produit dans l'exploitation des terres, 1792, II, 398.
—Accroissemens par l'engrais ; produits et dépenses, 1792, II, 241.
*Bouis*, voyez *Buis*, 1795, II.
*Bois* : sa culture en Picardie, et amélioration, 1782, I, 118.
—préparation pour l'améliorer, 1782, I, 113.
—procédé pour les mettre à l'abri des vers, 1783, I, 289.
—préparé pour la charpente et charronnage, 1783, I, 159.
—de construction pour la marine : essais pour s'en procurer, 1785, I, 111.
—avantage de les semer serrés, 1786, I, 75.
—pâturage dans les Bois, conseillé, 1786, I, 74.
—ses diverses espèces donnent différens degrés de chaleur : comparaison de la chaleur, et prix du Bois, 1787, I 236.
—charbon de Bois comparé à ceux de tourbe et de terre, 1787, II, 253 et 260.
—de construction : moyens d'être endommagés par la pourriture et les crevasses, 1790, II, 356.
—brûlé dans une cheminée, peut produire l'asphixie, 1791, I, 364.
—taillis, 1791, I, 169.
—forêts, 1791, II, 162.
—employés dans les bâtimens et exposés à

la pluie : moyen de les préparer pour qu'ils se conservent, 1791, II, 335 et 336.
*Bois* difficile à réduire en charbon : manière de réussir, 1792, I, 457.
—servent à prévoir le temps prochain, 1792, I, 382.
—de futaie : leur emménagement, 1792, II, 277.
—(grands), doivent être contigus et loin des habitations, 1793, I, 362.
—sur la cime des montagnes : leur utilité, 1794, I, 150.
—de Sainte-Lucie : son utilité au milieu des autres arbres, 1794, I, 144.
—de Sainte-Lucie : sa nature, sa culture, son utilité, 1794, I, 150.
—*à crayon*, voyez *Cèdre*, 1795, II.
—*joli*, voyez *Mezereum*, 1795, II.
*Boiserie*, empêche que les appartemens ne soient chauds, 1786, II, 231.
*Boissons* pour les enfans qui n'ont pas de nourrice, 1786, II, 214.
—faite avec le gland et le café pour remplacer le café, 1786, II, 217.
—vineuse, facile à faire à peu de frais, 1788, II, 187.
—des malades, soins et précautions dans leur usage, 1790, II, 391.
—danger de les conserver dans le cuivre, 1791, I, 315.
—artificielles, 1791, II, 302.
—économique : nouvelle invention, 1794, I, 351 *et suiv.*
*Boitement* des moutons : remèdes, 1787, I, 188.
*Bol*, voyez *Argille*, 1795, II.

*Bols* : précautions lorsqu'on les fait avaler aux chevaux, 1791, II, 210.
*Bolle* de maïs, 1787, II, 237.
*Bombax*, voyez *Coton*, 1795, II.
*Bonier* : mesure usitée en Flandre, 1791, I, 48.
*Bonne-dame*, voyez *Arroche*, 1795, II.
*Bonnet-de-prêtre*, voyez *Fusain*, 1795, II.
*Boque*, voyez *Bled*, 1795, II.
*Borax* trouvé natif, 1789, II, 365 *et suiv.*
*Bosses* : remède contre les Bosses et courbures de l'épine, 1787, II, 367.
*Bottes* de société, ou bottines pour faire des visites, 1786, II, 263.
*Bouc*, 1795, II, 128.
*Boucles* de soulier : comment elles doivent être lacées, 1792, I, 413.
— inconvéniens des grandes boucles, 1789, I, 150.
*Boues* : chaussure pour en préserver les bas, 1787, I, 227.
—bonnes pour engrais, 1793, I, 118.
*Bougies* économiques : procédé pour les faire, 1782, I, 310.
—inflammables par le contact de l'air, 1782, I, 309.
—*idem*, 1782, I, 300.
—de cire et de suif qui ne coule pas, 1785, I, 363.
—économiques de Hollande, 1788, I, 245.
—de gomme élastique (soude), 1789, I, 434.
*Bouillie* : objections contre son usage, 1787, II, 228.
*Bouillon* : combien il faut de viande pour le faire bon, 1792, II, 408.

*Bouillon* pour les malades : soins pour le faire, 1790, II, 397.
—blanc, 1795, II, 216.
—*Boulanger* : four de Boulanger ; ses proportions, 1788, II, 375.
*Bouleau* : son utilité, 1786, I, 74.
—*idem*, 1795, II, 146.
*Bouquet* des moutons : remèdes, 1787, I, 185.
*Bouquetin* : observations sur cet animal, 1787, I, 282.
*Bourbonnois* : qualité de son sol, 1794, I, 45.
—cours de ses moissons, 1794, I, 21.
*Bourg-épine*, voyez *Nerprun*, 1795, II.
*Bourgogne* : qualité de son sol, 1794, I, 45.
*Bourrache*, 1795, II, 176.
*Boussoles* portatives en forme de montre, 1788, II, 398.
*Bouture*, 1795, II, 279.
*Brabant* : sa culture, 1791, I, 52.
*Braise*, cause l'asphixie, 1791, I, 354.
—embrasée : ses dangers, 1794, I, 334.
*Brebis* : manière de les élever, 1788, II, 138.
—fromage de lait de brebis, 1789, II, 96,
—qui vont mettre bas : leur nourriture, 1791, II, 153.
—*idem*, 1795, II, 227.
*Bretagne*, Maine, Anjou : cours absurde des moissons, 1794, I, 12.
*Bridet* : préparation de matières fécales pour engrais, 1792, II, 41.
*Briques* économiques : procédé pour les faire, 1786, I, 349.

*Briques* creuses pour faire des planchers légers, 1788, I, 256.
*Brisoir* à mottes pour les terres fortes, 1787, I, 3.
*Brocoli*, 1795, II, 116.
*Broderie* en or: moyen de la nettoyer, 1787, II, 310.
*Brou*, voyez *Noix*, 1795, II.
*Brouette* angloise à bascule, 1792, I, 423.
*Brouillards* qui font présumer la pluie pour le lendemain, 1786, I, 281.
—de 1783 n'ont pas altéré la santé des hommes, 1786, I, 298.
—certains, sont la cause de la rouille des bleds, 1787, I, 39.
—en 1782: ses effets sur la température de l'air, 1787, I, 274.
—servent à prévoir le temps prochain, 1792, I, 371.
—leur effet sur le grain semé, 1793, I, 262.
*Broyeurs* de couleurs, 1791, II, 407.
*Brouille*: plante des étangs qui fait mourir le poisson, 1790, II, 161 *et suiv.*
*Bruges*: culture des environs de cette ville, 1791, I, 50.
*Brugnon*, voyez *Pêche*, 1795, II.
*Bruine* des bleds: moyens pour les en préserver, 1782, I, 292 *et suiv.*
—*idem*, 1785, I, 97.
*Brûlement* des fougères, herbes, genêts sur les terres, 1794, I, 15.
*Brûlures* guéries en y appliquant la pomme de terre, 1786, II, 375.
—remède, 1787, I, 328.
—de la peau par les matières grasses, 1789, II, 248.

*Brûlures* ; maladie des arbres ; remèdes, 1790, I, 155.
*Bruyère*, 1795, II, 72.
—(district de) : mauvais ordre de ses moissons, 1794, I, 11 *et suiv.*
*Bruyères* : terre ; préférence qu'elle mérite, 1791, II, 166.
—rendues profitables en y élevant des sapins, 1792, II, 295.

## C.

*Cabaret* : plante ; sa culture, 1794, I, 197.
—voyez *Azaret*, 1795, II.
*Cabinets* d'histoire naturelle : préparations des oiseaux et autres animaux, 1786, I, 260 *et suiv.*
—*idem*, 1786, II, 343.
—préparation des poissons, 1788, I, 325.
*Cacao* : ses espèces et sa préparation pour le chocolat, 1786, I, 181.
*Cadran* solaire nouveau, 1786, I, 352.
—horizontaux, avec équation, 1788, I, 386.
*Café* de santé, 1783, I, 424.
—instrument pour le faire par infusion, 1788, I, 210.
*Cafetières* pour le café, 1788, I, 210.
*Cailles* : leur passage d'Europe en Afrique, 1788, I, 311.
—*idem*, 1795, II, 188.
*Caillelait*, 1795, II, 192.
*Cailloux* : leurs effets dans les terres, 1791, II, 25.

*Caisse* d'escompte : connoissance de ses opérations, 1789, I, 183.
*Calamus aromaticus* : médicament analogue en propriétés au quinquina, 1786, I, 330.
*Calandre* : moyen d'empêcher cet insecte d'endommager les bleds, 1782, I, 297.
*Calcination* solaire : ce que c'est en labour, 1793, I, 83.
*Calendrier* du fermier, 1790, II, 3.
*Calice*, 1795, II, 279.
*Calle* des vaisseaux, sujette aux altérations de l'air qui cause l'asphixie, 1792, I, 436.
*Camelot*, voyez *Bouc*, 1795, II.
*Camomille*, 1795, II, 191.
*Campagnards* : ce qui peut les rendre heureux, 1793, I, 9.
*Camphre* : préservatif contre les vers, 1786, I, 195.
—procédé pour le purifier, 1783, I, 440.
*Campire* : canton du Brabant ; sa culture, 1791, I, 52.
*Canard*, 1795, II, 181.
*Canards* de la Guinée : manière de les élever, 1792, II, 268.
—leur éducation, 1795, I, 199.
*Canaux* : machine pour les vuider, 1794, I, 425.
*Cancer* : cataplasme contre le Cancer, 1782, I, 246.
—spécifiques contre les Cancers et ulcères, 1783, I, 276 et 281.
—*idem*, 1784, I, 312 et 314.
—*idem*, 1785, I, 331.
*Cancers* ulcérés ; alkali volatil donné comme remède, 1784, I, 312.

*Cancers* : liniment savonneux employé dans cette maladie, 1784, I, 314.
—( cataplasme contre les ), 1785, I, 331.
*Cane*, voyez *Canard*, 1795, II.
*Canelle*, voyez *Rose*, 1795, II.
*Canne*, voyez *Roseau*, 1795, II.
*Cannes* à sucre : vin fait avec son suc, 1789, I, 228.
*Canons* ( nouvelle construction de ), 1788, I, 429.
*Cantaloup*, voyez *Melon*, 1795, II.
*Cantharides* : teinture faite avec ces insectes, 1788, II, 348.
*Cantonnemens* des troupeaux : espèce, durée du cantonnement, 1786, I, 142 *et suiv.*
*Cantons* ravagés par la grêle, 1789, I, 125.
*Caoutchouc* : manière de le dissoudre, 1785, I, 380.
—autre manière, 1792, I, 462.
*Cap*, voyez *Bouleau*, 1795, II.
*Capillaire*, 1795, II, 140.
*Capre*, voyez *Caprier*, 1795, II.
*Caprier*, 1795, II, 233.
—arbre : sa culture, 1789, I, 120 *et suiv.*
*Capron*, voyez *Fraise*, 1795, II.
*Capsule*, 1795, II, 280.
*Cardière*, 1795, II, 259.
*Cardon*, voyez *Artichaud*, 1795, II.
*Carie*, voyez *Bled*, 1795, II.
—produit le noir : son préservatif, 1786, II, 37 *et suiv.*
—du froment : ses causes; moyens de les prévenir, 1787, I, 41 *et suiv.*
—*idem*, 1787, II, 19 *et suiv.*
—des orangers, 1787, II, 176.
—expériences sur la Carie des bleds, 1788, I, 16.

*Carie* : procédé pour la prévenir, 1788, II, 30.
—n'est pas toujours la faute du cultivateur, 1788, II, 287.
—moyen de la prévenir, 1789, I, 20 et 24.
—observations sur ses causes, 1789, II, 160.
—*idem*, 1792, II, 85.
*Carline*, 1795, II, 233.
*Carton-pierre* : son usage, 1788, I, 422.
*Carotte*, 1795, II, 27.
*Carottes* : leur culture et leurs avantages, 1787, I, 55 *et suiv.*
—données aux vaches, 1787, I, 117.
—semées avec l'orge, 1787, II, 70.
—substituée à l'avoine pour les chevaux, 1790, I, 127.
—moyens de les conserver, 1790, II, 306.
—leur emploi pour nourrir les chevaux, 1791, II, 23 et 94.
—semées dans les terreins plantés d'arbres, 1792, II, 299.
—(observations sur les), 1795, I, 72.
*Carpe*, 1795, II, 177.
*Carthame*, 1795, II, 224.
*Carvi*, voyez *Cumen*, 1795, II.
*Casseroles* de cuivre plaquées en argent, 1792, I, 398.
*Cassis*, voyez *Groseille*, 1795, II.
*Cassole* de maïs, 1787, II, 237.
*Cassonade*, utile au vin, 1787, II, 163.
*Castine*, voyez *Fer*, 1795, II.
*Cataplasmes* : manière de les appliquer, 1790, II, 401.
*Cataracte* : lunettes qui conviennent dans ce cas, 1792, I, 450.
*Catéchisme* à l'usage du fermier, 1795, I, 25.
*Cathères* flexibles ou sondes, 1786, I, 334.

*Catherine*, voyez *Prune*, 1795, II.
*Causes* qui détériorent les terroirs, 1793, I, 33.
*Caustique*, 1795, II, 280.
*Cautères* : moyen de les défendre d'être offensés, 1786, II, 418.
—au genou : guérit la goutte, 1788, I, 353.
*Caux* : agriculture de ce pays, 1790, II, 39.
—cause de sa pauvre agriculture, 1794, I, 11.
*Cavaillon*, voyez *Melon*, 1795, II.
*Cavalier* désarçonné, 1788, I, 279.
*Cayeux*, 1795, II, 280.
*Céleri*, 1795, II, 47.
*Cendre gravelée*, voyez *Raisin*, 1795, II.
*Cendres* : préparation pour en obtenir le sel, 1783, I, 375.
—des orfèvres, 1783, I, 196.
—prescrites comme engrais, 1784, I, 67.
—gravelées, utiles pour démoucheter le bled, 1786, II, 23.
—moulin pour la triturer, 1788, II, 392.
—de charbon de terre : son emploi pour le ciment, 1789, I, 336.
—de tourbe et de houille : observations sur leur usage, 1789, I, 17 *et suiv.*
—employées comme engrais ; quand il faut les répandre, 1790, I, 16.
—lessivées pour servir comme amendement, 1790, II, 12.
—de tourbe, éloignent les vers blancs et autres, 1790, II, 207.
—diverses espèces : leurs qualités, 1791, I, 19 *et suiv.*
—de gazon : ses avantages, 1791, II, 49 *et suiv.*

*Cendres* de tourbe employées comme engrais, 1791, II, 63 *et suiv.*
—leur effet : la manière de les employer comme engrais, 1794, I, 86 *et suiv.*
—la tourbe : bon engrais pour les vignes, 1786, I, 95.
*Cent-feuilles*, voyez *Rose*, 1795, II.
*Céréales*, 1795, II, 280.
*Cerfeuil* sauvage : est-il un bon fourrage? 1791, II, 75.
—*idem*, 1795, II, 135.
*Cerise*, 1795, II, 208.
*Cerises* : sorbet de cerisier, 1784, I, 370.
—usage qu'on en fait dans les années abondantes, 1786, II, 216.
—à l'eau-de-vie : procédé pour les faire, 1794, I, 338.
*Cerisette*, voyez *Prune*, 1795, II.
*Cerneaux*, voyez *Noix*, 1795, II.
*Céruse*, voyez *Plomb*, 1795, II.
*Cevadille* : remède contre les vers, 1786, I, 314 et 315.
*Chaise* volante : sa description, 1792, I, 213.
*Chair* des animaux, comparée pour la nourriture aux végétaux, 1786, I, 308 *et suiv.*
—moyen de la conserver quand il fait chaud, 1788, I, 203.
*Chagrin*, voyez *Ane*, 1795, II.
—de Turquie, 1792, I, 466.
*Chalémie*, 1795, II, 215.
*Chaleur* de la terre, sensible sur le thermomètre, 1793, I, 219-221.
—nuisible aux maladies, à quel degré, 1792, I, 430.

*Chaleur* acquise par l'exercice, préférable à celle du feu, 1788, II, 264.
—èche aux pieds, 1788, II, 243.
—noyen de produire avec peu de charbon une chaleur égale à celle d'un fort miroir ardent, 1783, I, 380.
—néthode de se procurer une chaleur douce par le feu d'une seule cheminée, 1784, I, 198.
—bascule pour la conserver, 1785, I, 171.
— emble être produite par la végétation, 1786, I, 300.
—noyens de mesurer ses dégrés, 1786, II, 351.
— es dégrés pour la fusion des métaux, 1786, II, 357.
— aturelle du corps, se conserve selon le choix des habillemens, 1787, I, 224.
— le l'athmosphère : sa cause, 1787, I, 272.
—sa diminution opérée par une éclipse, 1787, I, 276.
—sa marche dans les métaux, 1787, I, 298.
*Chalumeaux* : diverses espèces, 1787, I, 347.
*Chambres* des malades : objets qui y sont nécessaires, 1790, I, 334 *et suiv.*
—*idem*, sont souvent trop échauffées, 1792, I, 430.
*Chambuque*, voyez *Bled*, 1795, II.
*Chamérisier*, 1795, II, 171.
*Chamois*, 1795, II, 204.
*Champagne* : moyen de mettre ses terres en rapport, 1791, II, 246.
—qualité de son sol, 1794, I, 47.
*Champignon*, 1795, II, 166.

*Champignons* : manière de s'assurer de leur salubrité, 1785, I, 359.
—leur nature, 1786, I, 217.
—(empoisonnemens causés par les), 1789, II, 255.
—bons à manger : moyen de les reconnoître, 1789, II, 258 *et suiv.*
*Champs* : moyen de les améliorer, 1783, I, 410.
*Chancre* des moutons : remède, 1787, I, 185.
—des chevaux, vaches, etc. 1788, II, 169.
—nom donné mal-à-propos à des maux légers, 1790, II, 220.
*Chandelles* : moyen de les allumer avec une étincelle électrique, 1784, I, 395.
*Chanterelle*, voyez *Champignon*, 1795, II.
*Chanvre*, 1795, II, 37.
*Chanvre et chenevis* : manière de le préparer, 1782, I, 311.
—sur la culture du Chenevis chinois, 1785, I, 121.
—effet funeste de la poussière qui s'élève lorsqu'on bat le Chanvre, 1788, I, 269.
—rouissage du Chanvre, 1790, I, 159.
—avantage de le semer avec la luzerne, 1792, I, 118.
—sa culture, ses engrais, etc. 1792, I, 61 *et suiv.*
—mâle et femelle : leurs préparations et cultures, 1792, II, 169 *et suiv.*
—sa culture conseillée dans les terres sablonneuses, 1792, II, 165.
—du Brisgaw et de la Chine, 1794, I, 115 et 116.
—comment avoir une belle filasse de Chanvre, 1793, I, 90.

*Chanvre et Chenevis* : rouissage du Chanvre ; moyen de le perfectionner, 1788, II, 155.
*Chapeaux* de poil de loutre, 1786, I, 375.
*Chapon*, voyez *Poule*, 1795, II.
*Charansons* : manière pour les déruire, 1783, I, 413.
—*idem*, 1783, I, 415.
—*idem*, 1786, II, 208.
—moyens de les empêcher de détruire le grenailles, 1787, I, 220.
*Charbon* de terre : manière de l'allumer dans certaines cheminées, 1782, I, 154.
—traitement des personnes asphixiées par le charbon, 1783, I, 385.
—fourneaux à faire la bière, échauffés avec ce charbon, 1783, I, 202.
—donne du goudron, 1786, I, 391 et 393.
—employé pour chauffer les fours et les appartemens, 1786, I, 205 *et suiv.*
—son chauffage comparé à celui de bois, 1787, I, 234.
—peu convenable dans les poëles, 1787, II, 255.
—mêlé avec le marc de raisin, peut brûler, 1788, II, 214.
—manière de le bonifier, 1789, II, 420 *et suiv.*
—sa vapeur cause l'asphixie, 1791, I, 354.
—pour cuire le plâtre, le pain, 1786, II, 264 et 274.
— de bois : sa poudre mêlée au terreau contre les vers, 1789, II, 159.
—manière de le faire, 1792, II, 457.
—inconvénient de son mêlange avec les terres, 1793, I, 49.

*Charbon* de bois : altère la qualité des viandes, 1794, I, 336.
—avantage de le faire en été, 1786, II, 287.
—maladie des bêtes à cornes, est contagieuse, 1795, I, 343.
—*de terre*, voyez *Houille*, 1795, II.
—voyez *Bled*, 1795, II.
—des hommes et des bestiaux : préservatifs, 1782, I, 277.
—ou anthrax, 1783, I, 316 *et suiv.*
—traitement du charbon des animaux, 1785, I, 334.
—(remède contre le), 1788, I, 183.
—des grains, attribué à un insecte, 1786, I, 34.
—(sur le), 1793, I, 187 et 190.
—de bled, n'est pas contagieux, 1786, II, 37 *et suiv.*
—de tourbe : sa préparation, 1786, I, 205.
—ses avantages, 1787, II, 258 *et suiv.*
—sa préparation, 1789, II, 214 et 215.
—(sur le), 1791, II, 417.
*Charbonnier* : amélioration de cet art, 1792, I, 457.
*Chardon à foulon*, voyez *Cardière*, 1795, II.
*Chardons* : moyen de les extirper, 1784, I, 86.
—employés en fourrage, 1788, I, 46.
—ne causent pas la maladie des grains, 1791, I, 172.
—moyen de les détruire, 1791, II, 65,
*Charrettes* : machine pour empêcher le versement d'une Charrette, 1785, I, 189.
—à essieu tournant, 1787, I, 249.

*Charriot*, 1795, II, 194.
*Charme*, 1795, II, 149.
*Charrue*, 1795, II, 50.
*Charrues* : semoir, 1786, I, 4 *et suiv.*
—cabestanière, ses avantages, 1786, II, 1 *et suiv.*
—à défricher, 1788, II, 1.
—angloise, 1789, II, 1.
—différentes espèces, 1791, II, 16 *et suiv.*
—de Norfolk, 1792, I, 1 et 6.
—deux de suite, en quel cas, 1793, I, 79.
—sans roues, 1789, I, 1 *et suiv.*
*Chasse* en usage en Russie, 1789, II, 286.
—au fusil, 1790, II, 384.
*Chassis* de couche (description des), 1789, I, 136 et 142.
*Chaussure* contre la boue, 1787, I, 227.
*Chat*, 1795, II, 163.
*Châtaigne* d'eau : manière de la cultiver, 1782, I, 129.
—*idem*, voyez *Macre*, 1795, II.
—*idem*, 1795, II, 24.
*Châtaignier* : traité complet de la culture du Châtaignier, et usage de son fruit, 1783, I, 1 *et suiv.*
—procédé pour sécher les châtaignes, 1794, I, 182.
—procédé pour les faire cuire et les conserver fraîches pendant long-temps, 1794, I, 181 et 185.
—du Vivarais, 1794, I, 19.
—ses espèces; sa culture, 1794, I, 175 et 186.
—*idem*, 1794, I, 178 *et suiv.*
*Château-Neuf* : culture, exploitation d'une ferme située dans ce canton, 1790, II, 49.
*Chateldon* (eaux minérales de), 1785, I, 234.

*Chaton*, 1795, II, 280.
*Claude-verte*, voyez *Prune*, 1795, II.
*Chauffage* du bois, comparé à celui du charbon, 1787, I, 354 *et suiv.*
—*idem*, 1787, II, 23 *et suiv.*
*Chaufferettes* ou couvoirs : ses mauvais effets, 1791, I, 293.
*Chaulages* des grains, 1786, I, 18-31.
—*idem*, 1786, II, 14 *et suiv.*
—attestation en faveur du Chaulage, 1787, I, 36.
—ses bons effets, 1787, II, 19 *et suiv.*
—procédé du Chaulage et ses avantages, 1788, I, 16 *et suiv.*
—ses avantages, 1788, II, 31.
—particulier et supérieur, 1789, II, 28-33.
—Autre Chaulage, 1789, II, 22.
—expérience pour reconnoître le meilleur, 1790, I, 32 *et suiv.*
—*idem*, 1790, II, 21 *et suiv.*
—ses préparations et effets, 1791, I, 28 *et suiv.*
—peu usité en Angleterre, 1791, II, 58.
—divers mêlanges pour chauler, 1792, I, 24-32.
—autre Chaulage : ses effets, 1792, II, 86 et 100.
—ses inconvéniens et avantages, 1793, I, 142-158.
—avec la suie de cheminée, 1794, I, 111.
*Chaume*, peut servir pour fumer les terres, 1790, I, 19.
—avantages de les retourner en automne, 1790, I, 119.
*Chaussure* contre la crotte, 1786, II, 263.

*Chaux métalliques* : de cuivre ; sa préparation, 1787, I, 361.
—de cobalt : sa préparation, 1787, I, 358.
*Chaux* mêlée avec la litiére des animaux pour avancer les fumiers, 1791, II, 29 *et suiv.*
—ses bons effets en amendement, 1791, II, 29 *et suiv.*
—employée comme engrais, 1786, I, 19 *et suiv.*
—pour chauler certaines terres, 1786, II, 13-23-36.
—avantages de la mêler au fumier, 1787, I, 5.
—*idem*, 1787, II, 4.
—employée pour chauffer une chambre, 1787, II, 264.
—*idem*, 1788, I, 242.
—enfant brûlé par de la Chaux, 1787, II, 297.
—employée sur la vieille feuille des vers-à-soie, 1788, I, 141.
—moyen de reconnoître si elle est bonne, 1788, II, 292.
—comparée au fumier, 1790, I, 13-141.
—indiquée pour préserver les feuilles des navets, 1790, II, 156.
—prescrite comme amendement, 1792, I, 16 *et suiv.*
—nuit quelquefois à la végétation, 1793, I, 157.
—en quel cas on peut l'employer, 1793, I, 43.
—son meilleur effet, 1793, I, 45 et 113.
*Chélidoine*, 1795, II, 125.
*Cheminées* pour brûler le charbon de terre, 1782, I, 149 et 152.

*Cheminées* : moyen de les empêcher de fumer, 1782, I, 157 et 162.
—de Pensylvanie, 1782, I, 164.
—du censeur, 1782, I, 167 et 168.
—leur construction pour éviter la fumée, 2783, I, 373.
—moyen d'augmenter le feu en brûlant peu de bois, 1784, I, 200.
—plan d'une cheminée parfaite, 1784, I, 202.
—économique, 1784, I, 196.
—manière de disposer l'âtre, 1786, I, 198 et 201.
—cause de la fumée d'une Cheminée qui sort dans les appartemens, 1786, II, 252 *et suiv.*
—où le feu prend : remède, 1786, II, 304.
—nouvelles, préférables aux anciennes, 1787, I, 231.
—*idem*, 1787, II, 271 *et suiv.*
—à la Francklin, 1788, I, 234.
—moyen qu'elle produise beaucoup de chaleur, 1788, II, 216.
—qui a une multitude d'usages, 1789, II, 217.
—moyen d'éteindre le feu qui prend dans les tuyaux, 1789, II, 247.
—de fonte, propres à brûler le charbon de terre, 1789, II, 427.
—manière de tenir les grilles et les cheminées sans rouille, 1789, II, 429.
—qui fument : remède à apporter, 1790, I, 271.
—isolées dans les appartemens : leurs avantages, 1790, I, 286.
—économiques, de MM. Francklin, Ganger,

Desarnod, et comparaison de ces Cheminées, 1790, II, 324 *et suiv.*
*Cheminées* pratiquées en Flandre, qui ne fument pas, 1785, I, 154.
—portative, de Nancy, 1785, I, 157.
—méthode pour les empêcher de fumer, 1785, I, 160.
—bascule et méthode pour éteindre le feu qui prend dans une Cheminée, 1785, I, 171 et 369.
*Chêne*, 1795, II, 162.
—*verd*, voyez *Liège*, 1795, II.
*Chenevis*, voyez *Chanvre*, 1795, II.
*Chenilles*: moyens pour les détruire, 1782, 1782, I, 314 et 315.
—*idem*, 1794, I, 218 *et suiv.*
—*idem*, 1784, I, 99.
—manière de les préparer pour les cabinets, 1786, I, 263.
—*idem*, 1786, II, 343.
—leurs dégâts: moyen de les détruire, 1786, II, 182.
—noires, 1786, II, 113 *et suiv.*
—moyens de les détruire, 1788, II, 132.
—qui attaquent la vigne, 1789, II, 156.
—moyens de les détruire, 1792, I, 334 et 338.
*Chervi*, 1795, II, 54.
*Cheval*, 1795, II, 25.
*Chevaux*: remède pour les maladies des Chevaux, 1782, I, 279 *et suiv.*
—piqûre aux pieds par des clous de rue, 1786, I, 153 *et suiv.*
—qui ont pris le mors aux dents, 1786, II, 307.
—conseils pour les préserver d'accidens à l'écurie, 1786, II, 133.

*Chevaux* : manière de les attacher dans l'écurie, 1786, II, 295.
—diverses nourritures qu'on peut leur donner, 1786, II, 128 *et suiv.*
—*idem*, 1787, I, 78 *et suiv.*
—*idem*, 1787, II, 94 *et suiv.*
—*idem*, 1788, I, 67.
—moyens de les préserver de devenir aveugles, 1788, I, 185.
—de labours, doivent travailler également, 1790, I, 125.
—des fermiers : comment ils sont nourris en Angleterre, 1790, I, 127 *et suiv.*
—qui ont la jambe cassée : procédé pour les guérir, 1790, I, 209.
—étalons : maladie à laquelle ils sont sujets, 1790, II, 217.
—diverses maladies des Chevaux : remède, 1790, II, 116 *et suiv.*
—principaux soins qu'on doit prendre des Chevaux, 1791, I, 178 *et suiv.*
—comparés aux bœufs pour les labours, 1791, I, 6 et 8.
—malades ou blessés : avis sur leur traitement, 1791, II, 187 *et suiv.*
—comment il faut leur tâter le pouls quand il faut les saigner, 1792, I, 147 *et suiv.*
—moyens qu'ils boivent à leur soif, 1792, I, 344.
—comparés aux bœufs pour les labours, 1792, II, 398.
—*idem*, 1789, II, 7.
—attaqués d'épilepsie, 1793, I, 394 *et suiv.*
*Chèvre*, 1795, II, 134.
*Chevrefeuille*, 1795, II, 191.

*Chevreuil*, 1795, II, 69.
*Chicon*, voyez *Romaine*, 1795, II.
*Chicorée*: manière de la préparer, 1784, I, 377.
--sa racine torréfiée supplée au café, 1786, I, 191.
--*idem*, 1790, II, 287.
--donnée comme fourrage, 1789, I, 61 *et suiv.*
--*idem*, 1790, I, 91 *et suiv.*
--*idem*, avantage de sa culture, 1791, II, 69 *et suiv.*
--*frisée*, voyez *Endive*, 1795, II.
--*idem*, 1795, II, 61.
*Chien*, 1795, II, 82.
*Chiendent*, 1795, II, 122.
--(gelée de), 1782, I, 257.
*Chiens*: éther employé dans les maladies des Chiens, 1784, I, 340.
--enragés: remède contre la morsure, 1783, I, 293.
--qu'on croit produit d'une chienne et d'un chat, 1786, II, 342.
--de berger, 1786, II, 149 *et suiv.*
--sauvages, 1788, I, 310.
--sujets à la petite-vérole, 1792, I, 352 *et suiv.*
--(lettre sur la rage des), 1785, I, 332.
*Chocolat*: formule pour faire le Chocolat à l'espagnole, 1783, I, 425.
--sa composition: diverses espèces; ne sont pas tous également bons et bien faits, etc. 1786, I, 176 *et suiv.*
--avis sur sa préparation, 1788, II, 393.
--gommeux, 1788, II, 395.
*Chou-fleur*, 1795, II, 63.

*Choux-fleurs* : manière de les préparer, 1784, I, 376.
*Chou* - vache, 1794, I, 138.
--culture de la grande espèce, 1787, II, 70.
--frisé, donné avec l'émétique a fait rendre une épingle avalée, 1788, I, 266.
--navet : sa culture, 1788, I, 36.
--*idem*, 1788, II, 58.
--à jets : sa culture, 1788, II, 128.
--rave, 1788, II, 58.
—la quantité qu'il en faut pour nourrir un bœuf et une vache, 1790, II, 100.
—colsat : sa culture, 1791, I, 57.
—de la grande espèce : ses propriétés, sa culture, 1791, II, 79 *et suiv.*
—gelés, peuvent nourrir les bestiaux, 1791, II, 96.
--vaches, employés comme fourrage, 1794, I, 138.
--croutes : moyen de les faire, 1794, I, 322 *et suiv.*
--rouge, donne une liqueur semblable aux acides et alkalis, 1786, I, 342 *et suiv.*
--marin : sa culture, 1792, I, 318.
--à faucher : bon pour le fourrage, 1792, I, 130.
*Chrysalides* des vers-à-soie : moyen de les étouffer, 1784, I, 368.
*Chûte* : blessure occasionnée par une chûte ; traitement, 1783, I, 296.
*Ciboule*, voyez *Ciboule*, 1795, II.
*Cèdre*, 1795, II, 67.
*Cidre*, voyez *Pomme*, 1795, II.
--méthode pour le faire, 1783, I, 392.
--petit Cidre, 1783, I, 397.

*Cidre* : moyen de le clarifier, 1790, I, 253.
--mêlangé avec des matières indifférentes ou nuisibles, 1790, II.
--épreuves pour reconnoître s'il est bon, 1790, II, 280 et 283.
--en fermentation : ses effets funestes, 1791, II, 341.
--observation sur cette boisson, 1794, I, 363.
*Cidres* qui contiennent du cuivre, 1786, I, 190.
--qui contiennent de la craie, 1786, II, 324.
*Ciel* : son état pour prévoir le temps, 1792, I, 383.
*Ciguë*, 1795, II, 155.
--préparation de son extrait, 1784, I, 291.
*Ciment* : composition d'un Ciment impénétrable à l'eau, 1782, I, 316.
--des Indes, 1783, I, 372.
--qui résiste à la pluie, 1785, I, 356.
--imperméable à l'eau, 1788, II, 237.
--fait avec les scories du charbon de terre, 1789, I, 335.
*Cinabre*, voyez *Mercure*, 1795, II.
*Cire*, 1795, II, 66.
--à cacheter, 1788, I, 430.
*Cirier*, arbrisseau de l'Amérique, 1784, I, 73.
*Citernes* destinées à conserver les vins, 1784, I, 1.
*Citron* : son jus pour les ulcères, 1787, I, 325.
--*idem*, 1795, II, 258.
*Citronnier*, voyez *Citron*, 1795, II.
*Citrouille*, 1795, II, 33.
*Cive*, voyez *Civette*, 1795, II.

*Clairières* : moyen de les regarnir, 1793, I, 122.
*Claques* à souliers : comment il faut les faire, 1786, I, 196.
*Claveau* : traitement dans cette maladie, 1783, I, 332.
--ses différentes espèces et les accidens qu'elle procure, 1786, I, 139 *et suiv.*
--remède contre ce mal, 1787, I, 186.
*Claudication* : moyen de reconnoître si les enfans y seront sujets, 1789, II, 383.
*Climats* chauds, 1789, I, 298.
*Cloche* à plonger, 1788, I, 401.
*Cloisons* économiques, 1789, I, 252.
*Cloque*, voyez *Bled*, 1795, II.
--maladie des arbres, 1790, I, 153.
*Clôture* de haie vive, 1788, II, 163.
--sèches et vives, 1792, II, 400 et 403.
*Clous* : piqûre faite aux pieds des chevaux, 1786, I, 153.
--inaltérables dans l'eau de la mer, 1793, I, 439.
--leur inconvénient lorsqu'on les emploie pour fixer les enduits de plâtre, 1795, I, 386.
*Clapiers* : leurs dispositions, 1791, II, 116 *et suiv.*
*Coca* : plante; sa préparation, 1788, II, 336.
*Cocon*, voyez *Ver-à-soie*, 1795, II.
*Cocons* : moyen d'étouffer les chrysalides, 1784, I, 368.
--manière de les travailler pour faire des tissus, 1786, II, 417.
--moyen annoncé comme bon pour faire mourir les chrysalides, reconnu mauvais, 1786, II, 170.
--procédé pour les éteindre, 1788, II, 391.

*Cochléaria*, 1795, II, 137.
*Cochon*, 1795, II, 62.
*Cochons* : considérés sous leurs rapports avec l'économie rurale et domestique, 1795, I, 155.
--manière défectueuse de les nourrir, 1787, I, 127.
--manière de les bien gouverner, 1788, II, 123.
--à l'engrais, 1791, I, 96.
--moyen de les engraisser, 1792, I, 176.
--moyen de les empêcher d'entrer dans les clôtures, 1792, II, 352.
--quand ils peuvent être sevrés, sujets à une maladie, 1792, II, 264 et 375.
--bonnes espèces à élever, 1794, I, 293.
*Compas* de réduction, 1786, I, 359.
*Coing*, 1795, II, 58.
--avantages de ce fruit, 1794, I, 153.
*Coignée*, 1795, II, 115.
*Colchique*, 1795, II, 25.
--ses graines sont un poison, 1789, II, 269.
--manière de détruire cette plante, 1791, I, 164.
*Coliques* spasmodiques (remède contre les), 1782, I, 247.
--des gens de mer (traitement de la), 1783, I, 209 *et suiv.*
--des veaux, 1786, I, 156.
--des moutons, 1787, I, 181.
*Colle*, voyez *Belier*, 1795, II.
--supérieure, 1782, I, 313.
*Colombe* : instrument pour couper les choux, 1794, I, 322.
*Colombine*, voyez *Pigeon*, 1795, II.

*Colombier* : manière de le peupler et de le renouveller, 1789, II, 105 *et suiv.*
*Colsa*, 1795, II, 237.
*Colyres* : remèdes pour les yeux, 1790, II, 397.
*Combustibles* : artificiel, 1786, II, 287.
--observations sur leurs qualités, 1787, II, 253 *et suiv.*
*Compiègne* : son agriculture, 1790, I, 57.
--*idem*, 1792, II, 121.
*Compots* : noms qu'on donne à des mêlanges de fumier, 1790, I, 20 *et suiv.*
*Compositions* pour les semences, 1786, II, 14 et 15.
*Comtat* Venaissin : qualité de son sol, 1794, I, 44.
*Concombre*, 1795, II, 201.
*Conduite* économique, 1791, II, 227.
*Confitures* faites avec le miel, 1794, I, 321.
*Conseigle*, voyez *Seigle*, 1795, II.
*Conseils* sur l'administration des biens, 1790, II, 246.
*Conservation* des grains, 1790, I, 256.
--de la viande, 1791, II, 270.
*Consomption* : usage des marrons dans cette maladie, 1784, I, 324.
*Consoude*, 1795, II, 175.
*Constipation* des moutons : remèdes, 1787, I, 181.
*Constructions* à l'abri des incendies, 1787, I, 239.
--*idem*, 1787, II, 299.
*Consultation* : formule de Consultation par mémoire pour un médecin, 1783, I, 259.
*Contagion* des bêtes à cornes, 1784, I, 350.

*Convalescens* : manière de les gouverner, 1790, I, 353 *et suiv.*
*Convulsions* volontaires ou par imitation, 1786, I, 318.
*Copier* : machine pour copier dessins, tableaux, gravures, 1786, I, 379.
*Coq*, voyez *Poule*, 1795, II.
*Coqueluche* des enfans (remède contre la) 1782, I, 248.
--(sirop contre la), 1788, II, 319.
*Coralines* : articulée, 1786, II, 335.
--de diverses espèces, 1787, I, 292.
*Corbeille* d'or, 1795, II, 175.
*Cordeau*, 1795, II, 135.
*Corde* faite avec l'écorce d'houblon, 1791, I, 369.
*Coriandre*, 1795, II, 203.
*Cormier*, 1795, II, 58.
*Cornes* : moyen de les éloigner, 1790, I, 201.
*Cornichons* au vinaigre, quelquefois malfaisans, 1786, II, 315.
*Cornuelle*, voyez *Macre*, 1795, II.
*Coronille* panachée : observations sur cette plante, 1795, I, 114.
*Corolle*, 1795, II, 280.
*Cornouiller*, 1795, II, 126.
--son fruit donne de l'huile, 1786, II, 176 *et suiv.*
*Corpou*, voyez *Thon*, 1795, II.
*Corps* : effets du froid et de la chaleur sur les Corps, 1789, II, 376.
--humain : peut-il refroidir l'air qui l'environne ? 1787, II, 353.
--marins : espèces d'animaux, 1787, I, 292.

*Cors* aux pieds : remède, 1788, I, 358.
--*idem*, 1788, II, 360.
--*idem* 1793, I, 437.
*Côteaux* propres à mettre en culture, 1793, I, 5.
*Cotentin* : agriculture de ce pays, 1790, II, 36.
*Côtes*, ou terreins en pente, 1788, II, 160.
*Cossat*, voyez *Bois*, 1795, II.
*Coton*, 1795, II, 238.
—(filature de), 1783, I, 414.
—teinture du Coton en jaune, 1788, I, 425.
*Couches*, 1795, II, 281.
—de terre de bruyères, 1791, II, 170 *et suiv.*
*Couleuvre* d'étangs et des champs : remède contre leur morsure, 1783, I, 296.
*Couleurs* : méthode pour les fixer, et sur-tout le pastel, 1783, I, 367.
—conditions pour qu'elles soient bonnes, 1785, I, 371.
—bleue, préférable à celle de Berlin, 1786, I, 346.
—moyen de distinguer si les couleurs des étoffes sont bonnes, 1789, II, 287.
—*idem*, 1792, I, 416.
*Coulommiers* : agriculture de ses environs, 1790, I, 64.
—*idem*, 1792, II, 129.
*Coulure* de la vigne : sa cause, 1789, II, 113.
*Coup* de poing à la poitrine, 1788, II, 256.
*Coups* de sang : maladie des moutons, 1787, I, 145.

*Couper* les grains à la faulx, 1786, II, 75.
*Couperose verte*, voyez *Fer*, 1795, II.
*Courans* en mer, 1788, II, 311.
--du canal de Bahama, 1788, II, 311.
*Courbature* des moutons, 1787, I, 181.
*Courbure* de l'épine, 1787, II, 367.
*Courbures* des branches à fruit substituées à la treille, 1789, II, 131.
*Cours* de ferme : soins qu'elles exigent, 1791, II, 101 *et suiv.*
--des moissons de la France, 1794, I, 23 et 28.
*Courtillières* : manière de les détruire, 1790, I, 194.
--*idem*, 1794, I, 223.
*Cousins* : remède contre leur piqûre, 1783, I, 305.
--*idem*, 1785, I, 310.
*Couteaux* mal trempés, s'ébrèchent, 1786, I, 222.
--à couper par rouelles, 1788, II, 212.
*Coutre* de charrue : changement dans sa forme, 1786, I, 11.
*Coutumes* locales : doivent être respectées, 1793, I, 233.
*Couvertures* des bâtimens, 1787, II, 291.
--en paille pour les bâtimens, 1789, II, 203.
--de chevaux à l'écurie, 1791, I, 180.
*Couvoir*, 1795, II, 149.
*Crachement* de sang : usage des marrons dans cette maladie, 1784, I, 350.
*Craie* : province de Sologne ; cours de sa culture et de ses moissons, 1794, I, 20.

*Craie* : méthode pour la préparer, 1785, I, 389.
--produit un engrais, 1788, I, 10.
--employée comme amendement, 1791, I, 18.
--proposée comme engrais, 1786, II, 12.
*Crainte* mal-entendue de l'odeur des fleurs dans les appartemens et dans les bois, 1787, I, 259.
*Craintes* mal fondées, 1790, II, 367 et 367 *et suiv.*
*Crampes* : préservatif contre les Crampes, 1784, I, 321.
*Cran*, voyez *Raifort*, 1795, II.
*Crapaud* : sa poudre donnée comme remède, 1787, I, 303.
*Crasse* dans le cidre, 1786, II, 324.
*Crayon*, voyez *Fusain*, 1795, II.
*Crayons* de pastel : procédé pour les faire, 1787, I, 381.
*Crèches*, 1786, II, 133.
*Crême* de pain pour les enfans, 1792, II, 416.
--de tartre : soluble dans l'eau, 1786, II, 390.
--*idem* : ses propriétés, 1789, I, 302 *et suiv.*
--de lait de différentes espèces, 1791, II, 277.
--à odeur de vanille, 1795, I, 288.
--*de tartre*, voyez *Raisin*, 1795, II.
*Cressensac* : son agriculture, 1794, I, 7.
*Cresson*, 1795, II, 54.
--de fontaine, 1792, I, 314.
*Crevettes* lumineuses, 1787, II, 328.
*Crible*, 1795, II, 108.

*Crible* : nouvelle espèce, 1788, I, 26.
--en tambour, 1793, I, 94.
*Criblures* : leur danger pour la volaille, 1794, I, 199.
*Cric* nouveau, 1793, I, 450.
*Cricri*, voyez *Grillon*, 1795, II.
*Crystaux* factices : procédés pour les faire, 1787, I, 354.
-- d'Angleterre, 1788, I, 423.
--de montre, 1788, II, 362.
*Crochet*, voyez *Bèche*, 1795, II.
*Crotter* ses bas en marchant, 1786, I, 179 *et suiv.*
*Crottin* de lapins : son usage, 1791, II, 106.
*Cruchade* de maïs, 1787, II, 224.
--*idem*, voyez *Maïs*, 1795, II.
*Crucifère*, 1795, II, 281.
*Cucurbitacées*, 1795, II, 281.
*Cuirs* (observations sur les), 1789, II, 418.
--brûlés et en poudre : remède contre les indigestions, 1789, II, 168.
*Cuisine* portative, 1784, I, 149.
*Cuivre*, 1795, II, 102.
--noir : procédé pour en tirer le fin, 1783, I, 381.
--ammoniacal : manière de le préparer, 1783, I, 387.
--comparaison et avantage de certains procédés pour couvrir les bâtimens en Cuivre, 1789, I, 338.
--laminé, pour couvrir les bâtimens, 1789, I, 342.
--avantages des couvertures en Cuivre, 1789, I, 352.
--poli des instrumens en Cuivre, 1790, I, 361.

*Cuivre* dissous dans le vin et le cidre : manière de le reconnoître, 1790, II, 282.
--danger de préparer le beurre dans des vases de Cuivre, 1790, II, 294.
--procédé pour le blanchir avec l'étain, 1790, II, 420.
--peut être étamé sans plomb, 1791, II, 423.
--plaqué ou doublé d'argent, 1792, I, 398.
*Cultivateurs* (observations et avis aux), 1784, I, 80.
--machine pour semer, 1788, I, 1 *et suiv.*
*Culture* des terreins arides et humides, 1788, II, 6 et 11.
--d'un corps de ferme à la manière angloise, 1792, II, 52.
--des sapins, 1792, II, 295 *et suiv.*
--la plus avantageuse à l'homme, 1794, I, 10.
--moyen de l'améliorer en France, 1795, I, 1.
--des oignons, par les Tartares, 1795, I, 74.
*Cumin*, 1795, II, 210.
*Cuve*, 1795, II, 28.
*Cuves* pour le vin, 1787, I, 375.
--moyen de ne tirer d'une Cuve que le vin qui est bon, 1790, I, 143.
--sa préparation pour faire du vin, 1794, I, 311.
*Cyprès*, 1795, II, 69.
*Cyclamen*, 1795, II, 124.

# D.

*Damas d'automne*, voyez *Prune*, 1795, II.
—*idem*, voyez *Fer*, 1795, II.
*Damier*, voyez *Fritillaire*, 1795, II.
*Danemarck* : obligation dans ce pays d'extirper les herbes parasites, 1792, I, 91.
*Dangers* des vaisseaux d'étain, 1789, I, 208.
—des vêtemens de mousselines et linons pendant l'hiver, 1790, II, 361.
*Dartres* (méthode curative pour les), 1785, I, 252.
—*idem*, 1789, II, 439.
—des animaux, 1790, II, 225.
*Dax* : cours des moissons, 1794, I, 14.
*Décomposition* de l'eau, n'est pas prouvée, 1786, II, 347.
*Découpage* des prés, 1790, II, 95.
*Découvertes* annoncées par plusieurs auteurs, 1787, II, 31-81 *et suiv.*
*Décreusage* de la soie : moyen pour cette opération, 1787, I, 390.
*Décuvage* de vins, 1783, I, 118.
—temps pour le faire, 1794, I, 318.
*Déficcation* des grains : machine pour cet usage, 1790, I, 256.
—nécessaire pour connoître les terroirs, 1793, I, 23.
*Défrichemens* : charrue pour les faire, 1788, II, 1.
—trop multipliés, 1790, I, 25.
—des marais et autres endroits, 1793, I, 1 et 41.
*Demi-bains* : leur usage, 1790, II, 406.

*Denderites* : pierres herborisées, 1787, II, 343.
*Dentelaire*, 1795, II, 55.
—plante contre la gale, 1786, I, 317.
—*idem*, 1790, II, 215.
*Dentition* des enfans, 1785, I, 285.
*Dents* : eau pour les conserver, 1788, I, 428.
—(remède contre les maux de), 1782, I, 249.
—(observations sur le tartre des), 1783, I, 261.
—ajoutées, sujettes à inconvéniens, 1787, I, 335.
*Dépense* des fermiers : comment ils doivent s'en rendre compte, 1790, I, 1.
*Desséchemens* des marais, 1791, I, 239.
*Dessin et Dessiner* : machine à Dessiner, 1784, I, 179 *et suiv.*
—manière de Dessiner, 1786, II, 403.
*Détroit* de Calais, 1789, I, 262.
*Dévoiement* des veaux et moutons, 1787, I, 181-171 *et suiv.*
*Diamant* estimé plusieurs millions, 1788, I, 326.
*Difficulté* d'avaler : manière de la guérir, 1786, II, 373.
*Digestion* (expériences sur la), 1787, II, 359.
—(observations sur la), 1789, II, 297 *et suiv.*
*Dindon*, 1795, II, 53.
*Dindonneaux et Dindons* : méthode pour les élever, 1782, I, 280.
—*idem*, 1795, I, 227.
—moyens de les engraisser, 1792, I, 206.
*Disette*, voyez *Betterave*, 1795, II.

*Dyssenterie* (remède contre la), 1784, I, 322.
—remède contre cette maladie, 1788, II, 354.
*Distances* : instrument pour les mesurer, 1789, I, 314.
*Distillation*, 1795, II, 281.
—des huiles essentielles, 1784, I, 353.
*Distribution* d'un champ, 1793, I, 38.
*Doronic*, 1795, II, 135.
*Double* (fleur), 1795, II, 282.
*Doucette*, voyez *Mâche*, 1795, II.
*Drageon*, 1795, II, 282.
*Draps* : moyen de les préserver des vers, 1789, II, 208.
—à bas prix, 1789, II, 211.
—moyen de juger de la solidité de la couleur, 1792, I, 416.
*Dravière* : mêlange de grenailles semé pour fourrage, 1792, II, 116.
*Drèche*, voyez *Touroir*, 1795, II.
*Dreux* : agriculture de ce pays, 1790, I, 61.
*Ductile*, 1795, II, 282.
*Duhamel* : son opinion sur les argilles : 1793, I, 113.

## E.

*Eau* : moyen pour calmer l'Eau d'un fleuve agitée, 1782, I, 325.
—moyen pour avoir de l'Eau dans tous les étages d'une maison, 1782, I, 209.
—moyen pour empêcher l'Eau de se gâter, 1782, I, 324.

*Eau* : moyen pour se garantir de l'humidité des marais, 1782, I, 341.
—contre les blessures, 1783, I, 283.
—de la côte, 1783, I, 427.
—ophtalmique, styptique, 1783, I, 312 et 313.
—moyen de purifier les eaux troubles, 1783, I, 423.
—moyen de conserver l'eau douce, 1784, I, 382.
—anti-putride, 1784, I, 332.
— pour les yeux, 1784, I, 306.
—manière d'en tirer un air salubre, 1785, I, 358.
—de neige, 1785, I, 240.
—minérale factice, 1785, I, 240.
—sa décomposition, 1786, I, 271 *et suiv.*
—de la rivière de Seine est saine, 1786, I, 187.
—terreuses ne donnent pas la gravelle, 1786, I, 184.
—expériences sur sa décomposition, 1786, II, 347.
—de chaux, dangereuse pour les moutons, 1786, II, 159.
—de Luce, 1786, II, 392.
—de mare et de pluie, bonne pour les moutons, 1786, II, 158.
—de pluie, pour les maux d'yeux, 1786, II, 377.
—de mer, pour préparer les grains, 1786, II, 30.
—phosphorique, 1786, II, 360.
—des puits salans, bonne pour les grains, 1786, II, 30.
—de lessive, *idem*, 1786, II, 25.

*Eau* de la mer : cause de son étincèlement, 1787, I, 278.
—plus pesante en se refroidissant, 1787, II, 350.
—réduite en vapeurs : son électricité, 1787, II, 351 et 354.
—séléniteuse et putréfiée : moyen de les rendre potables, 1787, II, 193.
—bouillante, jaillit du fond de la mer, 1788, I, 191.
—qui a séjourné dans le plomb peut être bue, 1788, I, 205.
—trouble et terreuse ne donnent pas la pierre, 1788, II, 183.
—moyen de la conserver bonne sur mer, 1789, II, 182.
—de mer : expériences sur sa salure, 1789, II, 376.
—de mer mêlée dans le vin, 1790, I, 253.
—qualités de celle qu'on doit donner aux chevaux, 1791, I, 191 et 193.
—vêtemens humectés d'Eau salée n'enrhument pas, 1791, II, 342.
—de mares artificielles et naturelles, 1791, II, 41.
—de fumier, 1792, II, 50.
—en excès, nuit aux terroirs, 1793, I, 33.
—nécessaire près des terres en culture, 1793, I, 3.
—profondeur des fossés pour l'écoulement des Eaux de marais, 1793, I, 7.
*Eau-forte*, voyez *Salpêtre*, 1795, II.
—blanche : comment on peut la suppléer, 1795, I, 344.
—qualités des Eaux potables, 1795, I, 271.

*Eau-de-vie*, voyez *Raisin*, *Cerise*, *Figue*, *Pomme*, *Poire*, *Prune*, *Orge*, *Escourgeon*, *Sucrion*, *Bled*, *Miel*, *Cheval*, 1795, II.
—extraite de l'Eau qui a servi à tirer le miel des gâteaux, 1790, II, 139.
*Ebourgeonnement* des arbres à fruits, 1791, I, 122.
*Ecarlate* employée dans les douleurs de rhumatisme, 1794, I, 347.
*Echalote*, 1795, II, 201.
*Echelle*, 1795, II, 253.
—pour une grange, 1785, I, 368.
*Eclaire*, voyez *Chélidoine*, 1795, II.
*Eclairs* : leurs effets sur les grains semés, 1793, I, 266.
*Eclosettes* : champignons vénéneux, 1786, II, 313.
*Ecluse*, 1795, II, 230.
*Ecluses* (moyen de contenir l'eau dans les), 1784, I, 203.
*Ecole* des travaux publics, 1795, I, 460.
*Economes* de biens de campagne mal choisis, 1789, II, 170.
*Économie*, 1786, I, 157-401.
—domestique, 1791, II, 227.
—rurale angloise, 1792, I, 363.
—domestique, 1794, I, 321.
*Ecorce* de chêne, substituée à la noix de galle dans la teinture, 1795, I, 434.
*Ecorcer* les arbres : précautions à prendre, 1787, II, 158.
*Ecorces* (usage des) mangées par le gibier, 1786, I, 99 *et suiv.*
—mauvaise pratique de les fendre, 1791, I, 206.

*Ecorces* des arbres coupées pour leur faire porter du fruit, 1792, II, 337.
*Ecrevisse*, 1795, II, 263.
*Ecritures* : machine avec laquelle les aveugles peuvent écrire, 1784, I, 185.
—procédé pour imprimer aussi vîte qu'on écrit, 1785, I, 184.
—*idem*, de l'abbé Rocher, 1785, I, 186.
—anciennes : moyen de les faire reparoître, 1787, I, 264.
—en abréviation, 1788, I, 410.
—perpendiculaire, 1788, I, 428.
—moyen de les faire revivre, 1789, II, 281.
*Ecrouir*, 1795, II, 282.
*Ecuries* : nécessité de les tenir propres, 1786, I, 90.
—Leur disposition, 1786, II, 133.
—dans quels cas elles sont préjudiciables aux animaux, 1791, I, 174 *et suiv.*
—observations sur leur construction, 1792, I, 144.
—causes qui les rendent mal-saines, 1792, II, 229.
*Ecusson*, voyez *Greffe*, *Greffoir*, 1795, II.
*Edifices* : manière de les préserver de la foudre, 1784, I, 158.
*Edredon*, voyez *Canard*, 1795, II.
*Edits* relatifs aux propriétés, 1789, II, 442.
*Effanage* : avis sur l'Effanage des grains, 1795, I, 30.
*Effervescence*, 1795, II, 282.
*Efforts* de reins (remède contre les), 1783, I, 338.
*Eglantier*, 1795, II, 261.

*Egoutter* les terres, 1792, II, 399.
*Egagropiles*, voyez *Vache*, 1795, II.
*Electricité* employée pour faire éclore des œufs, 1783, I, 363.
—moyen de reconnoître celle qui existe dans l'air, 1786, I, 291.
—ses différentes propriétés, 1787, I, 299 *et suiv.*
—artificielle, n'avance pas la végétation, 1787, II, 357.
—*idem*, 1788, I, 342 *et suiv.*
— (observations sur l'), 1789, I, 298.
*Electromètre* : instrument pour reconnoître l'électricité, 1786, I, 291.
—*idem*, 1787, I, 346.
*Electuaire* anthelmentique, 1785, I, 331.
*Elévation* du sol de chaque pays, 1788, I, 333.
*Elixir* visceral et balsamique d'Hoffman, 1784, I, 320 et 321.
*Ellébore*, 1795, II, 115.
*Émeraudes* factices, 1787, I, 360.
*Émeril* : son analyse, 1788, II, 361.
*Émétique*, 1788, I, 272.
*Émondage* des arbres, 1786, II, 79.
*Emoudre*, 1795, II, 282.
*Empailler* les arbres : manière la plus convenable, 1791, I, 117 *et suiv.*
*Emphisème* artificiel, 1786, I, 332.
*Empoisonnement* avec l'eau-forte, 1786, II, 374.
*Emulsion*, 1795, II, 282.
*Encaustique* (peinture à l'), 1784, I, 400.
—*idem*, 1786, I, 366.
*Epilepsie* (remède contre l'), 1784, I, 325.

*Enclos* : manière de les faire, 1791, I, 235 et 237.
—de haies sèches ouvertes pour empêcher les animaux, 1792, II, 352.
*Enclouure* des bœufs, 1791, I, 224.
*Encre* : recette d'une Encre angloise, 1782, I, 326.
—rouge, 1786, I, 367 *et suiv.*
—de sympathie, 1786, I, 348.
—d'or, vraie et fausse, 1786, II, 407-416.
—magique, 1787, II, 313.
—recette pour faire l'Encre, 1795, I, 459.
*Encuvage* : procédé pour faire cette opération, 1794, I, 313.
*Eudiomètre* : instrument pour jauger l'air, 1787, II, 344.
*Endive*, 1795, II, 53.
*Enduits* de plâtre : inconvéniens d'employer des clous pour les fixer, 1795, I, 386.
*Endurcissement* du tissu cellulaire, 1788, II, 355.
*Enfans* : manière de les nourrir, 1782, I, 252.
—moyen de les conserver, 1785, I, 285.
—moyen d'avoir de beaux enfans, 1786, I, 224.
—attaqués de vers : moyen de les guérir, 1786, I, 314.
—boisson pour suppléer au lait, 1786, II, 214.
—inconvénient de les allaiter trop longtemps, 1787, I, 261.
—manière de les nourrir lorsqu'ils sont sans nourrices, 1787, II, 361.
—maltraités par une fouine, 1783, I, 265.

*Enfans* nouveaux-nés : leur poids et mesure, 1788, I, 308.
—perdus ou trouvés : moyen à prendre alors, 1788, I, 282.
—(maladies des), 1788, II, 355.
--dont on tient la poitrine découverte, 1789, II, 311.
--asphixiés, 1790, I, 292.
--nouveaux-nés, soins à leur donner, 1790, I, 350 *et suiv.*
--défaut de leurs souliers, 1792, I, 414.
*Enflure* des jambes, 1786, I, 329.
--des moutons, 1787, I, 182.
*Engelures* (pommade contre les), 1782, I, 254.
--(topique contre les), 1785, I, 324.
--*idem*, 1786, II, 278 *et suiv.*
*Engorgement* du lait dans le sein, 1791, II, 275.
*Engrais* : observation sur leur emploi, 1793, I, 34-37-130.
--(différens détails sur les), 1792, II, 13-30-257-241.
--pour les jardins, 1786, I, 105.
--de plantes ou herbes vertes, 1788, I, 10.
--pour les bas prés, 1788, I, 59.
--excellens, 1788, II, 10-126.
--*Tourbe*, *Houille*, *Plâtre*, *Chaux*, voyez *ces mots.*
--leur comparaison et leurs effets, 1790, I, 13 *et suiv.*
--mauvaises pratiques dans leur emploi, 1790, II, 19.
--doit être distingué des amendemens, 1791, I, 15.
--lupin employé comme engrais, 1791, I, 11.

*Engrais* : divers moyens de les augmenter, 1791, II, 33.
--composé de fumier et de chaux, 1792, I, 163.
--voyez *Fumier*, 1795, II.
*Enluminure* des papiers, 1790, II, 423.
*Ensevelissemens* précipités, 1790, I, 314.
*Entablemens* en plâtre : leurs dangers, 1792, I, 421.
*Ente* de la vigne, 1792, II, 309.
*Enterremens* précipités, 1790, I, 302.
*Entrepôt* des vaisseaux remplis d'air méphitique, 1792, I, 436.
*Environs* de Paris : ses diverses cultures, 1792, II, 118.
*Epargne* : avis et conseils sur cet objet, 1791, II, 232.
*Epéautre*, 1795, II, 216.
*Eperons* : forme à leur donner, 1791, I, 211.
*Epicea*, voyez *Sapin*, 1795, II.
*Epiciers* : ne doivent pas se servir de mortiers de cuivre, 1791, I, 320.
*Epidémie* des bêtes à cornes : traitement qu'il faut employer, 1783, I, 329.
--rendue utile, 1788, II, 344.
*Epierrement* : ne doit pas être trop exact, 1787, I, 62.
*Epilepsie* dans le cheval, 1793, I, 394.
*Epinard*, 1795, II, 134.
*Epinards* : manière de les avoir toujours verds, 1795, I, 283.
*Epiner* les jeunes arbres, 1791, I, 117.
*Epine blanche*, voyez *Aubépine*, 1795, II.
--vinette, 1795, II, 255.
--*idem*, ne nuit pas aux grains en fleur, 1788, I, 284.

*Epingle* dégagée de l'œsophage, 1787, I, 327.
--avalée et rejettée, 1788, II, 266.
*Epis* : manière de les couper, 1794, I, 239.
*Epizooties* (préservatifs employés contre les), 1783, I, 337.
--des moutons, 1787, I, 187.
--guérie par le bain de terre, 1790, I, 214.
*Eponges* propres à faire des pessaires, 1787, I, 329.
--de mer, 1787, I, 294.
*Epoussement* : maladie des grains, 1792, I, 323.
*Erable à sucre*, 1795, II, 71.
*Ergot*, voyez *Seigle*, 1795, II.
--*idem*, maladie du seigle, 1786, I, 35.
--n'est pas causée par un champignon, 1786, I, 259.
--moins dangereux qu'on ne le dit, 1786, II, 54.
--faux, 1793, I, 212.
--vrai, 1793, I, 206 *et suiv.*
--grains ergotés, 1793, I, 209.
*Erreurs*, 1790, I, 203 *et suiv.*
*Erésipelle* des moutons, 1787, II, 183.
*Escaliers* : doivent être fermés à cause du froid, 1786, II, 236 *et suiv.*
*Escourgeon* : fourrage laxatif, 1791, I, 75.
--*idem*, 1795, II, 249.
*Escroqueries* dont on peut se garantir, 1790, II, 380.
*Eskimaux* : observations sur ce peuple, 1788, I, 365.
*Espaliers*, 1792, II, 327.
*Esparcette*, voyez *Sainfoin*, 1795, II.

*Esparcette* : plante ; observation sur sa culture, 1795, I, 114.
--*idem*, 1789, II, 168.
*Espèce*, 1795, II, 282.
*Esprit-de-vin* : manière de s'assurer de sa pureté, 1783, I, 402 *et suiv.*
--employé pour nettoyer les étoffes et bijoux d'or, 1787, II, 310.
--*idem*, voyez *Raisin*, 1795, II.
*Esprits* : huile et sel volatil retirés des os, 1786, II, 390.
*Essaim*, voyez *Abeille*, 1795, II.
*Essaims* forcés : moyen de les obtenir, 1786, I, 127.
*Essais* des mines, 1787, I, 343.
--*idem*, 1788, I, 361.
*Essence* de rose : moyen de la préparer, 1793, I, 370.
*Essieux* de carrosses : moyen pour empêcher leur rupture, 1786, I, 383.
--tournans, 1787, I, 249 *et suiv.*
--cassés en route : moyen de prévenir les accidens, 1788, I, 278.
--moyen de suppléer à la graisse usitée pour les Essieux, 1790, I, 326.
*Estampes* : moyen de les blanchir, 1791, I, 377 et 387.
*Estomac* (remède contre les maux d'), 1787, I, 309.
*Etables* : inconvénient de ne pas les tenir propres, 1786, I, 90.
--à vache, 1787, I, 108.
--leur disposition, 1792, I, 144.
--causes qui les rendent mal-saines, 1792, II, 229.
--du Nord, 1793, I, 119.
*Etain*, 1795, II, 105.

*Etain* mêlé de plomb, 1786, I, 345.
--*idem*, 1791, II, 341.
*Etalage* des arbres, 1786, II, 77 *et suiv.*
*Etamage* nouveau, 1786, I, 384.
--épais sur cuivre, 1786, I, 220.
--de cuivre sans plomb, 1791, II, 422.
*Etamines*, 1795, II, 283.
*Etampes* : son agriculture, 1790, I, 67.
--*idem*, 1792, II, 132.
*Etangs* : moyen à employer pour que l'eau ne s'y gâte pas, 1790, II, 357 *et suiv.*
--observations sur leur construction, etc. 1790, I, 169 *et suiv.*
--dans lequel est mort tout le poisson, 1790, II, 156 *et suiv.*
--glacés : manière de les pêcher, 1790, II, 192.
--leurs effets malfaisans, 1792, I, 280.
--réflexions sur leur desséchement, 1795, I, 41.
*Eté* : disposition des maisons dans cette saison, 1786, II, 250.
*Eteignoir* (description d'un), 1784, I, 193.
*Ether* vitriolique : sa préparation, 1783, I, 382.
--ses bons effets, 1787, I, 318.
*Etoffes* : moyen de les garantir des vers, 1782, I, 328.
--de laine, de nouvelle fabrication, 1790, I, 366.
--moyen de juger de la bonté de leur couleur, 1792, I, 416.
*Etoiles* nouvellement découvertes, 1786, II, 393.
--servent à prévoir le temps prochain, 1792, I, 377.
*Etouffemens* des chevaux, 1789, II, 168.

*Etrier*: moyen de prévenir que le pied du cavalier désarçonné ne reste dans l'Etrier, 1788, I, 280.
*Excrémens* humains et des animaux : comment on les recueille, 1793, I, 120.
*Exhalaisons* marécageuses, 1792, I, 325 *et suiv.*
*Expédient* proposé à ceux qui secourent les noyés, 1788, II, 252.
*Expériences* sur la cause de la carie des bleds, 1789, II, 25 et 459.
--sur la digestion, 1789, II, 302.
*Exploitation* des terres, plus avantageuse par les chevaux que par les bœufs, 1792, II, 398.
--des terres, doit être portée à sa perfection avant de l'étendre, 1791, I, 1 *et suiv.*
--des fermes : registres qu'il faut tenir, 1791, II, 1 *et suiv.*
--des terres, 1790, II, 246.
*Explosions* préjudiciables dans les latrines, 1787, I, 254.
*Extrait* de ciguë, 1784, I, 291.

## F.

*Faine* : réponse aux objections faites contre l'huile de Faine, 1785, I, 37.
--(fabrication de l'huile de), 1783, I, 57.
--*id. m*, voyez *Hêtre*, 1795, II.
*Faisan*, 1795, II, 57.
*Faisans* malades par l'usage du bled nouveau, 1786, I, 167.
*Faisandeaux* : soins qu'il faut leur donner, 1791, II, 146 *et suiv.*
*Farcin* : galę des chevaux, 1790, II, 222.

*Fard* : ses funestes effets, 1787, I, 258.
*Fardeaux* : machine propre à les enlever, 1785, I, 151.
*Farines* : moyen pour rendre économique l'emploi des Farines des grains nouveaux, 1795, I, 242.
--pectorales de bled, de sarrasin, de froment, d'épéautre, etc. 1786, I, 171-175-399.
--conservation de la Farine, 1785, I, 73.
--ses espèces et qualités : le pain qu'elles produisent, 1786, II, 203 *et suiv.*
--(moyen d'éloigner les mites de la), 1787, I, 211.
--moyen de reconnoître les bonnes, 1788, II, 90.
--de différentes plantes, 1788, II, 201.
*Fauchaison* des prés : est-elle préjudiciable aux bleds? 1792, II, 104.
*Fauchet*, voyez *Rateau*, 1795, II.
*Faucille* : sa comparaison avec la faulx, 1790, II, 25.
--plante : observation sur sa culture, 1795, I, 114.
--*idem*, 1795, II, 202.
*Faulx*, voyez *Hêtre*, 1795, II.
--*idem*, 1795, II, 184.
--*idem* : description d'une Faulx, 1783, I, 206.
*Fayance* : mastic pour la raccommoder, 1786, II, 294.
--qui résiste au feu, 1788, I, 421.
*Fayard*, voyez *Hêtre*, 1795, II.
*Fécondation*, 1795, II, 283.
--des femelles, ne sert pas à la production du fœtus, 1788, I, 293.
*Fécule*, voyez *Colchique*, *Panais*, *Pomme de terre*, *Macjon*, *Raifort*, *Cyclamen*,

*Mandragore*, *Marronnier d'inde*, *Chêne*, *Hémérocalle*, *Pivoine*, 1795, II.
*Fécules* de pommes de terre : manière d'en faire de la gelée, 1787, I, 214.
--*idem*, 1787, II, 203.
*Femmes* enceintes : diverses précautions à prendre dans les différentes positions où elles se trouvent, 1790, I, 319-364 *et suiv.*
--la vie sédentaire leur est nuisible, 1788, II, 269.
--l'usage des chaufferettes leur est nuisible, 1791, I, 293.
*Fenouil*, 1795, II, 253.
*Fer* : procédé pour sceller le Fer sans plomb fondu, 1783, I, 371.
--procédé pour savoir s'il contient de la manganèse, 1783, I, 376.
--moyen de le rendre de bonne qualité, 1787, I, 350.
--moyen de le préserver de la rouille, 1787, II, 307.
--*idem*, 1788, I, 414 et 419.
--forgé, fourni par la fonte, 1788, I, 369.
--procédé pour l'étamer, 1790, II, 420.
--moyen de le préserver de la rouille, 1791, II, 337.
--procédé pour lui donner une couleur bleue, 1795, I, 388.
--*idem*, 1795, II, 98.
*Ferlin* : maladie des chevaux, 1791, II, 216.
*Fermentations* : vapeurs qui s'en exhalent sont nuisibles, 1791, II, 344.
--*idem*, voyez *Raisin*, *Cerise*, *Groseille*, *Mûres*, *Figue*, *Alize*, *Azerole*, *Poire*, *Pomme*, *Péche*, *Cornouiller*, *Prune*,

*Genièvre*, *Cormier*, *Miel*, *Aubépine*, *Seigle*, *Orge*, *Bled*, *Betterave*, *Navet*, *Turneps*, *Châtaigne*, *Bouleau*, 1795, II.

*Fermentation* des vins : instrument propre à en fixer le terme, 1782, I, 237.

*Fermes* trop considérables par leur étendue, 1790, I, 25.

--manière de les construire pour les préserver des incendies, 1790, II, 352.

--comparaisons des produits d'une Ferme suivant les précautions prises pour son exploitation, 1791, I, 227-233-61.

--leur cour exige des préparations, 1791, II, 101 *et suiv.*

--des environs de Beauvais : sa culture, 1791, II, 59.

--profit qu'elle tire du pacage des moutons, 1787, I, 21.

*Fermiers* : soins qu'ils doivent prendre, et inconvéniens à éviter, 1790, I, 1-26.

--*idem*, 1790, II, 1.

--*idem*, 1791, II, 4.

*Ferrures* à glace pour les chevaux, 1792, I, 222.

*Feu* : méthodes pour éteindre le Feu des cheminées, 1785, I, 369 *et suiv.*

--moyen d'augmenter le Feu en brûlant peu de bois, 1784, I, 200.

--dans les tuyaux de cheminée, 1786, I, 229 *et suiv.*

--prend aisément aux habillemens des femmes, 1786, II, 308 *et suiv.*

--des moutons : remèdes, 1787, I, 183.

--de diverses couleurs, 1788, I, 343.

--d'artifice, d'air inflammable, 1788, II, 341.

*Feu* dans les tuyaux de cheminée, 1789, I, 247.
--sa manière de brûler sert à prédire le temps, 1792, II, 384.
*Feuille*, 1795, II, 284.
*Feuilles* des arbres : moyen de les conserver fraîches, 1782, I, 328.
--pour fourrage, 1786, I, 55.
--*idem*, 1786, II, 78 *et suiv.*
--*idem*, 1787, I, 77.
--*idem*, 1788, I, 47.
*Fève* substituée à celle du cafier, 1786, I, 192.
--de marais : avantage de la cultiver avec le navet, 1788, II, 60.
--leur culture, 1791, I, 38.
--leur produit donné comme nourriture aux chevaux, 1792, II, 239.
*Féverole* : sa culture, 1795, I, 78.
*Fièvre* tierce et quarte : remède contre, 1785, I, 326 *et suiv.*
--observation sur la Fièvre des femmes en couches, 1782, I, 241.
--remèdes contre les Fièvres putrides, 1783, I, 289 *et suiv.*
--quarte : manière de la guérir, 1784, I, 292.
--intermittentes : remèdes, 1787, II, 366.
--*idem*, 1789, I, 300.
--des chevaux : moyen de la reconnoître, 1791, II, 212-215.
*Figue*, 1795, II, 49.
*Fil-d'archal*, voyez *Fer*, 1795, II.
*Filamens* dans les yeux, 1791, I, 362.
*Filasse*, voyez *Chanvre*, *Lin*, *Topinambour*, *Tilleul*, *Guimauve*, *Apocyn*, 1795, II.

*Filets* à pêcher : moyen de les rendre durables, 1790, I, 326.
--de la langue : précautions lorsqu'il faut le couper, 1783, I, 270.
*Filles* arrivées à l'âge de puberté tenues au couvent, 1786, II, 321.
*Flamme* : moyen de la colorer, 1788, I, 343.
*Flandre* : cours de ses moissons, 1794, I, 3.
—*idem*, culture de ses cantons, 1791, I, 48.
*Flamusses* : espèce de gâteaux, 1787, II, 237.
*Flanelle*, procédé pour la laver sans qu'elle jaunisse, 1789, I, 280.
--avantage d'en porter sur la peau, 1792, I, 408.
*Fléau*, 1795, II, 88.
*Fleur*, 1795, II, 284.
*Fleurs* : l'air qui s'en exhale est dangereux, 1785, I, 273.
--procédé pour en extraire la partie colorante, 1782, I, 329.
--moyen de les distiller, 1782, I, 330.
--moyen d'en avoir de fraîches dans toutes saisons, 1783, I, 407.
--moyen de les conserver, 1784, I, 386.
--de benjoin, 1786, II, 389.
--qui donnent des éclairs, 1789, I, 364.
--blanches : maladie des femmes causée par l'usage des chaufferettes, 1791, I, 301.
--procédé pour conserver leurs couleurs, 1794, I, 206.
--danger d'en conserver dans les appartemens, 1795, I, 332.

*Floure* odorante : espèce de gramen propre au fourrage, 1792, II, 160.
*Fluide*, 1795, II, 285.
*Fluides* : mouvemens réguliers des corps qui nagent à leur surface, 1786, II, 359.
*Flux* de sang des moutons : remèdes, 1787, I, 183.
*Fœtus* des animaux, existent tous formés chez les femelles, 1788, I, 293.
*Foin* en gâteau, 1791, I, 199.
--manière de corriger ses mauvaises qualités, 1791, I, 92.
--ou gramen qu'on conseille de cultiver, 1791, I, 72.
--ne convient pas aux moutons, 1786, II, 158.
--amélioré par le mêlange de la pimprenelle, 1787, I, 64.
--manière de le préparer, 1787, II, 93.
--temps où il convient de le faucher, de le sécher, etc. 1789, I, 61 et 67.
--gâté par la grêle, 1789, I, 14.
--espèce nouvelle, 1790, I, 18.
--nouveau, cause la mort, 1790, II, 369 et 371.
--comment l'avoir de meilleure qualité, 1794, I, 133.
*Folle* avoine : moyen de la détruire, 1787, II, 40.
--des marais : sa culture, 1788, I, 34.
*Fontaines* filtrantes, 1785, I, 182.
--de pierre dure, 1787, II, 247.
*Fonte* de fer : son affinage, 1788, I, 369.
*Forceps* : utilité de cet instrument, 1789, I, 326.

*Forêts* : moyen de les regarnir, 1791, II, 162.
--parcours permis, a des inconvéniens, 1786, II, 79.
*Forme* ou contour des champs, 1793, II, 53.
*Fossés* pour prévenir l'écoulement des eaux de dégel, 1793, II, 4.
--employés pour différens usages relatifs à l'agriculture, 1793, II, 53-364-50 et 59.
*Fosses* d'aisance : avis pour neutraliser l'odeur qui s'en exhale, 1782, I, 61.
--danger d'y jetter des matières enflammées, 1786, II, 306.
--(pompes aspirantes employées pour les), 1788, I, 432.
--manière de les construire pour que les matières s'y consomment, 1790, I, 328 *et suiv.*
*Foudre* (manière de préserver les édifices de la), 1784, I, 158.
--*idem*, 1786, I, 233.
--moyens de s'en garantir, 1787, I, 252 *et suiv.*
--sans tonnerre ni éclat, 1788, II, 310.
--appareils pour préserver de la Foudre, 1789, I, 242.
--ascendante, 1789, I, 319 *et suiv.*
*Fouet-guide* adapté aux charrues, 1792, I, 9.
*Fougère*, 1795, II, 164.
*Fougue* donné comme fourrage aux chevaux, 1786, I, 91.
*Fouine* : mange le visage des enfans, 1788, I, 265.
*Foulures* : remède contre, 1782, I, 254.

*Four* pour faire de bon charbon, 1792, I, 457.
--à chaux : leur fumée est nuisible, 1789 I, 273.
--économique, 1782, I, 334.
--à cuire le pain avec le charbon de terre, 1786, I, 204.
--*idem*, 1786, II, 264 *et suiv.*
--pour le pain : sa construction, 1788, II, 275.
*Fourche*, 1795, II, 190.
*Fourchet* : maladie des moutons, 1788, II, 174.
*Fourmis* : moyen de les détruire, 1782, I, 331.
--*idem*, 1786, II, 168.
--*idem*, 1787, I, 161.
--*idem*, 1787, II, 176.
--*idem*, 1788, II, 296.
--donnent au bois dont on fait les tonneaux un goût, 1789, I, 115.
--moyen de les détruire, 1790, II, 209.
--leurs œufs employés pour nourrir les perdreaux, 1791, II, 129.
--employés à détruire les chenilles, 1791, I, 334 *et suiv.*
*Fourneau* portatif pour lessiver, 1788, II, 219.
--économique portatif, 1784, I, 149.
--économique pour cuire la viande, 1783, I, 401.
--pour faire la cuisine en voyage, 1786, I, 369.
--économique pour cuire les alimens, 1790, II, 307 *et suiv.*
*Fourrages* : jeunes pousses des arbres, 1794, I, 121.

*Fourrages* : plantes qui peuvent servir de Fourrage, 1792, II, 160 et 163.
--verds : moyen de guérir la maladie qu'ils causent, 1785, I, 336.
--entassé dans les étables peut donner des maladies, 1786, I, 91.
--diverses espèces, 1786, I, 42 et 70.
--(différens végétaux proposés pour remplacer les), 1786, II, 77-78-137.
--observations sur leur emplacement, 1787, I, 77-94.
--sec : manière de le préparer, 1787, II, 93.
--verd : quel est le meilleur, 1788, I, 45.
--usage de la chicorée pour Fourrage, 1789, II, 89.
--gâté par la grêle : moyen d'en tirer parti, 1789, II, 141.
--mêlangés : leur avantage, 1790, I, 87.
--inconvéniens de les entasser au dessus des écuries, 1790, I, 288.
--manière d'éclaircir les fruits en espalier, 1790, I, 147.
--excellens et préjudiciables, 1791, I, 169-197-217.
--les plus printaniers, 1791, II, 74.
*Fourrures* : moyen d'en écarter les vers, 1786, I, 194.
--moyen de les conserver, 1787, I, 226.
--d'agneaux très-fines, 1792, I, 142.
*Foyers* domestiques, 1785, I, 349.
--économique, 1782, I, 335.
--à la Francklin, 1790, II, 324 *et suiv.*
*Fractures* des jambes, 1784, I, 250 *et suiv.*
--des membres des moutons, 1787, I, 189.
*Fragon*, 1795, II, 112.

*Fraise*, 1795, II, 185.
*Franche-Comté* : qualité de son sol, 1794 I, 46.
*Frélon*, voyez *Abeille*, 1795, II.
*Frêne*, 1795, II, 140.
—ses feuilles employées contre la goutte, 1788, II, 354.
—erreurs au sujet de cet arbre, 1792, II, 371.
*Frénésie* des chevaux, 1784, I, 46.
*Fricassée* de poulets, 1795, I, 273.
*Fripponneries* dénoncées, 1786, I, 96-177-221.
—*idem*, 1788, I, 274 et 277.
*Fritillaire*, 1795, II, 176.
*Friture* : moyen pour l'éteindre lorsque le feu y prend, 1789, II, 247.
*Froid* : degré nécessaire pour geler le mercure, 1786, I, 282.
—(maisons construites de manière à se garantir du), 1786, II, 225.
—violent : quels habillemens il exige, 1786, II, 249.
—moyen pour s'en préserver, 1787, I, 129.
—de différentes années, 1787, I, 274.
—moyen de s'en garantir en Russie, 1787, II, 267-270.
—*idem*, 1788, I, 242.
—plus grands dans certaines périodes de la lune, 1793, II, 233-234.
*Fromage*, voyez *Vache*, *Chèvre*, *Brebis*, 1795, II.
*Fromages* : manière de faire le fromage de lait de chèvre, 1785, I, 361.
—méthode pour les améliorer et empêcher les vers, 1782, I, 336-371.

*Fromages* de sassenage : moyen de les préparer, 1784, I, 362.
—procédé pour faire certains Fromages, 1787, I, 125.
—manière de les faire en Angleterre, 1788, I, 127.
—moyen de les préserver des vers, 1790, II, 323.
—ses différentes qualités, 1791, II, 286.
*Fromageats*, ou petits fromages : moyen de les faire, 1789, II, 96.
*Fromager*, voyez *Coton*, 1795, II.
*Froment* : son produit suivant sa qualité, 1792, II, 63.
—questions sur la préférence qu'il faut donner à celui qu'on doit semer, 1792, II, 70 et 103.
—manière de le conserver, 1792, II, 404.
—semé peu après son chaulage réussit, 1792, II, 103.
—cause de sa carie, 1792, II, 85.
—transplanté : succès de cette culture, 1788, II, 31.
—détail de sa culture, 1790, I, 39 *et suiv.*
—coupé à la faucille ou avec la faulx, 1790, II, 25.
—manière de le purger de l'ivraie, 1790, II, 29 et 31.
—sa culture en Hainault, 1791, I, 59.
—mêlé avec la pomme de terre pour faire du pain, 1791, II, 265.
—inconvénient d'employer le froment germé pour semence, 1791, II, 54.
—moyen de le conserver, 1791, II, 263.
—description de sa maladie appellée époussement, 1792, I, 323.

*Froment*, voyez *Bled*, 1795, II.
*Fromental*, 1795, II, 183.
*Frottement* rendu plus doux par le talc, 1786, II, 406.
*Fruiteries* : comment il faut les construire, 1790, II, 306.
*Fruits* : procédé pour les conserver, 1785, I, 134-132.
—pulpeux : manière de les conserver, 1787, I, 221.
—d'été : leur usage, 1787, II, 239.
—moyen de les conserver, 1788, II, 208.
—temps convenable pour les récolter, 1790, II, 304.
—gelés : moyen de les rétablir, 1790, II, 312-321.
—moyen d'en augmenter la quantité, 1791, II, 181.
—moyen d'en augmenter la grosseur, 1792, II, 337.
—mûrs : moyen de les conserver, 1792, II, 361.
—moyen d'en avoir tous les ans d'excellens, 1794, I, 200.
*Fucus* : plantes marines, 1786, I, 288.
*Fumerons* employés pour prévenir l'effet de la gelée, 1791, I, 165.
*Fumée* : machine qui l'absorbe, 1785, I, 172.
— manière d'empêcher les chandelles de fumer, 1782 I, 337.
—manière d'empêcher la fumée des cheminées, 1784, I, 197.
—*idem*, 1788, II, 215.
*Fumeterre*, 1795, II, 133.
*Fumier*, 1795, II, 85.

*Fumiers* : manière de les conserver, 1792, I, 14 *et suiv.*
—manière de les préparer, 1782, I, 337.
—produit obtenu d'après l'emploi calculé du Fumier, 1792, II, 13.
—dommage qu'on éprouve en les portant dans certains temps; divers avis à ce sujet, 1786, I, 14-21 et 22.
—avantage d'y mêler de la chaux, 1787, I, 5.
—*idem*, 1787, II, 4.
—ce qu'il faut faire pour en avoir beaucoup, 1788, I, 105.
—des voieries: sa bonté, 1788, II, 126.
—qui ont pris feu spontanément, 1789, II, 251 *et suiv.*
—comparé à la chaux et au sel marin comme engrais, 1790, I, 13 et 14.
—moyen d'en avoir promptement, 1790, I, 18.
—devroit être remplacé par la chaux pour les vignes, 1790, I, 141.
—causes qui détruisent leur qualité, 1790, II, 92.
—diverses espèces de Fumier; leur comparaison, 1791, I, 8 et 10.
—divers moyens pour l'améliorer, 1791, II, 32 *et suiv.*
—différentes observations relatives aux Fumiers, 1793, II, 86 jusqu'à 135.
*Fumigation* : espèces qui sont utiles ou nuisibles, 1792, I, 426.
*Fusain*, 1795, II, 177.
*Fusil* : manière de tirer au Fusil les oiseaux sans endommager leurs plumes, 1790, II, 93.

*Fusil* à secret, 1786, I, 419.
*Fusion* : chaleur nécessaire pour fondre les métaux, 1786, II, 357.

## G.

*Gadoues* ou matière fécale : son emploi, 1789, II, 17 *et suiv.*
*Gainier*, 1795, II, 156.
*Galé* ou piment : vertus et usage de cet arbuste, 1788, II, 337.
*Galéga* : plante pour fourrage, 1791, II, 88 *et suiv.*
*Galette* de maïs, 1785, I, 10.
—*idem*, 1787, II, 231 et 236.
*Gale* (remède pour guérir la), 1782, I, 255.
—*idem*, 1786, I, 316.
—des moutons (remède contre la), 1787, I, 176-184.
—ses boutons contiennent un insecte, 1788, II, 326.
—remède contre, 1788, II, 352.
—des chevaux : son traitement, 1790, II, 215.
—dont sont attaqués divers animaux, 1790, II, 225 *et suiv.*
*Galons* : moyen de les nettoyer, 1787, II, 310.
*Gand* : culture des environs de cette ville, 1791, I, 498.
*Gangrène* : son traitement, 1786, I, 317.
—*idem*, 1789, I, 356.
*Gardes-malades* : leurs qualités ; devoirs qu'elles doivent remplir, 1790, I, 232 *et suiv.*

*Gardes-malades* : tiennent les chambres des malades trop chaudes, 1792, I, 430.
*Garence* : moyen de conserver sa racine, 1785, I, 358.
—*idem*, 1795, II, 56.
*Garennes*, 1791, II, 111 *et suiv.*
— pour élever des lapins avec succès, 1794, I, 262 *et suiv.*
*Gargarismes* : soins et précautions dans leur usage, 1790, II, 398.
*Garou* : la fumée de cette plante empoisonne la viande, 1787, I, 256.
*Garonne* (cours des moissons de la plaine de la), 1794, I, 7.
*Gascogne* : *idem*, 1794, I, 13.
*Gâteaux* de Savoie : manière de les faire, 1783, I, 409.
—de maïs, 1787, II, 236.
—salés pour les moutons, 1788, II, 117-120.
*Gaude*, voyez *Maïs*, 1795, II.
*Gaudes* de maïs, 1785, I, 7.
—leur préparation avec différentes substances, 1787, II, 226 *et suiv.*
*Gaz* vineux : expériences sur l'emploi de ce Gaz, 1782, I, 35.
—n'a pas les inconvéniens qu'on lui prête, 1789, II, 129.
—oxigène nuisible à respirer, 1791, II, 419.
—*idem*, 1795, II, 286.
*Gazon d'Olimpe*, voyez *Statice*, 1795, II.
—comment on doit le préparer, 1793, I, 46 *et suiv.*
—manière de l'employer à augmenter le fumier, 1791, II, 42.
—ras sur les lisières, 1793, I, 93.
—comment le poser sur le flanc des fossés, 1793, I, 364.

*Gazon* : sa culture et son usage, 1788, II, 209.
*Gelées* : manière de rappeller à la vie les personnes gelées, 1784, I, 319.
—qui peuvent présager la pluie, 1786, I, 281.
—printanières : moyen d'en préserver les arbres et les récoltes, 1791, I, 165-435.
—moyen d'en préserver la vigne, 1791, II, 285.
—des plantes : leur chaleur, 1793, I, 219.
—ses effets sur les grains, 1793, I, 257.
—d'hiver et de printemps : leur différence, 1793, I, 221.
*Genêt* : son utilité pour abriter le jeune bois, 1786, I, 75.
—ses différens usages et sa culture, 1787, II, 73 *et suiv.*
—d'Espagne cause des maladies aux moutons, 1788, II, 176.
—son produit en Bretagne, 1794, I, 12.
*Genèvrier de Virginie*, voyez *Cèdre*, 1795, II.
*Genièvre*, 1795, II, 65.
*Genisses* : soins pour les élever, 1788, I, 118.
—*idem*, 1790, I, 134.
—soins pour les rendre bonnes vaches, 1790, II, 107.
—à l'engrais, 1792, II, 241.
*Gelée* de pomme de terre, 1787, I, 214.
*Genou* carié peut être amputé sans emporter la jambe, 1786, I, 334.
*Gentiane*, 1795, II, 230.
*Gerboises* (remarques sur les), 1789, II, 281.
*Gesse* propre au fourrage, 1792, I, 131.

*Gesse*, 1795, II, 208.
*Gibier* qui mange l'écorce des arbres, 1784, I, 85.
*Giraumont* : fruit d'Amérique, 1795, I, 282.
*Giroflée*, 1795, II, 203.
*Glace* : moyen de la conserver dans les glacières, 1795, I, 371.
*Glaces* : artificielle; manière de la faire, 1788, I, 208.
—leur résidence nuisible aux terres, 1793, I, 4.
*Glaciers* : montagnes de glaces, 1787, I, 277.
—des Alpes, 1793, I, 42.
*Glaise*, 1791, I, 18.
—son mêlange avec le fumier, 1791, II, 33.
—employée par les Anglois, 1792, I, 32.
—*idem*, voyez *Argille*, 1795, II.
*Gland*, voyez *Chêne*, 1795, II.
—*de terre*, voyez *Macjon*, 1795, II.
*Glands* : manière de les conserver pour les animaux, 1783, I, 410.
—détails sur ses propriétés, 1784, I, 88.
—substitués au café ou mêlés avec lui pour en faire une boisson, 1786, II, 217.
—deviennent un aliment doux et nourrissant, 1786, II, 141.
—mangés par les hommes, 1788, I, 226.
—employés à nourrir les chevaux, 1788, II, 90.
—diverses observations utiles sur ce fruit, 1793, I, 369 *et suiv.*
—(boisson préparée avec le), 1794, I, 353.
*Glue*, voyez *If*, 1795, II.
*Gluten*, voyez *Blé*, 1795, II.

*Gobbes* des moutons avec lesquelles on les empoisonne, 1792, II, 383.
*Gobelet* pour boire étant couché ou courant la poste, 1788, I, 210.
*Goître* des moutons, 1787, I, 186.
*Gombo* : arbrisseau ; sa description, 1795, I, 280.
*Gomme* élastique : procédé pour la dissoudre, 1783, I, 386.
—composition propre à remplacer le vernis de Gomme élastique, 1784, I, 398-388.
—*idem*, 1795, II, 286.
—maladie des arbres ; son traitement, 1790, I, 156.
—manière d'en obtenir de l'huile, 1790, I, 365.
*Gorgones*, 1787, I, 292.
*Goudron*, voyez *Tourbe*, *Houille*, *Bitume*, 1795, II.
—retiré du charbon de terre, 1786, I, 391 *et suiv.*
*Gousse*, 1795, II, 286.
*Goutte* (remède contre la), 1782, I, 256.
—*idem*, 1784, I, 286.
—*idem*, 1786, II, 368.
—*idem*, 1787, I, 318.
—*idem*, 1788, I, 346-253-355.
—*idem*, 1788, II, 354.
*Grain* : maladie des moutons, 1787, I, 185.
*Grains* : sa préparation pour semence, 1791, I, 28.
—avantage de ne pas semer deux années de suite le même grain, 1791, I, 33.
—leurs maladies ne sont pas causées par le chardon, 1791, I, 172.

*Grains* ( de la conservation des ) , 1785 , I , 73-95.
—chaulés , plus avantageux par la bonne récolte qu'ils produisent , 1786 , II , 33.
—avantage de les couper ras de terre , 1786 , II , 75.
—moyen de conserver des Grains serrés encore humides , 1786 , II , 75.
—de semence , doivent être lavés à l'eau avant d'être semés , 1786 , II , 26 et 27.
—leurs maladies , 1786 , I , 158.
—planter les Grains ; ce que c'est , 1788 , I , 14 et 15.
—moyen de les conserver , 1788 , I , 233.
—machine pour les battre , 1789 , I , 358.
—levés : avantage d'y traîner la herse à dents , 1789 , II , 20.
—de bled : un seul ; sa prodigieuse multiplication , 1789 , II , 19.
—divers conseils pour les conserver , 1789 , II , 173 *et suiv.*
—divers moyens de les cultiver , 1790 , I , 106 *et suiv.*
—sont endommagés par les insectes , 1790 , I , 184.
—leur commerce moins avantageux que celui des bestiaux , 1790 , I , 231.
—qui ne sont pas mûrs ne doivent pas servir à faire du pain , 1790 , I , 233.
—machines et moyens pour les dessécher , 1790 , I , 255.
—divers procédés pour les sécher et conserver , 1790 , II , 250 *et suiv.*
—récoltés récemment ne font pas de pain mal-sain , 1790 , II , 263.
—à semer : sa préparation , 1791 , II , 58.

*Grains* à faire du pain et de la bière, 1791, II, 263.
—germés et retraits, conseillés à tort pour semence, 1791, II, 54 *et suiv.*
—moulin domestique pour les moudre; son usage, 1792, I, 387.
—maladie appellée époussement, 1792, I, 323.
—endommagés par des exhalaisons maréca-geuses, 1792, I, 325.
—moyen de préserver ceux qui sont semés d'être mangés par les oiseaux, 1792, II, 351.
—moyen de les conserver, 1792, II, 404.
—des herbes ne végètent dans les champs qu'au bout de plusieurs années, 1793, I, 93.
—diverses observations sur les Grains, 1793, I, 86-163-196-242-280-159-163-171-179 *et suiv.*
—*idem*, 1794, I, 53-103-107-231-291.
*Granges* : moyen d'en détruire les rats et les souris, 1787, II, 180.
—procédé pour construire l'aire d'une Grange, 1791, II, 329.
*Granit*, 1795, II, 88.
*Gravier* (district de) : cours de ses moissons, 1794, I, 21.
—menu, employé comme amendement, 1791, II, 24.
*Gravière* : mêlange de grenaille pour fourrage, 1792, II, 116.
*Gravure* nouvelle sur verre, 1790, II, 420.
*Greffe*, 1795, II, 286.
*Greffer* la vigne, 1785, I, 200.
—manière de Greffer pour avoir des fruits à volonté, 1788, I, 165.
—sur racines, 1792, II, 333.
*Greffoir*, 1795, II, 160.

*Grêle* : sa formation, 1787, I, 271.
—ses effets, 1789, I, 125.
—conseils aux cultivateurs dont les récoltes ont été grêlées, 1789, II, 141 *et suiv.*
—sert à prévoir le temps prochain, 1792, I, 372.
—ses effets sur les grains semés, 1793, I, 261.
*Grenade*, 1795, II, 55.
*Grenailles* : moyen de les préserver des insectes, 1787, I, 220.
—moulin pour les écraser, 1787, II, 110.
—leur culture dans le Hainault, 1791, I, 60.
*Grenat*, voyez *Granit*, 1795, II.
*Greniers* d'abondance, 1795, I, 246.
—manière de les construire, 1785, I, 74.
—à fourrage où il y a abat-foins : inconvéniens, 1786, II, 133 et 136.
—à grains, 1789, I, 358 *et suiv.*
—du Velay, 1791, II, 330.
—de Londres, 1791, II, 262.
*Grès*, 1795, II, 91.
*Grignon*, voyez *Olive*, 1795, II.
*Grille* : description de la grille d'un fourneau, 1789, II, 430.
*Grillon*, 1795, II, 74.
*Griotte*, voyez *Cerise*, 1795, II.
*Gromadure* : maladie des chevaux, 1791, II, 216.
*Groseille*, 1795, II, 207.
*Grut* : préparation de maïs, 1787, II, 211.
*Guède*, 1795, II, 123.
*Guêpes* : dégâts qu'elles font aux fruits ; moyen de les prévenir, 1792, II, 36.

*Guêpes* : leurs piqûres, et remède pour les guérir, 1792, II, 365.
*Gueuse*, voyez *Fer*, 1795, II.
*Guhr* ou lait de lune, propre pour le mêlange des terres, 1793, I, 45.
*Guigne*, voyez *Cerise*, 1795, II.
*Guillarnes* nouvelles, 1788, II, 398.
*Guimauve*, 1795, II, 229.
*Guyenne* (qualité du sol de la), 1794, I, 42.
*Gypse*, voyez *Pierre-à-Plâtre*, 1795, II.

## H.

*Habitans* des îles Gracieuses (observations sur les), 1789, I, 272.
*Habits*, *Habillemens* : ce qu'il faut faire quand le feu y a pris, 1786, II, 308.
—convenables pendant le froid, 1786, II, 248.
—leur choix suivant les circonstances, 1787, I, 224-268.
—pour les pauvres, 1787, II, 251 *et suiv.*
—*idem*, 1789, II, 208.
—de femmes, en linons et mousselines faciles à s'enflammer, 1790, II, 361.
—soins qu'ils exigent pour la santé, 1792, I, 403.
*Hache-paille* : sa description, 1787, I, 84.
—*idem*, 1788, I, 52.
*Haies* d'épines : manière de les faire, 1787, II, 177.
—vives pour former clôtures, 1788, II, 165.
—vives : manière de les faire, 1791, I, 336.

*Haies* vives : manière de les faire, 1792, II, 300 et 400.
—procédé pour les planter, 1793, II, 338-352.
*Hainault* : culture de son canton, 1791, I, 56.
*Hangards* (inconvénient de tenir les moutons sous les), 1787, II, 120.
*Hannetons* : leurs dégâts, 1786, I, 104.
—moyens de les détruire, 1787, I, 162-167.
—dégâts qu'ils causent, 1790, II, 200.
—mangés par les poules, 1791, II, 272.
—moyens de les détruire, 1793, I, 299 *et suiv.*
*Harengs* : leur histoire, 1787, I, 284.
—(observations sur les), *idem.*
*Haricot*, 1795, II, 210.
*Haricots* : observations sur le temps de les semer, 1795, I, 9.
—maladie à laquelle ils sont sujets, 1790, II, 123-127-134.
*Harnois* pour les vaches lorsqu'elles vont paître aux bois, 1786, II, 140.
—des chevaux de charrue, 1791, II, 21.
*Hausse*, voyez *Ruche*, 1795, II.
*Haze*, voyez *Lièvre*, 1795, II.
*Héliotrope*, 1795, II, 49.
*Hémérocalle*, 1795, II, 180.
*Hémorragies* (remède contre les), 1786, I, 399.
*Herbacée* (plante), 1795, II, 286.
*Herbe-aux-Vermes*, voyez *Héliotrope*, 1795, II.
*Herbes* : avec l'huile et les graisses prennent feu, 1786, I, 231.

*Herbes* fines des prés : moyen de les rendre abondantes, 1787, I, 7.
—fraîches, employées comme engrais et fourrage, 1788, I, 10-40.
—des étangs, employées comme amendement, 1792, II, 8.
—parasites : moyen de les extirper, 1793, I, 83.
—détails sur ces plantes, 1793, I, 90 *et suiv.*
*Hernies* (avis aux personnes qui ont des), 1785, I, 217.
*Hêtre* : moyen de le rendre plus durable, 1795, I, 379.
—*idem*, 1795, II, 150.
*Herse*, 1795, II, 55.
—commune : ses inconvéniens, 1786, I, 12.
—nouvelle : ses avantages, 1786, I, 13.
—différentes espèces de Herses, 1786, II, 5 *et suiv.*
—adaptée à une houe, 1787, I, 1.
—traîner la Herse, 1789, II, 24.
*Hydraulique* (machine), 1788, I, 425.
*Hiver* : signe non-équivoque qu'il sera dur, 1793, I, 234.
*Hommes* frappés de la foudre, 1787, I, 253.
—peuvent vivre uniquement de végétaux, 1789, I, 293.
—(résultats sur la durée de la vie des), 1789, II, 321.
*Horloge* naturelle : lys champêtre, 1795, I, 310.
*Hotte*, 1795, II, 260.
*Hottentots*, 1787, II, 316.
*Houblon* : ses tiges employées pour faire de la corde, 1791, I, 369.

*Houblon* : nécessité de le faire sécher parfaitement, 1792, II, 199-200.
—sa culture, 1792, I, 78.
—*idem*, 1795, II, 262.
*Houe*, voyez *Hoyau*, 1795, II.
—angloise, 1787, I, 1.
—binette ou cultivateur, 1788, I, 5.
—à main, 1789, I, 10.
*Houille* : conseils sur son usage, 1789, I, 15.
—mêlée avec les terres : ses inconvéniens, 1793, I, 40.
—*idem*, 1795, II, 79.
*Houlette*, 1795, II, 179.
*Houlque* : sa culture comme fourrage, 1794, I, 135.
*Houx* (petit), voyez *Fragon*, 1795, II.
*Hoyau*, 1795, II, 71.
*Huile* de faine : procédé pour la préparer, 1795, I, 354.
—*idem*, 1782, I, 339.
—*idem*, 1783, I, 57.
*Huiles* nuisibles à la végétation, 1793, I, 156.
—son emploi et ses effets en engrais, 1792, I, 18.
—essentielles : procédé pour les obtenir, 1784, I, 353.
—manière de l'empêcher de fumer, 1782, I, 338.
—moyen de dépurer les Huiles, 1783, I, 399.
—d'onoperdone ou de pédane, 1783, I, 121.
—moyen de corriger sa rancidité et de la prévenir, 1785, I, 46-51.

*Huiles* : moyen de distinguer les Huiles végétales, 1785, I, 19.
—ou goudron de charbon de terre, 1786, II, 419.
—de cornouiller, 1786, II, 176.
—grasses : leur usage dans les maladies, 1786, II, 366.
—de ricin : ses usages, sa préparation, 1786, II, 68, et 368.
—de lin, cuite pour les vernis, 1787, II, 315.
—siccative, 1787, II, 314.
—de vitriol : empoisonnement par cet acide, 1789, II, 263 *et suiv.*
—de noix d'acajou, 1789, II, 267.
—qu'on doit préférer pour la lampe, 1791, II, 328.
—tirée du charbon de terre : son usage, 1791, II, 337.
—d'œillet : conseil pour en augmenter la fabrication, 1790, II, 210.
—*grasse*, voyez *Chanvre*, *Lin*, *Raisin*, *Navet*, *Turneps*, *Colsa*, *Potiron*, *Citrouille*, *Concombre*, *Melon*, *Carthame*, *Amande*, *Noisettier*, *Abricot*, *Cornouiller*, *Violier*, *Senevé*, *Pavot*, *Tabac*, *Laurier franc*, *Pignon doux*, *Olive*, *Pistache*, *Cheval*, *Noix*, *Hêtre*, 1795, II.
—*de Vitriol*, voyez *Soufre*, 1795, II.
—essentielle, 1795, II, 286.
*Humidité* : moyens d'en préserver les appartemens, 1782, I, 342.
—moyen de se préserver de l'Humidité en chassant dans les marais, 1782, I, 341.
—la laine l'absorbe plus aisément que la toile, 1789, II, 209.

*Humidité* : moyen pour entretenir l'Humidité de la terre, 1791, II, 177.
—de l'eau, appliquée à la peau est préjudiciable, 1791, II, 342.
*Huître* : particularités sur cet animal, 1787, I, 289.
*Hyacinthe*, 1795, II, 168.
*Hydatides* des moutons, 1787, I, 186.
*Hydromel*, voyez *Miel*, 1795, II.
*Hydrophobie* (remède contre l'), 1784, I, 245.
*Hydropisie* (remède contre l'), 1782, I, 257.
—*idem*, 1783, I, 295.
—*idem*, 1784, I, 311.
—*idem*, 1784, I, 373.
—*idem*, 1787, II, 365.
—des moutons, 1787, I, 186.
*Hygromètre*, 1782, I, 196.
—*idem*, 1786, I, 288.
—de Francklin, 1788, II, 340.
—*idem*, 1795, II, 287.
—observation sur une plante Hygromètre, 1795, I, 351.
*Hyppobosc* de l'hirondelle, 1786, I, 250.

## I.

*Idées* et conjectures météorologiques, 1787, I, 271.
*If*, 1795, II, 120.
*Immondices* : leurs incommodités et avantages, 1787, II, 8.
*Immortelle*, 1795, II, 30.
*Incendies* : moyen de les prévenir, 1784, I, 385.

*Incendies* spontanés, 1786, I, 231.
—*idem*, 1786, II, 298.
—causés par les brûlis faits sans précautions, 1786, II, 311-318.
—moyen de prévenir les Incendies, 1787, I, 239.
—par l'effet du soleil sur une caraffe pleine d'eau, 1787, II, 296.
—spontané dans des copeaux de fer, 1787, II, 297.
—construction pour préserver des Incendies, 1787, II, 299.
—occasionnés par des couvreurs-plombiers, 1788, II, 249.
—causés par des matières qui prennent feu d'elles-mêmes, 1789, II, 251.
—dans les fermes, 1790, II, 352.
—moyens préservatifs, 1793, I, 400.
*Incinération* pour préparer les terres aux semis, 1793, I, 367.
*Indiens* civilisés et sauvages, 1787, II, 317.
*Indigestion* des animaux : moyen de la guérir, 1784, I, 43.
—maladie commune à un certain âge, 1786, I, 304 *et suiv.*
—des chevaux, 1789, II, 168.
*Indigo* : peut être suppléé par le pastel, 1791, II, 419.
*Industrie* économique, 1791, II, 227.
*Influence* de la lune : vieille erreur, 1786, II, 326.
*Injections* comme remède : précautions à prendre, 1790, II, 399.
*Inoculation* (lettre sur l'), 1784, I, 281-282.

*Inondation* : moyen de diminuer l'insalubrité qu'elle cause, 1784, I 261.

*Insalubrité* : moyen de diminuer l'Insalubrité des maisons, 1784, I, 261.

*Insectes* : sont la cause des maladies des grains, 1793, I, 217 *et suiv.*

—à craindre pour les grains sur pied, 1793, I, 283-288.

—moyens de les détruire, 1784, I, 99.

—manière de les préparer, 1786, I, 262.

—commun dans les nids d'hirondelle, 1786, I, 250.

—dégâts qu'ils occasionnent dans les meubles, 1786, II, 292.

—qui attaquent la rabioule, 1786, II, 113.

—qui attaquent les légumes, 1787, I, 162 et 220.

—qui endommagent les grains, 1790, I, 184.

—des boutons de la gale, 1788, II, 326.

—manière de les préparer, 1788, II, 327-329.

—nuisibles aux arbres, 1789, II, 158.

—qui font périr les haricots et les ormes, 1790, II, 124-134.

—qui attaquent les fruits mûrs, 1792, II, 361.

—qui fait tort aux œillets, 1792, II, 369.

—employés contre la rage, 1793, I, 424 *et suiv.*

—détails de leur nomenclature, 1793, I, 289-298.

*Instruction* sur la manière de rendre salubres les salles des hôpitaux, 1795, I, 290.

*Instructions* pour suppléer les fumiers, 1786, I, 14 *et suiv.*
—sur les moyens de nettoyer le bled moucheté, 1786, I, 157.
—sur les moyens de suppléer la disette de foin et de paille, 1786, I, 51 *et suiv.*
—sur la culture des navets rabioules, 1786, II, 107 et 119.
—sur la manière de cueillir les feuilles des arbres, 1786, II, 82.
—sur les moyens de nettoyer le bled, 1786, II, 19.
—sur la refonte du papier imprimé et manuscrit, 1795, I, 443.
*Instrument* pour jauger les ruisseaux, 1786, I, 360.
—outils dont le tranchant est trop sec, 1786, I, 22.
—pour mesurer le penchant d'un terrein, 1786, II, 394.
—propre à mesurer les distances, 1789, I, 314 *et suiv.*
—pour mesurer et comparer les degrés de la plus forte chaleur, 1786, II, 351.
*Ipécacuanha* : ses bons effets, 1786, I, 309.
—*idem*, 1787, I, 307.
*Irritation* de l'intérieur du nez dans l'asphixie, 1788, II, 283.
*Irrigations* : arrosement des prés par rigoles, 1791, I, 62.
*Islande*, 1789, I, 267.
*Isles* Gracieuses, 1789, I, 272.
—de Schetland, 1789, I, 296-265.
*Ivraie*, 1795, II, 218.

## J.

*Jachères* : avantage de les labourer dès l'automne, 1790, I, 119.
—labour des Jachères, 1793, I, 8 *et suiv.*
—absurdité des Jachères, 1793, I, 96.
*Jacinthe*, voyez *Hyacinthe*, 1795, II.
*Jambes* (remède contre les maux de), 1783, I, 281.
—remèdes contre les enflures des Jambes, 1786, I, 329.
— cassée d'un cheval bien rétablie, 1790, I, 209.
— des chevaux mauvais : habitude de les laver, 1791, I, 188.
*Jambons* : manière de les cuire, 1795, I, 378.
*Jeannette*, voyez *Narcisse*, 1795, II.
*Jar*, voyez *Oie*, 1795, II.
*Jardins* : est-il utile de conserver les Jardins de luxe, 1795, I, 124.
*Jardinage*, 1794, I, 191-226.
*Jardiniers* des environs de Paris, savent accélérer la végétation, 1794, I, 211 *et suiv.*
*Jarre*, voyez *Belier*, 1795, II.
*Jasmin*, 1795, II, 19[illegible].
*Jayet*, *Jai*, voyez *Bitume*, 1795, II.
*Jets* d'eau bouillante, 1789, I, 267.
*Jeunes* filles attaquées de convulsions par sympathie, 1788, II, 259-262.
*Joigny* : agriculture de ses environs, 1790, I, 76.
—*idem*, 1792, II, 140.
*Jonc marin*, voyez *Ajonc*, 1795, II.

*Joncs* conseillés pour faire des étoffes, 1787, II, 251.
—moyen de les détruire, 1794, I, 138.
—préjudicieux à la richesse de l'Etat, 1793, I, 108.
—procédé pour les détruire, 1795, I, 136.
*Jonquille*, 1795, II, 148.
*Journal*: registre que le fermier doit tenir, 1790, I, 3 *et suiv.*
—*idem*, 1791, II, 4 et 7.
*Julienne* simple: sa culture, et produit de la graine, 1790, II, 77-86.
*Jument*, voyez *Cheval*, 1795, II.
*Jumens* nourrices qui ont peu de lait, 1788, II, 180.
*Jus* de fruits: manière de les faire, 1792, I, 460.
—de fumier, 1792, I, 14.
—réservoir pour s'en procurer, 1793, I, 121.

## K.

*Kali*, voyez *Salicor*, 1795, II.
*Kaolin*, voyez *Granit*, 1795, II.
*Kermès*: minéral; procédé pour le faire, 1787, I, 340.
*Kinkina*: ses vertus augmentées par la magnésie, 1788, II, 356.
*Kinorhodon*, voyez *Eglantier*, 1795, II.
*Kirsch-vasser*, voyez *Cerise*, 1795, II.
—procédé pour faire cette liqueur, 1782, I, 344.
*Kouemouisch*, voyez *Cheval*, 1795, II.
*Kouetsch-vasser*, voyez *Prune*, 1795, II.
*Koumiss*: liqueur faite avec le lait de jument, 1791, I, 253.

## L.

*Labiée* (plante), 1795, II, 287.
*Labourer* : inconvénient de Labourer près des avenues, haies et vignes, 1786, I, 12.
—profondément : moyen de le faire, 1786, II, 13.
—avantage de Labourer en été, 1787, II, 16.
—nouvel instrument pour Labourer, 1790, I, 10 et 11.
—temps où il faut Labourer, 1791, I, 25 et 27.
—avec la charrue de l'Isle de France et de Brie, 1791, II, 533.
—règles pour bien Labourer, 1793, I, 36-69-84-87.
—observation sur la manière de Labourer, 1794, I, 93 *et suiv.*
*Laboureur*, doit tenir registre de sa culture, 1790, I, 1.
—*idem*, 1790, II, 1.
*Ladrerie* (observations sur la), 1795, I, 198.
*Laine*, voyez *Belier*, 1795, II.
*Laines* : mémoire sur le premier drap fin fait avec la Laine de France, 1785, I, 11.
—d'où viennent les plus belles, 1786, I, 49 *et suiv.*
—cause de la sécheresse de la Laine des moutons, et moyen de l'améliorer, 1786, II, 144-154.

*Laines* préférables pour l'habillement des pauvres, 1787, II, 252.
—des moutons, améliorée par le parc, 1787, II, 128.
—procédé pour la purifier, 1788, II, 240.
—procédé pour la teindre en bleu, 1789, I, 320.
—moyen de la préserver des insectes, 1789, II, 208.
—elle prend plus d'humidité que la toile, 1789, II, 209.
—possibilité de l'améliorer, 1789, II, 73.
—des moutons tenus sous des hangards, 1789, II, 78.
*Lait*: préparation pour le faire durcir comme une pierre, 1783, I, 404.
—différentes remarques sur le Lait, 1786, I, 193-189-300 *et suiv.*
—chez une négresse crue vierge, 1786, II, 331.
—répandu: remède contre, 1786, II, 376.
—d'ânesse artificielle, 1787, I, 209.
—pour seule nourriture: son efficacité, 1787, I, 308.
—des vaches nourries avec du turneps: ses propriétés, 1787, I, 203-205-207.
—moyen de savoir s'il est pur, 1788, I, 206.
—ses qualités suivant la nourriture de l'animal, 1788, II, 189.
—de jument, donne une liqueur vineuse, 1791, I, 353.
—observation sur différentes espèces de Lait, 1791, II, 276 *et suiv.*
—ne doit pas être gardé dans le cuivre, 1790, II, 294-298.

*Lait* : différence de ses qualités suivant qu'il a été trait, 1792, I, 394.
*Laitier*, voyez *Fer*, 1795, II.
*Laiton*, voyez *Cuivre*, 1795, II.
*Laitue*, 1795, II, 154.
*Laitues* : usage de la Laitue montée, 1785, I, 130.
—sauvage : son suc mêlé avec avantage dans la poterie, 1786, I, 369.
—donnée aux petits cochons qu'on veut sevrer, 1792, II, 264.
*Lampes* à courant d'air : inconvénient de s'en servir dans les petits appartemens, 1795, I, 374.
—— description de la Lampe à courant d'air, 1785, I, 142.
—pour lire dans le lit, 1786, I, 216.
—à cylindre, 1786, II, 289.
—moyen de rendre la lumière plus vive, 1787, II, 281.
—dites d'argent perfectionnées, 1788, I, 247.
—pour bureau, 1788, II, 225.
—nouvelles recherches sur les Lampes, 1789, I, 224 *et suiv.*
—nouvelles Lampes et leur usage, 1791, II, 318 *et suiv.*
—économiques, 1790, II, 425.
*Landes* rendues profitables en y plantant des sapins, 1792, II, 295.
—de Bretagne : comment les fertiliser, 1794, I, 16.
*Langue* des bestiaux sujette aux aphtes, 1790, II, 220.
*Languedoc* : qualité de son sol, 1794, I, 42.

*Lapin*,

*Lapin*, 1795, II, 92.
*Lapins* : leur utilité relativement au commerce, 1795, I, 228.
—profit de les élever, 1787, II, 113.
—moyen de les éloigner des arbres, 1789, II, 152.
—manière de gouverner les Lapines, 1791, II, 306 *et suiv.*
—de clapier : la manière de les gouverner et autres observations, 1791, II, 106 *et suiv.*
—de garenne forcée : leur profit par les peaux, 1791, II, 111-114.
—lapereaux : manière de les nourrir et autres observations, 1791, II, 107 *et suiv.*
—garenne artificielle, 1794, I, 262.
—châtrés deviennent plus gras, 1794, I, 265.
*Laque* rouge : sa composition, 1787, II, 375.
*Larves* : manière de les préparer, 1786, I, 262.
—*idem*, 1786, II, 343.
*Latrines* : danger d'en approcher la lumière, 1787, I, 254.
—moyen de diminuer leur incommodité, 1787, II, 8.
*Lauréole*, 1795, II, 111.
*Laurier*, 1795, II, 116.
*Laurier-cerise* : avis sur l'usage de l'huile de ce Laurier, 1785, I, 140.
*Laurier-thym*, 1795, II, 114.
*Laurine*, voyez *Olive*, 1795, II.
*Lavage* des grains : avantage de ce procédé, 1786, II, 226-36-192.
*Lavande*, 1795, II, 203.
*Lave*, 1795, II, 84.

*Lavement* est un remède pour la colique, 1786, II, 374.
—utiles aux chevaux malades, 1791, II, 197-202.
*Lazane*, voyez *Bled*, 1795, II.
*Législation* : édits, arrêts, déclarations, ordonnances, etc. 1786, I, 401.
*Légumes* : manière de les préparer, 1784, I, 375-378.
—moyen de détruire les insectes qui les attaquent, 1787, I, 164.
—farines de Légumes, 1788, I, 412.
*Légumineuse* (plante), 1795, II, 287.
*Lentille*, 1795, II, 234.
—*d'Espagne*, voyez *Gesse*, 1795, II.
*Lentilles* : manière de les récolter, 1795, I, 132.
—moyen de les préserver des insectes, 1787, I, 220.
—du Canada : sa culture, 1790, I, 111-113.
*Lèpre* (spécifique contre la), 1783, I, 276.
*Lessive* de marrons d'Inde, 1782, I, 348.
—pour préparer le bled, 1786, II, 24 *et suiv.*
—des grains est inutile quand on chaule bien, 1789, II, 24.
—des savonniers est un poison, 1789, II, 264.
—de javelle pour blanchir le fil et coton, 1791, I, 410.
—pour blanchir le linge, 1792, I, 414.
*Levain* artificiel, 1784, I, 380.
—de pomme de terre, 1786, II, 201.
—moyen de le remplacer, 1788, II, 203.

*Levure* de bière : moyen de la conserver, 1795, I, 368.
*Lézards* vantés comme spécifique contre certaines maladies, 1786, I, 398.
—trouvés dans les vaisseaux sanguins, 1786, II, 336.
—nom donné à une affection de la peau chez les animaux, 1790, II, 231 et 236.
*Liber*, 1795, II, 287.
*Lichen*, 1795, II, 119.
*Lichens* : tort qu'ils font aux arbres, 1790, II, 210.
*Lie* de vin : instruction sur son emploi, 1795, I, 392.
—*idem*, voyez *Raisin*, 1795, II.
*Liège*, 1795, II, 74.
*Lierre*, 1795, II, 70.
*Lièvre*, 1795, II, 123.
*Lièvres* : moyen de les éloigner des arbres, 1789, II, 152.
*Ligneuse* (plante), 1795, II, 287.
*Lilas*, 1795, II, 159.
*Lin*, 1795, II, 229.
*Limaces* : moyen de les détruire, 1792, I, 339.
*Limaçon* : observations sur la reproduction de sa tête, 1789, II, 348.
*Limoges* : cours de ses moissons, 1794, I, 7.
*Limon* : usage de son jus dans les maladies, 1787, I, 325.
*Limonade* : moyen de reconnoître si elle est faite avec des limons, 1787, II 306.
*Lin* : son rouissage, 1790, I, 159.
—sa culture dans le Hainault et en Angleterre, 1791, I, 40 et 58.

*Lin* : sa graine donnée aux veaux qui ne boivent plus de lait, 1792, I,....
—sa culture conseillée dans les terres sablonneuses, 1792, II, 165.
—sa culture, 1795, I, 83.
*Linge* : changement proposé dans son blanchissage, 1792, I, 414.
—instrument pour le presser, 1785, I, 174.
—moyen d'en faire disparoître les taches des fruits, 1787, I, 226.
*Linons* : leur danger en habit d'hiver, 1790, II, 361.
*Lion* (observations sur le), 1789, I, 275.
*Liqueurs* pour reconnoître les acides et les alkalis, 1786, I, 341 *et suiv.*
—contre la gale des moutons, 1787, I, 176.
—minérale d'Hoffman, 1787, I, 342.
—de table, faite avec les branches de l'arbre aux anémones, 1788, I, 207.
—anodine nitreuse, 1788, II, 357.
—propre à reconnoître les vins falsifiés, 1792, I, 397.
—propres à une fécondation immersive : ses qualités, 1793, I, 145-154 *et suiv.*
*Lire* dans le lit sans courir le risque de mettre le feu, 1786, I, 220.
*Lis de Sibérie*, voyez *Hémérocalle*, 1795, II.
—*du Japon*, voyez *Amaryllis*, 1795, II.
*Lit* des malades, 1790, I, 339.
*Lits* mécaniques, 1782, I, 224-226.
*Litharge*, voyez *Plomb*, 1795, II.
*Litière* : inconvénient de la laisser longtemps sous les chevaux, 1791, I, 178-90.

*Litière* : utilité de la mêler avec de la chaux, 1791, II, 32.
—donnée aux chevaux pour fourrage, 1790, II, 62.
*Livres* : moyen de les blanchir, 1791, I, 377.
—moyen de leur ôter les taches de suif, 1791, I, 381.
*Livret*, voyez *Liber*, 1795, II.
*Loirs* ou *Lerots* : moyen pour les détruire, 1782, I, 346.
—*idem*, 1786, II, 29.
*Lorraine* : qualité de son sol, 1794, I, 46.
*Lotier* : sa graine mêlée avec le café pour faire une boisson, 1792, II, 416.
*Loupes* : procédé pour les guérir, 1783, I, 301.
—remède contre, 1786, I, 309.
*Loutre marine*, voyez *Loutre d'eau douce*, 1795, II.
*Lumière* phosphorique, 1786, II, 360.
—solaire, nuisible à la germination, 1787, II, 331.
—moyen d'avoir une lumière à l'instant, 1789, II, 288.
*Lune* : préjugé sur son influence, 1786, II, 326.
—sert à prévoir le temps prochain, 1792, I, 375.
*Lunettes* : inconvénient de les placer de manière qu'elles serrent le nez, 1788, I, 294.
—règles pour leur choix, 1791, II, 396-403.
—conseils sur le choix et l'emploi des Lunettes, 1792, I, 448 *et suiv.*
*Lupin*, 1795, II, 238.

*Lupin* : manière de le cultiver, 1791, I, 11.
*Luxuriation* des plantes, 1793, I, 160.
*Luzerne* : sa culture, 1788, I, 34.
—sa récolte, 1788, II, 76.
—sa culture et différentes observations sur cette plante, 1789, I, 96-112 *et suiv.*
—indigestion des animaux qui en mangent trop, 1789, II, 168.
—sujette à être endommagée par les insectes, 1790, II, 198.
—doit être semée avec le chanvre, 1792, I, 118.
—sa culture dans divers endroits, 1792, II, 146-154.
—*idem*, 1795, II, 179.
*Lycoperde*, 1795, II, 249.
*Lycopodium* : son usage contre les effets de la sueur des mains, 1786, I, 223.
*Lycopode*, voyez *Mousse*, 1795, II.
*Lyonnois* : qualité de son sol, 1794, I, 44.
*Lytharge* : moyen de la reconnoître dans le vin, 1787, II, 305.

## M.

*Mâche*, 1795, II, 63.
*Mâche-fer* mêlé avec de la terre pour faire un combustible, 1786, II, 287.
*Machines* : fumigatoire; sa description, 1782, I, 188.
—hydraulique de Vera, 1782, I, 173.
—fumigatoire pour les noyés, 1783, I, 161.
—autre Machine fumigatoire, 1783, I, 201.

*Machines* pour exprimer le suc du raisin, 1784, I, 215.
—aérostatique, 1784, I, 104.
—pour former les tourillons des canons, 1786, I, 396.
—polychreste pour copier les dessins, 1786, I, 379.
—pour les fonderies de fer, 1786, II, 197.
—pour écraser le raisin, 1786, II, 401.
—pour laver le bled, 1786, II, 402.
—à hacher les navets et autres racines, 1787, I, 88.
—pour remonter les bateaux, 1788, I, 400.
—pour préserver de se noyer, 1788, II, 251.
—pour charger les voitures et retarder la marche des vaisseaux, 1788, II, 364 et 368.
—pour la dessication des grains, 1790, I, 256.
—à feu pour moudre les grains, 1791, II, 432.
—pour suppléer aux moulins, 1793, I, 455.
*Macjon*, 1795, II, 58.
*Maçonnerie*: moyen d'en faire dans l'eau qui soit durable, 1783, I, 402.
—baignées par l'eau et exposées aux mouvemens de la mer, 1788, II, 368.
—en pizai ou pizé, 1792, II, 417.
*Macre*, 1795, II, 52.
*Madrague*, voyez *Thon*, 1795, II.
*Madrepores*: nature de ces corps, 1787, II, 292.
*Magnésie* calcinée, augmente la vertu du quinquina, 1788, II, 356.

*Magnétisme* animal, 1785, I, 207.
*Mahaleb*: sa plantation, 1794, I, 142.
*Malades* secourus dans les hôpitaux de Paris, 1789, II, 326.
—conseils donnés aux personnes qui gardent les Malades, 1790, I, 332 *et suiv.*
—*idem*, 1790, II, 387 *et suiv.*
—*idem*, 1791, I, 383 *et suiv.*
*Maladies* des chiens (remède contre les), 1795, I, 345.
*Maladies* vénériennes: méthode pour les traiter, 1782, I, 259.
—causées par la suppression de transpiration, 1792, I, 404.
—rouges des bêtes à laine, 1782, I, 283.
—*idem*, 1783, I, 324.
—épizootique, 1783, I, 321.
—vénériennes, 1783, I, 276.
—*idem*, guéries par les lavemens, 1785, I, 293.
—des animaux, et sur-tout la morve, 1785, I, 340.
—des bestiaux, inconnues dans quelques pays, 1786, I, 133 *et suiv.*
—conseils pour prévenir la Maladie des bestiaux, 1786, I, 135.
—qui attaque les animaux ruminans, 1786, I, 147 *et suiv.*
—commune parmi l'espèce humaine, 1786, I, 144.
—des grains, 1786, I, 35.
—précautions à prendre dans cet état, 1787, I, 303.
—des bêtes à cornes, 1788, I, 183.
—épizootique sur les chevaux et le vaches, 1789, II, 166.

*Maladies* auxquelles les arbres sont sujets, 1790, I, 150.
—manière de se conduire qui fait qu'on s'oppose à leur guérison, 1791, II, 187.
—rouge des moutons, 1791, II, 226.
—des grains, 1793, I, 191-195-145.
*Malcap* : maladie des chevaux, 1791, II, 216.
*Mal-de-mer* : ses effets, 1788, II, 267.
—*du-bois* : maladie des bestiaux, 1789, I, 148.
*Mâles* chez les animaux ne concourent pas à la formation du fœtus, 1788, I, 293.
*Malléable*, 1795, II, 287.
*Malt*, voyez *Escourgeon*, 1795, II.
*Maine* : remarque sur son agriculture, 1794, I, 12.
*Mains* : usage égal des deux Mains, 1786, I, 225 *et suiv.*
*Maïs* ou bled de Turquie : sa culture et ses usages, 1785, I, 1 *et suiv.*
—*idem*, 1786, I, 45 *et suiv.*
—bière et autres préparations faites avec ce grain, 1787, I, 201 *et suiv.*
—différentes manières de préparer ce grain pour la nourriture de l'homme, 1787, II, 204 *et suiv.*
—deux espèces, 1787, II, 2.
—sa culture, 1788, II, 33-45.
—procédé pour en faire du pain, 1790, II, 272.
—mêlé avec la pomme de terre pour faire du pain, 1792, I, 393.
—*idem*, 1795, II, 264.
*Maisons* : procédé pour les rendre incombustibles, 1784, I, 385.

*Maisons* des climats froids de l'Europe, disposées pour être à l'abri du froid, 1786, II, 227.
—*idem*, pour qu'elles soient fraîches l'été, 1786, II, 250.
—récemment bâties, préjudiciables à les habiter, 1791, I, 312.
*Mandragore*, 1795, II, 137.
*Manière* de marcher pour ne pas se crotter, 1786, I, 197.
—de couper la paille en fauchant, 1794, I, 244.
*Manne* : manière d'en faire une artificielle, 1782, I, 347.
—*de Briançon*, voyez *Mélèse*, 1795, II.
—*idem*, voyez *Frêne*, 1795, II.
*Mantes* : état de son agriculture, 1792, II, 122.
—agriculture de ses environs, 1790, I, 58.
*Manufacture* de Mont-Cenis en Bourgogne, 1788, I, 380.
*Marais* : leur défrichement, 1791, I, 239.
—terre des Marais, 1793, I, 7 *et suiv.*
—*salans*, voyez *Sel*, 1795, II.
*Marbre*, 1795, II, 95.
*Marbres* : observations sur ses différentes espèces, 1787, I, 296.
—factices, 1788, I, 409.
*Marc*, voyez *Raisin*, *Pomme*, *Poire*, *Olive*, *Noix*, *Lin*, *Chanvre*, 1795, II.
—des raisins, employé pour nourrir les bestiaux, 1787, I, 37.
—employé comme engrais, 1788, I, 12.
—de raisin : sa préparation pour la donner à manger aux bestiaux, 1795, I, 337.
*Marche* (la), 1794, I, 4.

*Marcotte*, 1795, II, 287.
*Marée* : temps de la haute Marée, 1787, I, 277.
*Marécages* : erreur sur leur défrichement, 1793, I, 36.
—propres à mettre en culture, 1793, I, 6.
*Marentère* : état de son agriculture, 1790, II, 47.
*Marmite* américaine : ses avantages, 1788, I, 226.
*Marmites* économiques, 1790, II, 307 *et suiv.*
*Marmotte* : précis de son histoire, 1787, II, 318.
*Marne*, 1795, II, 93.
*Marner* employée comme engrais, 1786, II, 10 *et suiv.*
—par un labour profond : dans quelles circonstances, 1786, II, 16 *et suiv.*
—manière de l'employer, 1789, II, 14.
—marnage négligé, 1791, I, 26.
—employée comme amendement, 1791, II, 22 et 23.
—doivent varier suivant l'espèce de terrein, 1792, II, 1.
—observations sur ses effets, 1793, I, 42-114 *et suiv.*
—employée de différentes manières, 1794, I, 41-65-68-71.
*Marron*, 1795, II, 267.
*Marrons* d'Inde : lessive de la cendre pour le savonnage, et ses propriétés, 1782, I, 348.
—manière de leur ôter leur amertume, 1783, I, 412.

*Marrons* d'Inde : moyen pour en retirer de la potasse, 1795, I, 390.
—ordinaires : leur préparation pour les maladies de poitrine, 1784, I, 324.
—moyens de les conserver frais, 1794, I, 185.
*Marronnier* d'Inde : observation sur son écorce, 1784, I, 331.
—ses feuilles employées comme fourrage, 1792, II, 340.
—*idem*, 1795, II, 157.
*Marres* artificielles, 1791, II, 41.
*Marseau*, 1795, II, 130.
*Martagon*, 1795, II, 183.
*Mastic* qui résiste à l'eau et au feu, 1786, II, 294.
—impénétrable à l'eau, 1790, I, 327.
*Massicot*, voyez *Plomb*, 1795, II.
*Matelas* de mousse : manière de les faire, 1783, I, 406.
—moyen de les préserver des vers, 1786, II, 294.
*Matières* qui prennent feu par la fermentation, 1786, I, 231 *et suiv.*
—fécale préparée pour engrais, 1792, II, 41.
—caséeuse, 1791, II, 278.
—variolique, 1786, II, 363.
—fécales employées pour engrais, 1787, II, 8.
—fécales : moyen de les faire consommer promptement, 1790, I, 328 *et suiv.*
—usage des matières fécales comme engrais, 1790, II, 13 *et suiv.*
*Morelle*, voyez *Tournesol*, 1795, II.

*Mauvais* temps : moyen de le prévoir, 1792, I, 368.
*Maux* de gorge : remède contre, 1782, I, 298.
—de poitrine : remède contre, 1782, I, 113.
*Maximes* économiques, 1791, II, 227-239.
*Meaux* : agriculture de ses environs, 1790, I, 63.
—*idem*, 1792, II, 127.
*Mèche* avec l'amadou, 1783, I, 400.
—pour les lampes à cylindre, 1786, II, 290.
—préférables à celles connues, 1788, II, 236.
*Médicamens* : ne doivent pas être préparés dans le bronze, 1788, I, 268.
—soins dans leur application, 1790, II, 387.
—danger de les préparer dans le cuivre, 1791, I, 315.
*Mélanges* pour la nourriture des chevaux, 1786, II, 136.
—des grains et grenailles pour les bestiaux, 1786, II, 127.
—de chaux et de fumier pour engrais, 1792, II, 13-54.
—de terres négligées cause leur détérioration, 1793, I, 34.
—des terres avantageux : temps pour les faire, 1793, I, 40-44.
—des grains pour semailles, 1793, I 240.
*Mélasse* : peut être substituée au sucre, 1794, I, 330.
*Mélèse*, 1795, II, 154.

*Mélilot* conseillé pour fourrage, 1792, II, 163.
*Mélisse*, 1795, II, 183.
*Méloé* et proméloé : espèce de scarabée, 1793, I, 424.
*Melon*, 1795, II, 217.
—*d'eau*, voyez *Pastèque*, 1795, II.
*Melons* : leur culture, 1795, I, 138.
—méthode de les cultiver à Honfleur, 1783, I, 135.
—belle espèce, 1783, I, 138.
—manière de les cultiver, 1792, I, 312.
*Melongène*, voyez *Aubergine*, 1795, II.
*Melun* : agriculture de ses environs, 1790, I, 68.
—état de son agriculture, 1792, II, 133.
*Membres* gelés : moyens de les guérir, 1784, I, 317.
*Ménage* (avis et conseils sur le), 1791, II, 232.
*Menthe*, 1795, II, 209.
*Méphitisme* : moyen de le détruire, 1783, I, 256.
—accidens causés par le Méphitisme, 1789, II, 241.
*Mer* du Sud, 1789, I, 272.
—Glaciale, 1789, II, 318.
*Mercure*, 1795, II, 108.
—détruit l'activité du virus variolique, 1786, II, 365.
—rendu solide par le froid, 1786, I, 282.
—moyen de le fixer, 1786, I, 395.
—frictions mercurielles employées contre une difficulté d'avaler, 1786, II, 373.
—employé pour extraire l'or des mines, 1788, I, 363.

*Mercure* en évaporation, cause la paralysie aux ouvriers, 1788, I, 350.
—mal administré : ses funestes effets, 1790, I, 300.
—*idem*, 1790, II, 363.
—employé pour guérir la rage, 1793, I, 431.
*Méridienne* horizontale : son usage, 1788, I, 332.
—moyen de la tracer, 1788, I, 379.
*Merise*, voyez *Cerise*, 1795, II.
*Messageries* : avis au public pour qu'il soit bien servi, 1790, I, 372.
*Mesures* étrangères de capacité, 1792, II, 393.
—d'étendue et de superficie, *idem*.
*Métaux* : sont combustibles et s'enflamment, 1787, I, 299.
—verre pour les souder, 1787, II, 370.
—qui fondent à la chaleur de l'eau bouillante, 1787, II, 514.
—métal de cloche est aussi dangereux que le cuivre pour faire des vaisseaux de cuisine, 1791, I, 320.
—nuisibles à la santé mis dans le vin, 1792, I, 397.
*Méteil* : sa culture en Hainault, 1791, I, 59.
—*idem*, voyez *Seigle*, 1795, II.
*Météores* : leurs effets, 1788, II, 297.
—expérience dont les effets ressemblent aux Météores, 1789, II, 381.
—leurs effets sur les grains, 1793, I, 254.
*Météorologie* : observations météorologiques, 1788, II, 416.
—*idem*, 1794, I, 228.
*Métier* à bas simplifié, 1786, II, 405.

*Meules* : comment elles doivent être faites suivant les saisons, 1786, II, 64 et 69.
—manière de les bien faire, 1789, II, 173.
—*idem*, 1791, I, 81.
—*idem*, 1792, I, 51.
*Meûniers* : moyens de prévenir les fraudes qu'ils se permettent, 1795, I, 380.
*Mezereum*, 1795, II, 114.
*Mica*, voyez *Granit*, 1795, II.
*Michaut*, voyez *Pois*, 1795, II.
*Miel*, 1795, II, 64.
—eau-de-vie qu'on en retire, 1790, II, 139.
—procédé pour le substituer au sucre, 1794, I, 320.
—*idem*, 1793, I, 196-202.
*Miélat* : maladie des grains, 1793, I, 161.
*Milasse*, 1787, II, 224.
—*idem*, voyez *Maïs*, 1795, II.
*Mille-pore*, 1787, I, 292.
*Millet* (gros), voyez *Maïs*, 1795, II.
—*idem*, 1795, II, 248.
—*d'Inde*, voyez *Sorgho*, 1795, II.
*Milloc*, voyez *Maïs*, 1795, II.
*Mines*, 1787, I, 343.
*Minérales* (substances) propres aux fumiers, 1793, I, 112.
*Minium*, voyez *Plomb*, 1795, II.
*Miroirs* de télescopes, 1788, II, 362.
—plus parfaits, 1790, II, 422.
*Mirrhis* : herbe bonne pour fourrage, 1791, II, 75.
*Mites* : moyen de les éloigner de la farine, 1787, I, 211.
—qui endommagent les haricots, 1790, II, 126 *et suiv.*

*Moies* ou petites meules durant les moissons humides, 1788, II, 64.
*Moineaux* blancs, 1789, II, 337-338.
—manière de les prendre, et dégâts qu'ils occasionnent, 1790, I, 195 *et suiv.*
*Moisissure*, voyez *Champignon*, 1795, II.
*Moisissures* : moyen d'empêcher celles qui paroissent sur les infusions, 1786, I, 344.
*Moissons* : précautions à prendre pour les faire, 1786, I, 77.
—divers moyens pour les faire suivant les années, 1786, II, 63 *et suiv.*
—pluvieuse : moyen de conserver le grain et la paille, 1788, II, 61.
—hâtives, 1793, I, 249.
—leur cours dans différens districts, 1794, I,...
*Moissonneurs* : soins qu'il faut avoir pour leur conserver la santé, 1792, I, 136.
*Maus* ou *Maous* : vers du hanneton, 1786, I, 104.
—les dégâts qu'ils commettent ; moyen de les détruire, 1786, II, 186-189.
*Monstre* prétendu, 1789, II, 341.
*Montelimart* : sa culture, 1794, I, 17.
*Montagnes* de glaces : observations sur leur accroissement, 1787, I, 277.
—air des Montagnes élevées, 1788, I, 287.
—moyen de mesurer leur hauteur, 1788, I, 285.
—cours et qualités des moissons des pays montagneux, 1794, I, 16-17 et 19.
*Montfort* : agriculture de ses environs, 1792, II, 126.
—*idem*, 1790, I, 62.
*Montreau* : agriculture de ses environs, 1790, I, 72.

*Montreau* : agriculture de ses environs, 1792, II, 136.
*Montres* : boussoles faites suivant un nouveau procédé, 1789, II, 436.
*Monts* nuisibles au desséchement des marais, 1793, I, 8.
*Mophettes* accidentelles ou cachées, 1792, I, 431.
*Morille*, 1795, II, 150.
*Morjeline*, voyez *Mouron*, 1795, II.
*Mors* : maladie du safran, 1787, II, 342.
*Morsure* des chiens enragés : remède contre, 1783, I, 293-296.
*Mort et Mortalité* : subite, attribuée aux émanations de la paille, 1790, II, 369 *et suiv.*
—état de mort n'est pas toujours très-facile à connoître, 1786, II, 316.
—aux rats, souris et loirs, 1786, II, 291.
—des hommes : proportions dans les deux sexes, 1788, I, 308.
—coutumes de différens peuples relativement aux morts, 1789, II, 228.
—soins à prendre des personnes nouvellement mortes, 1790, I, 362 *et suiv.*
—soins à prendre pour s'assurer si la Mort est réelle, 1790, I, 355 *et suiv.*
—*idem*, 1790, II, 364.
*Mortier* : manière de le faire, 1782, I, 351.
—pour remplacer le plâtre, 1785, I, 353.
—rendu meilleur par le charbon de terre, 1786, II, 217.
—vanté par sa durée, 1788, I, 402.
—impénétrable à l'eau, 1788, II, 237.

*Mortier* ustensile : danger d'employer les Mortiers de cuivre, 1788, I, 268.
*Mottes* de terre : instrument pour les rompre, 1787, I, 3.
*Moyen* de vivre long-temps, 1786, I, 397.
—peu coûteux de faire une étoffe chaude, 1787.
*Mouche à miel*, voyez *Abeille*, 1795, II.
*Mouches* : moyen de les prendre, 1788, II, 93.
—cantharides : leur récolte, 1795, I, 324.
*Mouflon*, voyez *Belier*, 1795, II.
*Moules* : moyen d'empêcher qu'elles ne soient nuisibles, 1782, I, 260.
—*idem*, 1791, I, 315 *et suiv.*
*Moulin*, 1795, II, 243.
*Moulins* à battre le bled, 1782, I, 228.
—à battre le beurre, 1783, I, 199.
—description des différens Moulins, 1783, I, 183 *et suiv.*
—à plâtre, 1785, I, 177.
—nouveau, 1786, II, 413.
—à couper les racines et grains pour les bestiaux, 1787, II, 109 *et suiv.*
—à cidre, 1789, I, 144 *et suiv.*
—pour laver les cendres des orfèvres, 1789, II, 438.
—pour réduire la pomme de terre en pulpe, 1790, II, 290.
—domestique, peu coûteux, 1790, II, 292.
—à grains, de la construction de M. Durand, 1791, I, 397.
—domestiques, 1792, I, 387.
*Mourans* : attention qu'on doit leur donner, 1790, I, 302.
*Mouron*, 1795, II, 135.

*Mousse* conseillée pour faire des étoffes, 1787, II, 251.
—moyen de la détruire, 1790, II, 210.
—préjudiciable aux prés, 1791, I, 66.
—des arbres, 1792, I, 342.
—*idem*, 1795, II, 111.
*Mousselines*: leur danger en habits d'hiver, 1790, II, 361.
*Mousseron*, voyez *Champignon*, 1795, II.
*Mousseuse*, voyez *Rose*, 1795, II.
*Moût*, voyez *Raisin*, *Pomme*, *Poire*, 1795, II.
*Moutarde*, voyez *Senevé*, 1795, II.
*Mouton*, voyez *Belier*, 1795, II.
*Moutons* (maladie des), 1786, I, 150 *et suiv.*
—(diverses observations sur les), 1791, II, 45-153-157-160.
—causes qui produisent chez eux la maladie appellée pourriture, 1792, I, 360.
—soins pour les faire voyager, 1792, I, 135.
—conseils pour les préserver des maladies; 1786, I, 84-79 *et suiv.*
—observations sur la manière de les gouverner, 1786, II, 111-148-154 *et suiv.*
—observation sur l'usage de son fumier, 1787, I, 6 et 7.
—précis sur la manière de les gouverner, 1787, I, 117 *et suiv.*
—traitement des Moutons dans leurs différentes maladies, 1787, I, 176 *et suiv.*
—conseils sur le traitement des Moutons, 1787, II, 114-134 *et suiv.*
—manière de les saigner à la joue, 1787, II, 192.

*Moutons* tenus à l'air pendant l'hiver, 1788, I, 72 et 73.
—le genêt d'Espagne les rend malades, 1788, I, 176-186.
—diverses observations sur les Moutons, 1788, II, 94-170-92-112-182.
—parqués à l'air, et tenus sous un hangard, 1789, II, 72-73.
—parqués pendant les hivers rigoureux, 1790, I, 140.
—avantage de leur rapide consommation, et remplacement, 1790, I, 219.
—soins pour les gouverner, 1790, II, 52-59-117 *et suiv.*
—économie de les engraisser avec des graines, 1791, I, 83.
—(maladie rouge des), 1791, II, 226.
—nourris avec des racines, 1794, I, 290.
—manière de les élever, 1792, II, 213-215.
—ne sont pas empoisonnés par les gobbes, 1792, II, 383.
—destinés à la boucherie, 1792, II, 253.
—la renoncule les tue, 1793, I, 387.
—sont sujets à l'insalubrité des étables, 1793, I, 119.
*Mouture* : procédé de différentes méthodes de moudre, 1783, I, 140 *et suiv.*
—économique, 1788, I, 112.
—conseils sur la Mouture, 1789, I, 197 *et suiv.*
*Mucilages* : moyen d'en tirer de l'huile, 1790, I, 365.
*Mue* des chevaux, 1791, I, 221.
*Muguet*, 1795, II, 166.
*Mulets* : moyen de les détruire, 1794, I, 271.

*Mulets* : manière de les détruire, 1793, I, 438.
—dégâts qu'ils font, 1789, II, 154.
—manière de les détruire, 1790, I, 195.
—*idem*, 1792, I, 329.
—*idem*, 1792, II, 353-358.
*Mulet*, 1795, II, 199.
*Multiplication* des grains, 1794, I, 110-103.
*Mûres*, 1795, II, 224.
*Mûriers* : mémoire sur les Mûriers nains, 1782, I, 11.
—manière de tailler les Mûriers, 1784, I, 178.
—observations sur sa conservation, 1785, I, 125.
—blanc : son écorce donne de la soie, 1786, II, 174.
—sa culture, ses maladies, 1788, II, 135-150.
—du Mont-Liban, 1794, I, 161.
—conseils pour le tailler, 1787, I, 160.
—précautions en les effeuillant, 1787, I, 161.
—ses feuilles sèches et sa seconde écorce employées pour nourrir les vers-à-soie, 1790, II, 140-152.
*Murs* : manière de faire un crepissage solide, 1785, I, 363.
*Muscate*, voyez *Rose*, 1795, II.
*Mutelline* : herbe bonne pour fourrage, 1791, II, 76.
*Myopes*, ou vue courte, 1792, I, 448.
*Myrte*, 1795, II, 237.
*Myrtille*, 1795, II, 160.

## N.

*Nager* : méthode pour apprendre à Nager, 1783, I, 339.
—moyen pour préserver d'être noyés ceux qui ne savent pas Nager, 1787, I, 256.
*Nains*, 1788, I, 307.
—vu à Paris : sa description, 1789, II, 329.
*Naissances* des hommes : proportions dans le deux sexes, 1788, I, 308.
—*idem*, 1789, II, 322.
*Narbonne* (vallée de) : sa culture, 1794, I, 17.
*Narcisse*, 1795, II, 132.
*Naufragés* : machine pour soutenir sur l'eau ceux qui ne savent pas nager, 1788, I, 266.
*Navets* donnés comme fourrages, 1786, II, 77-137.
—sujets à être attaqués par des insectes, 1787, I, 45.
—donnés sans précautions aux bestiaux, leur sont nuisibles, 1787, II, 183 *et suiv.*
—avantages de les cultiver avec les fèves de marais, 1788, II, 60.
—sujets à être attaqués par les tiquets, 1790, II, 196.
—moyen de les conserver, 1790, II, 306.
—jaune : sa culture, ses qualités, ses avantages, 1791, I, 60-131 *et suiv.*
—conviennent pour préparer les mauvais sols, 1794, I, 6.

*Navets* : leur culture dans le Quercy, 1794, I, 9.
—comment les rendre propres à améliorer les terres, 1794, I, 22.
—(gros) : leur culture, 1794, I, 125.
*Navet*, 1795, II, 40.
*Navette* : instruction sur sa culture, 1795, I, 99.
—moyens économiques d'employer cette plante, 1785, I, 128.
*Nécessaire* chymique, 1784, I, 138.
*Nèfle*, 1795, II, 62.
*Nègres* : remarques sur la vie et la santé des Nègres, 1789, I, 268.
*Négresse* crue vierge ayant du lait, 1786, II, 339.
*Neige* : ses effets sur les grains semés, 1793, I, 259.
*Nemours* : agriculture de ses environs, 1790, I, 71.
—*idem*, 1792, II, 136.
*Nerfs* coupés se régénèrent, 1787, I, 324.
*Nerprun*, 1795, II, 260.
*Nettoyer* : manière de Nettoyer l'argenterie, 1787, I, 263.
*Nielle* : moyen d'en préserver les bleds, 1782, I, 299.
—sa cause et ses effets, 1793, I, 171 *et suiv.*
*Nitre*, voyez *Salpêtre*, *Topinambour*, *Buglose*, 1795, II.
*Niveau* d'eau perfectionné, 1790, II, 430.
*Nivellement* : pratique de cette opération, 1787, I, 386.
*Nivernois* : cours de ses moissons, 1794, I, 21.

*Nogent* :

*Nogent* : agriculture de ses environs, 1790, I, 74.
—*idem*, 1792, II, 139.
*Noir* · recette pour en faire du beau, 1784, I, 403.
—*idem*, 1785, I, 382.
*Noisettier*, 1795, II, 124.
*Noisette*, 1795, II, 261.
*Noix*, 1795, II, 254.
*Noix de galle*, voyez *Chêne*, 1795, II.
*Nombril* de cochon : son emploi, 1795, I, 458.
*Nonnain*, voyez *Pigeon*, 1795, II.
*Norfolk* : province d'Angleterre ; sa culture, 1792, I, 52.
*Normandie* : agriculture de cette province, 1790, II, 33.
—*idem*, 1794, I, 3.
*Nourrices* qui ont des engorgemens laiteux au sein, 1791, II, 275.
—avis sur ce qui peut influer sur la qualité de leur lait, 1791, II, 282.
*Nourriture* des chevaux plus économique que la commune, 1788, I, 67.
—des bestiaux quand on manque de paille, 1786, II, 77.
*Novales* : observations sur les travaux qu'elles exigent, 1793, I, 77.
*Noyaux* de pêches donnés comme fébrifuge, 1786, II, 372.
*Noyer*, voyez *Noix*, 1795, II.
*Noyés* (moyen de secourir les), 1783, I, 162.
—manière de se servir de la machine fumigatoire pour les Noyés, 1783, I, 173.

*Noyés* (autre moyen pour rappeller à la vie les), 1783, I, 263.
—*idem*, 1784, I, 308.
—*idem*, 1786, I, 331.
—secours à leur donner, 1791, I, 345.
—utilité des boîtes fumigatoires aux armées pour rappeller à la vie les Noyés, 1795, I, 334.
*Nuages* : servent à prévoir le temps prochain, 1792, I, 368.

## O.

OBSTRUCTIONS (remède contre les), 1788, II, 355 *et suiv.*
*Ocre*, voyez *Fer*, 1795, II.
*Odeurs* fortes, éloignent les rats, 1786, I, 224.
—servent à prévoir le temps prochain, 1792, I, 384.
*OEillet*, 1795, II, 189.
—*d'Inde*, voyez *Tagette*, 1795, II.
*OEillets* : manière d'en avoir toute l'année, 1795, I, 112.
—observations sur les variétés de ces fleurs, 1795, I, 131.
—moyen d'en avoir en fleur au printemps, 1792, I, 321.
—sont endommagés par un insecte, 1792, II, 369.
*OEilleton*, voyez *Cayeux*, 1795, II.
*OEillette* (huile d'), voyez *Pavot*, 1795, II.
—huile d'OEillete, ou huile de graine de pavot, 1792, II, 210.

*OEnomètre* : instrument pour reconnoître la fermentation du vin, 1782, I, 237.
*OEufs* : manière de les faire éclore par l'électricité, 1783, I, 364.
—renfermé dans un autre, 1786, II, 341.
—moyens pour les conserver frais, 1786, II, 210 *et suiv.*
—de vers-à-soie : détails sur leur conservation, etc. 1791, I, 144 *et suiv.*
—de perdrix : observations sur ces OEufs, 1791, II, 123 *et suiv.*
—moyen de les conserver plusieurs mois, 1792, I, 396.
—de poules qui ont mangé des hannetons, sont bons, 1792, II, 272.
*Oie*, 1795, II, 48.
*Oies*, manière d'en tirer le meilleur profit, 1792, I, 208.
—manière de les élever, 1792, II, 265.
— procédé pour les engraisser et les mettre en pot, 1794, I, 342.
—lettre sur leur salaison, 1795, I, 277.
*Oignon*, 1795, II, 199.
*Oignons* semés à la manière des jardiniers de Paris, 1794, I, 211.
—culture des Oignons tapés, 1795, I, 77.
—de nouvelle espece, bons à manger, 1795, I, 75.
—de narcisse : danger de les manger, 1795, I, 331.
*Oiseaux* : leur préparation pour les cabinets d'histoire naturelle, 1786, I, 260.
—mécanisme de leur vol, 1786, II, 361.
—moyen de les tirer au fusil sans les endommager, 1790, I, 384.
*Olive*, 1795, II, 76.

*Oliviers* : choix des espèces qu'il faut planter, 1791, I, 118.
—manière de les planter, 1788, II, 152.
*Ombelle*, 1795, II, 287.
*Ombre* nuisible et incommode aux moutons, 1786, II, 155 *et suiv.*
*Onguent* vanté pour les blessures des arbres, 1792, II, 343-348.
*Opales* factices, 1787, I, 361.
*Opérations* : césarienne ; son avantage, 1789, II, 326.
—chirurgicale : soins que doivent prendre les assistans, 1790, II, 416.
*Opiat* à l'usage des vieil ards épuisés, 1785, I, 329.
*Opilations* (remède pour les), 1782, I, 262.
*Opium*, voyez *Pavot*, 1795, II.
—employé contre la gangrène, 1786, I, 317.
—*idem*, 1786, II, 367.
—remède contre les maladies vénériennes, 1786, II, 372.
*Or* : moyen de retirer l'Or et l'argent des galons, 1782, I, 352.
—moyen de le retirer des bois dorés, 1783, I, 287.
—moyen de le retirer des mines, 1787, I, 349.
—moyen de le mettre en couleur, 1787, I, 374.
—moyen de le nettoyer ainsi que le galon, 1787, II, 310.
—moyen de l'enlever de la surface de l'argent, 1787, II, 373.
*Orange*, 1795, II, 56.

*Orangers* attaqués de carie : moyen de les guérir, 1787, II, 176 *et suiv.*
*Orcanette*, 1795, II, 210.
*Ordres* secrets : méthode pour les faire parvenir au loin, 1785, I, 391.
*Oreille-d'homme*, voyez *Azaret*, 1795, II.
*Orge*, 1795, II, 43.
—*nu*, voyez *Sucrion*, 1795, II.
—*quarré*, voyez *Escourgeon*, 1795, II.
—comparaison du profit de la culture de l'Orge avec celui de l'avoine, 1789, I, 39 *et suiv.*
—détails de sa culture en Angleterre et autres endroits, 1790, I, 44 *et suiv.*
—son produit suivant la quantité qui a été semée, 1792, II, 64.
—veut un bon terrein, 1793, I, 339.
—mêlé avec le seigle, 1793, I, 241.
—précoce, nu, 1793, I, 241.
—à six pans : sa culture, 1794, I, 114.
—notice sur l'Orge à six pans, 1795, I, 31.
—mondé : manière de le faire, 1795, I, 261.
*Orienter* : moyen facile de le faire, 1788, I, 379.
—moyen de s'Orienter par l'observation d'une plante, 1791, I, 376.
*Ormes* : leur mortalité aux environs de Toulouse, 1790, II, 1-129 *et suiv.*
—*idem*, 1795, II, 132.
*Oronge*, voyez *Champignon*, 1795, II.
*Oranges* (mémoire sur les), 1789, II, 357.
*Orpiment*, danger de l'employer pour orner les surtouts de table, 1790, II, 285.
*Orseille*, voyez *Lichen*, 1795, II.

*Orties* ( mémoire sur la culture des ), 1782, I, 1.
—blanche : guérit les piqûres aux pieds des chevaux, 1786, I, 154.
—vertus attribuées mal-à-propos à cette plante, 1791, I, 170.
—romaine, annoncée comme un moyen de s'orienter, 1791, I, 376.
*Os* : fournissent des produits semblables à ceux de la corne de cerf, 1786, II, 390.
—en poudre, employés comme engrais, 1788, I, 13.
*Oseille*, 1795, II, 73.
*Osier noir*, voyez *Marsean*, 1795, II.
*Ouate*, voyez *Apocyn*, *Coton*, 1795, II.
*Outre*, voyez *Bouc*, 1795, II.
*Ouvertures* des corps réputés morts : précautions à y apporter, 1790, I, 311.
*Ovaire*, 1795, II, 288.
*Oxide*, 1795, II, 288.

## P.

PACANIER, voyez *Noix*, 1795, II.
*Pailles* serrées humides, prennent feu, 1786, I, 232.
—hachée ; ses avantages pour fourrage, 1786, II, 135.
—serrées humides : moyen d'empêcher qu'elles ne se gâtent, 1786, II, 75.
—observations sur la Paille de différens grains, 1786, II, 157 *et suiv.*
—machine à couper les feuilles pour les bestiaux, 1787, I, 84.

*Paille* hachée : ce qu'il faut en donner aux bestiaux, 1787, II, 105.
—gâtée par la grêle, 1789, II, 141.
—insuffisante dans quelques fermes pour fournir le fumier nécessaire, 1790, I, 25.
—nouvelle, accusée de donner la mort, 1790, II, 369-371.
—brûlée sur les terres, 1794, I, 13.
*Pain* de pommes de terre, 1795, I, 250.
—voyez *Bled*, *Seigle*, *Orge*, *Sucrion*, *Epéautre*, etc. 1795, II.
—*de Coucou*, voyez *Oseille*, 1795, II.
—*de Pourceau*, voyez *Cyclamen*, 1795, II.
*Pains* d'épices purgatifs, sont dangereux, 1784, I, 224.
—économique, 1784, I, 381.
—de bled nouveau, ne cause pas de maladies, 1786, I, 169 *et suiv.*
—composé de farine de maïs et de froment, 1786, I, 171 *et suiv.*
—cuit dans des fours chauffés avec le charbon de terre, 1786, I, 207.
—de maïs pur, de bled de sarrasin, 1786, I, 174.
—moyen de taxer son prix, 1786, II, 203 *et suiv.*
—pour les chevaux et bestiaux, 1787, I, 96.
—de pommes de terre et de farine de froment, 1787, II, 201.
de maïs, 1787, II, 232.
—de millet, 1787, II, 236.
—procédé pour faire de bon pain, 1788, I, 214.
—à cacheter, sont quelquefois dangereux, 1789, II, 266.

*Pains* : fait avec du bled ou autre grain nouveau, 1790, I, 233.
—économique pour les pauvres, 1790, I, 238-242.
—de diverses espèces, 1790, II, 259-367.
—de plusieurs grains, 1791, I, 241-248.
—de pommes de terre, 1790, I, 251.
—de froment et de pommes de terre, 1791, II, 264 *et suiv.*
—fait avec maïs et pommes de terre, 1792, I, 393.
—où il reste peu de son, est salubre, 1792, II, 406.
*Prairies* artificielles, 1783, I, 131.
—— amendées par le parc des moutons, 1786, II, 146.
—différentes observations sur les Prairies, 1786, II, 143-325.
—*idem*, 1791, II, 27-61-63-99.
—médiocres : moyen d'en tirer parti, 1790, I, 52.
—atificielles et naturelles : soins pour les améliorer, 1790, II, 32.
—des environs de Paris : quelle est leur nature, 1792, II, 145-153.
—manière de les fumer, 1793, I, 129.
—comment les marner, 1794, I, 71.
*Palay* (Sainte) : son agriculture, 1791, I, 13.
*Pan* des bœufs qui indique les plantes que mangent les bêtes à cornes, 1782, I, 74.
*Panais*, 1795, II, 27.
*Panier*, 1795, II, 267.
*Paniers* de jonc qui tiennent l'eau, 1790, II, 386.

*Paniers* propres à conserver le grain, 1792, II, 404.
*Panis*, 1795, II, 225.
*Pannés* : moyen de les conserver secs, 1788, II, 206.
*Pannicule*, 1795, II, 288.
*Pansemens* de plaies, 1790, II, 417.
—des chevaux : utiles à leur santé, 1791, I, 181 *et suiv.*
*Papier* : nouvelle manière de l'apprêter, 1786, I, 381.
—avantage de le satiner, 1788, II, 396.
—mâché : préparation pour faire des pâtes moulées, 1789, II, 414.
—moyen de le blanchir, 1791, I, 377-381.
*Papilionacée* (plante), 1795, II, 288.
*Papillons* : manière de vernir les Papillons et autres insectes, 1782, I, 354.
—manière d'arrêter leurs ravages sur les grains, 1782, I, 353.
*Paquerette*, 1795, II, 137.
*Parallélisme* du sol : comment le corriger : 1793, I, 61.
*Paralysie* : moyen de la guérir, 1783, I, 300.
—guérie par la cohabitation de chiens avec le malade, 1785, I, 302.
—occasionnée par la vapeur du mercure, 1788, I, 350.
*Para-tonnerre* : manière de les disposer, 1784, I, 158.
—*idem*, 1786, I, 233-236.
—faciles et peu coûteux à établir, 1789, II, 242.
—observations sur leur insuffisance, 1789, II, 378.
*Parc*, 1795, II, 209.

*Parcs et Pacage* domestiques : manière de les faire, 1786, I, 78-80.
—des moutons : ses avantages, 1786, II, 146.
—Pacage d'hiver : ses inconvéniens, 1786, II, 153.
—des moutons : détails à ce sujet, 1787, I, 11-17.
—instruction sur le Pacage, 1787, I, 11 *et suiv.*
—moutons parqués toute l'année; inconvéniens, 1787, II, 114-131.
—différentes observations sur l'avantage et désavantage du Pacage, 1790, I, 28-139-140.
—observations sur le Pacage, 1790, II, 119 *et suiv.*
—Pacage des moutons usité en Angleterre, 1791, II, 45.
—attention que doit prendre le berger pour le Pacage, 1794, I, 257.
*Parchemin*, voyez *Belier*, 1795, II.
*Parfums* : leurs effets sur l'air, 1786, I, 275 *et suiv.*
—employés mal-à-propos pour purifier l'air, 1792, I, 26.
*Paris* : agriculture de ses environs, 1790, I, 54.
—*idem*, 1792, II, 118.
*Pas-d'âne*, voyez *Tussilage*, 1795, II.
*Passe-velours*, voyez *Amaranthe*, 1795, II.
*Pastel* : méthode pour le fixer, 1783, I, 367.
—son usage dans la teinture, 1791, II, 419.
—*idem*, voyez *Guède*, 1795, II.
*Pastèque*, 1795, II, 253.
*Patagons* : observations sur cette peuplade, 1787, I, 281.

*Patates* : soupe qu'on en peut préparer, 1787, I, 212.
—acclimatées en France, 1795, I, 141.
*Patine*, voyez *Cuivre*, 1795, II.
*Pâturages* : ne sont pas proportionnés aux terres cultivées, 1790, I, 25.
—nécessité de les augmenter, 1790, I, 215.
*Pauvres* (habillemens des), 1787, II, 251.
—moyen de les nourrir avec un pain économique, 1790, I, 238.
—soupes nourrissantes à leur donner, 1790, I, 245-248.
*Pavi*, voyez *Péche*, 1795, II.
*Pavot* : sa culture, 1795, I, 108.
—*idem*, 1791, II, 210.
—*idem*, 1795, II, 189.
*Péat-bogs* : marais de tourbe et plante désignée sous le nom de Péat, 1786, II, 336.
*Peaux* de chèvres et de veaux, 1789, I, 337.
—de lapins : leur valeur, 1791, II, 114.
*Péche*, 1795, II, 39.
*Péchers* en espaliers : importance de leur ébourgeonnement, 1791, I, 122-127-129.
—son produit augmente par les arrosemens, 1792, II, 335.
—en espalier : avantage de les éloigner, 1792, II, 327.
—sujets aux punaises, 1794, I, 222.
*Pécherettes* pour prendre des écrevisses, 1790, II, 383.
*Péduncule*, 1795, II, 288.
*Peinture* économique, 1795, I, 375.
—éladorique, 1782, I, 355.
—à l'encaustique, 1784, I, 400 et 403.
—condition pour avoir une bonne couleur, 1785, I, 371.

*Peinture* : composition pour peindre en miniature, 1789, II, 431.
—propre à conserver le bois et le fer, 1791, II, 336 *et suiv.*
—peu coûteuse et durable, 1792, II, 428.
*Pelle*, 1795, II, 77.
*Pelleteries* : moyen de les préserver des vers, 1786, I, 194.
—notices des belles Pelleteries de Russie, 1789, I, 287.
*Pensée*, 1795, II, 159.
*Perce-neige*, 1795, II, 113.
*Perches* de superficie de terrein : combien il en faut pour un arpent, 1792, II, 396.
*Perdreaux* : manière de les élever et de les nourrir, 1791, I, 125 *et suiv.*
*Perdrigon*, voyez *Prune*, 1795, II.
*Perles* produites dehors de la coquille des huîtres, 1787, II, 330.
—fines factices, 1787, II, 374.
—n'engendrent pas d'autres Perles, 1791, II, 430.
*Perpignan* : son agriculture, 1794, I, 16 *et suiv.*
*Persil*, 1795, II, 137.
*Pervenche*, 1795, II, 149.
*Peste* blanche et rouge : maladies des chevaux, 1791, II, 216.
*Pétale*, 1795, II, 288.
*Pétiole*, 1795, II, 288.
*Petite - vérole* : comment elle se gagne; observations sur cette maladie, 1786, I, 311 *et suiv.*
—abus des rafraîchissemens dans son traitement, 1786, II, 362.

*Petit-lait* : avis sur son usage, 1783, I, 274.
—de diverses femelles, fait avec du lait écrêmé, 1791, II, 279-300.
*Pétrifications* : moyen de reconnoître comment elles ont été formées, 1787, II, 344.
*Pétrole*, voyez *Bitume*, 1795, II.
*Peuplier*, 1795, II, 115.
—suisse, préférable à celui d'Italie, 1794, I, 149.
*Peur* mal fondée d'être enterré vivant, 1786, II, 316.
*Pèse-liqueurs* pour la cuite du vesont, 1786, II, 399.
—nouveau, 1790, I, 368.
*Phénomènes* électriques, 1789, II, 379.
*Phillirea*, voyez *Alaterne*, 1795, II.
*Phosphore*, 1786, I, 360.
*Phrénésie* sympathique, 1789, II, 269.
*Phytolacca* : plante dont le fruit sert à colorer les papiers, 1790, II, 423.
*Picardie* : état de son agriculture, 1790, II, 45.
—cours de ses moissons, 1794, I, 2.
*Pied-de-Griffon*, voyez *Ellébore*, 1795, II.
*Pieds* (de la toilette des), 1785, I, 265.
*Pierre* à chaux, 1795, II, 94.
—à plâtre, 1795, II, 96.
*Pierres* de la vessie et des reins, ne sont pas produites par les eaux terreuses, 1786, I, 184.
—de la vessie : remède contre, 1787, I, 311.
—fines : procédé pour les faire, 1786, II, 381.

*Pierres* : enlèvement total des Pierres, détériore un terrein, 1787, I, 62.
—procédés pour composer différentes Pierres précieuses, 1787, I, 354, 371.
—leur effet sur les grains semés, 1793, I, 263.
*Pierrées* : égoûts couverts sous la glèbe, 1793, I, 10.
—— les chiens sont sujets à cette maladie, 1792, I, 352.
—leur utilité dans les champs, 1793, I, 17.
—inconvénient de dépierrer les terres, 1792, II, 331.
—leur surface sert à prévoir le temps prochain, 1792, I, 284.
—machine à percer les pierres de taille, 1791, I, 406.
—précieuses : moyen de les distinguer, 1789, II, 373.
—orientales : moyen de les distinguer, 1788, II, 291.
—herborisées, 1787, II, 343.
*Pieux* qui résistent mieux au courant des eaux, 1788, II, 239.
*Pigeon*, 1795, II, 158.
*Pigeons* de colombier : soins qu'ils exigent, 1789, II, 102.
—leur utilité dans les grands pays de labour' 1794, I, 274.
*Pignolet*, voyez *Pignon*, 1795, II.
*Pignon* doux, 1795, II, 74.
*Pilotis* qui résistent mieux au courant des eaux, 1788, II, 239.
*Pilules* arthritiques, 1785, I, 331.
*Pimènt*, 1795, II, 43.
*Pimprenelle* : avantage de la mêler avec le foin pour les bestiaux, 1787, I, 65 *et suiv.*

*Pimprenelle* : sa culture, 1789, II, 51-57.
—*idem*, 1795, II, 175.
*Pin cultivé*, voyez *Pignon*, 1795, II.
*Pins* : leurs feuilles employées comme fumier, 1791, II, 37.
—sa fleur nuit aux plantes, 1793, I, 8.
*Pincement* du pêcher, 1791, I, 129.
*Pintade*, 1795, II, 211.
*Pioche*, 1795, II, 65.
*Piquette* : vin artificiel, 1791, II, 312.
—*idem*, voyez *Raisin*, 1795, II.
*Piqûres* des guêpes, 1792, II, 365.
*Pisé* : genre de construction économique, 1791, I, 264, *et suiv.* 429.
—avantage de cette espèce de construction, 1792, I, 417.
—espèce particulière qui n'est pas la plus solide, 1792, II, 423.
—avantage de cette construction, 1793, I, 401.
*Pissement* de sang : maladie des bestiaux; (remède contre le), 1785, I, 338.
*Pissenlit*, 1795, II, 140.
*Pissotage* : lait qui se tire à la fin de la traite, 1792, I, 395.
*Pistache*, 1795, II, 57.
*Pistil*, 1795, II, 288.
*Pivoine*, 1795, II, 194.
*Pivotante* (plante), 1795, II, 289.
*Plaies* gangreneuses (remède contre les), 1782, I, 262.
—des moutons : remèdes, 1787, I, 188.
—des arbres : composition pour les guérir, 1792, II, 343-347-348.
*Planchers* incombustibles, 1782, I, 193.
—en fer, 1787, II, 377.

*Planchers* de nouvelle construction, 1787, II, 281.
—en briques creuses, 1788, I, 256.
*Planétaire* nouveau, 1786, II, 412.
*Planètes* nouvellement découvertes, 1786, I, 352.
*Plantation* nouvelle de jeunes arbres, n'empêche pas le terrein de produire, 1792, II, 299.
—*idem*, 1794, I, 141-190.
*Plante-aux-œufs*, voyez *Aubergine*, 1795, II.
*Plantes* : leur irratibilité, leur sommeil, 1787, II, 332-338.
—vertes employées en engrais, 1788, I, 10.
—air pur retiré des Plantes exposées au soleil, 1788, II, 289.
—ou végétaux cultivés, 1790, I, 226.
—inodores, ne vicient pas l'air, 1790, II, 374.
—inconvéniens de planter dans le même terrein plusieurs plantes à racines traçantes, 1791, I, 76 *et suiv.*
—qui peuvent fournir les fourrages printaniers, 1791, II, 74.
—aromatiques brûlées pour purifier l'air; leurs inconvéniens, 1792, I, 426.
—servent à prévoir le temps, 1792, I, 382.
—aquatiques employées comme amendement, 1792, II, 8.
—diverses observations sur les plantes, 1793, I, 3-35-219.
—à soie : sa culture, 1794, I, 117.
—potagères : utilité de les cultiver, 1795, I, 81.

*Plantes* vénéneuses, telles que le panais sauvage, 1795, I, 327 *et suiv.*
*Plantin* préjudiciable aux prés, 1791, I, 67.
*Plantoir*, 1795, II, 141.
*Plants* d'arbres fruitiers (observations sur les), 1786, II, 165-181.
*Plaqué* d'argent employé en vaisselles, 1789, I, 334.
*Platane*, 1795, II, 142.
*Platine* allié à l'or : moyen de le reconnoître, 1787, II, 369.
*Plâtras* employés comme engrais, 1794, I, 217.
*Plâtre*, voyez *Pierre-à-Plâtre*; 1795, II.
—employé pour les prairies artificielles, 1782, I, 83.
—moyen de le remplacer dans les endroits où il manque, 1785, I, 353.
—mieux cuit avec le charbon de terre, 1786, II, 277.
—neuf, mal-sain, 1786, II, 221.
—en engrais, 1788, I, 10.
—*idem*, 1792, II, 4 et 6.
*Pleurésies* : remède contre cette maladie, 1782, I, 263.
*Pleurs* d'eau détériorent les terres, 1793, I, 39.
*Plinthes* en plâtre : leur prompte altération, 1792, I, 421.
*Plomb* : danger de conserver le tabac dans le Plomb, 1783, I, 266.
—mêlé à l'étain : moyen de reconnoître cet alliage, 1786, I, 345.
—de chasse : moyen d'en faire sur le champ, 1787, II, 312.
—mêlé au cidre et à la bière : moyen de le reconnoître, 1790, II, 280 *et suiv.*
—mêlé au vin et au cidre et dans les ali-

mens : moyen de le reconnoître ; accidens qu'il cause, 1791, II, 315-337-340.
*Plomb*, 1795, II, 106.
*Plumbago* : plante conseillée contre la gale, 1786, I, 317.
*Pluies* : observations sur la Pluie, 1786, I, 408.
—*idem*, 1786, II, 410.
—sa formation, 1787, I, 272.
—comparaison de la Pluie pendant le courant de plusieurs années, 1787, II, 380.
—quantité de Pluie tombée à Paris en 1786 et en 1787, 1788, II, 410.
—*idem*, dans d'autres années, 1789, II, 440 *et suiv.*
—moyen de la prévoir, 1792, I, 368-372.
*Poëles* de Francklin, 1782, I, 137 *et suiv.*
—économique, 1785, I 192.
—des habitans du Nord, préférables aux nôtres, 1786, II, 230.
—usité en Russie, 1787, II, 269.
—du sieur Garcelon, 1787, II, 278.
—nouveau, 1788, I, 237.
—chinois, 1789, I, 239.
—des Allemands, Russes et Suédois, 1790, II, 324.
—de charbon allumé, cause l'asphixie, 1791, I, 354.
—à brûler du bois et du charbon de terre, peuvent causer l'asphixie, 1791, I, 356.
*Poids* étrangers : leur rapport avec la livre de France, 1790, I, 371.
*Poils* au cou des cochons : maladie, 1786, I, 152.
—de l'intérieur du nez des chevaux : inconvénient de les couper, 1791, I, 290.

*Poils* des chevaux, qui tombent ou s'alongent, 1791, I, 221.
*Points* noirs que l'on croit voir sur les objets qu'on regarde, 1791, I, 362.
*Poiré* : boisson fermentée, 1790, II, 286.
*Poire*, 1795, II, 47.
*Poires* tapées, 1794, I, 335.
*Pois*, 1795, II, 187.
—moyen de les préserver des insectes, 1784, I, 100.
—*idem*, 1785, I, 141.
—leur produit, 1792, II, 67.
—cultivés comme fourrage, 1794, I, 131.
*Poisons minéraux* (remède contre les), 1783, I,...
—observations sur les flèches empoisonnées, 1784, I, 330.
*Poissons* : manière de le préparer pour un voyage de long cours, 1783, I, 404.
—moyen d'ôter au Poisson un peu avancé son mauvais goût, 1784, I, 379.
—*idem*, 1786, I, 175.
—leurs empreintes dans les pierres d'ardoise, 1787, I, 297.
—empêchent l'eau de se glacer, 1787, II, 327.
—qui tue des mouches en leur lançant une goutte d'eau, 1788, I, 312.
—leur préparation pour les cabinets d'histoire naturelle, 1788, I, 325.
—moyen de les conserver l'hiver dans un étang, 1782, I, 359 *et suiv.*
—moyen de les conserver une année, 1788, I, 208.
—des étangs ; conseils sur leur vente, 1790, I, 182.

*Poissons* : cause de la mortalité des Poissons dans les étangs, 1790, II, 156 *et suiv.* 189.
*Poitrine* (remède contre les maladies de), 1783, I, 312.
—des enfans découverte : inconvénient de ce mode, 1789, II, 311.
—(affections de), 1794, I, 347.
*Poivre*, voyez *Piment*, 1795, II.
*Poix minérale*, voyez *Bitume*, 1795, II.
*Pol de Léon* (Saint), cours de ses moissons, 1794, I, 12.
*Pologne* : réussite de son bled barbu, 1794, I, 112.
*Pomifère*, voyez *Rose*, 1795, II.
*Pomme*, 1795, II, 45.
—*d'Adam*, voyez *Bigarade*, 1795, II.
—de terre, 1795, II, 28.
*Pommes* : procédé pour leur donner une saveur particulière, 1795, I, 288.
—de terre : culture de cette plante par la voie des semis, 1795, I, 33.
—observations sur les Pommes de terre hâtives, 1795, I, 39.
—réflexions sur leur culture, 1795, I, 45.
—(disette des) : sa cause, 1788, II, 130.
—comparaison de leur produit avec celui des carottes, 1795, I, 62.
—cette plante n'effrite pas le sol, 1795, I, 68.
—accident qui leur arrive, 1795, I, 70.
—de terre : manière de les cultiver, et usage de ses racines, 1782, I, 126-134.
—fromage de Pommes de terre, 1782, I, 361.

*Pommes* de terre : lettre sur leur dégénérescence, 1785, I, 105-108.
--divers usages et propriétés des Pommes de terre, 1786, II, 124 *et suiv.* 201-375.
--diverses observations sur les Pommes de terre, 1787, I, 46 *et suiv.* 79 *et suiv.* 212 *et suiv.*
--*idem*, et ses produits, 1787, II, 68-201 *et suiv.*
--sa préparation pour aliment par les Américains, 1788, II, 197.
--sa culture, son produit, ses maladies, 1788, II, 55.
--expériences sur sa culture, 1789, I, 51 *et suiv.*
--expériences faites à la plaine des Sablons, 1789, I, 48.
--préparée en pâte à laver, 1789, II, 290.
--différentes observations sur la Pomme de terre, 1790, I, 96 *et suiv.* 239-249-269.
--*idem*, 1790, II, 63-16-70-74-98-259-261-289-303.
--gelées : moyen d'en tirer parti, 1791, I, 260.
--mêlées avec de la farine de froment pour faire du pain, 1791, I, 265.
--*idem*, 1792, I, 393.
--divers conseils sur cette racine, 1792, I, 121 *et suiv.*
--méthode particulière de les cultiver, 1793, I, 302.
--leur usage pour les chevaux, 1794, I, 310.
--substituées au pain, 1794, I, 331.
--desséchées, 1794, I, 340.

*Pommier*: chenille qui endommage ses fleurs, 1790, II, 210.
--sa chenille est dangereuse, 1794, I, 221.
*Pompes* de Vera, 1782, I, 173.
--moulin propre à les faire mouvoir, 1783, I, 175.
--à sein, 1783, I, 271.
--à sein, 1787, I, 330.
--à sein, 1788, I, 359.
--*idem*, 1786, I, 337.
--extraordinaire, 1786, II, 414.
--à feu, 1787, II, 376.
--*idem*, 1788, I, 389.
--contre les incendies, 1788, II, 250.
*Pontoise*: agriculture de ses environs, 1790, I, 59.
--*idem*, 1792, II, 123.
*Population*: augmente-t-elle ou décroît-elle? 1789, II, 324.
*Porcelaine*, voyez *Argille*, 1795, II.
--mastic pour la raccommoder, 1786, II, 294.
*Porcs*: remède contre leurs maladies, 1788, II, 181.
*Porion*, voyez *Narcisse*, 1795, II.
*Portes-barres* pour prévenir les accidens des chevaux embarrés, 1790, I, 130.
*Portes* battantes, rendent les appartemens plus chauds, 1786, II, 230-244.
*Portraits*: instrument pour les faire, 1786, I, 379.
--*idem*, 1789, I, 322 *et suiv.*
*Potasse*: moyen de s'en procurer et connoître sa qualité, 1784, I, 391 *et suiv.* 404.
--peut être substituée à la cendre pour laver les grains, 1786, II, 24.
--*idem*, 1795, II, 289.

*Potée*, voyez *Étain*, 1795, II.
*Poterie* de terre, acquiert de la qualité par le suc de laitue sauvage, 1786, I, 369.
--mastic pour raccommoder la poterie cassée, 1786, II, 294.
--vernissée, n'est pas toujours dangereuse, 1791, II, 317.
--*idem*, voyez *Argille*, 1795, II.
*Potiron*, 1795, II, 30.
*Poudres* purgatives du sieur Ailhaud, 1782, I, 264.
--fumigatives anti-pestilentielles, 1783, I, 306 *et suiv.*
--pour nettoyer les dents, 1787, I, 338.
--de chasse : moyen d'éprouver sa qualité, 1787, II, 311.
--fécondantes : mauvais succès de son usage, 1787, II, 18.
--à canon conseillée comme remède, 1789, II, 169.
--de chasse : moyen de la rendre plus forte, 1790, II, 385.
*Poudrette* préparée avec de la gadoue, 1789, II, 17 et 18.
--son usage, 1792, II, 41.
*Poularde*, voyez *Poule*, 1795, II.
*Poule*, 1795, II, 144.
--*perlée*, voyez *Pintade*, 1795, II.
*Poules* : maladie à laquelle elles sont sujettes, 1790, II, 223 *et suiv.*
--faisandes (diverses observations sur les), 1791, II, 139 *et suiv.*
--peuvent manger des hannetons sans inconvénient, 1792, II, 272.
*Poulets* : moyen de les faire éclore artificiellement, 1795, I, 222.

*Poulets et Poulardes* : manière de les engraisser, 1792, I, 103.
*Pouls* des chevaux : manière de le tâter, 1791, II, 189.
*Pourriture* : maladie des moutons, 1792, I, 360.
--(remède contre la), 1782, I, 283.
--du foie des moutons, 1787, I, 186.
*Pousses* des arbres : moyen d'en tirer parti, 1789, I, 178.
*Poussière* des étamines, 1795, II, 289.
--de charbon, peut causer l'asphixie, 1791, I, 354.
*Poussin*, voyez *Poule*, 1795, II.
*Poux* : de bois des Américains, 1788, I, 314.
*Poutres* refendues, plus solides qu'entières, 1788, II, 237.
--courbées en contre-haut, employées comme plus solides, 1788, II, 237.
*Pozzolane*, voyez *Lave*, 1795, II.
*Prés* (moyens d'entretenir les), 1784, I, 51 *et suiv.*
--(culture et arrosement des), 1785, I, 54.
--(observations sur la culture et la fauchaison des), 1786, I, 42 *et suiv.* 87.
--(observation sur les), 1787, I, 9-20-65 *et suiv.*
--soins pour les entretenir, 1788, I, 56.
--bas : nécessité de les renouveller, 1788, II, 77.
--bas : moyen de prévenir les dégâts dans ces Prés, 1789, II, 62.
--bas, amendés par les bestiaux, 1789, II, 66.

*Prés* hauts : moyen de les améliorer, 1789, II, 61.
--naturels et artificiels : moyen de les entretenir, 1790, II, 95.
--moyen de les améliorer, 1791, I, 61 *et suiv.*
--amendés par la vase des étangs, 1791, II, 27.
--peuvent être fauchés sans préjudicier aux bleds, 1792, II, 134.
*Précautions* relatives à la dyssenterie des armées, 1795, I, 309.
*Prêle*, 1795, II, 223.
*Préparations* pour les grains destinés à être semés, 1786, II, 14 *et suiv.*
--chymiques : leur manière d'agir, 1787, I, 341.
--et conservation des alimens, dangereuses dans certains vaisseaux, 1789, I, 208.
*Presse* : description de la Presse à imprimer sur les étoffes, 1782, I, 218.
*Pressoir*, 1795, II, 34.
*Pressure* pour faire les fromages, 1787, I, 125.
--ses différentes propriétés, 1792, II, 273-276.
*Présages et Prévisions* du temps qu'il doit faire et des saisons, 1792, I, 368-385.
--de la pluie ou du temps sec, 1794, I, 224.
--par les sangsues, 1794, I, 225.
*Primerole*, voyez *Primevère*, 1795, II.
*Primevère*, 1795, II, 142.
*Prix* du pain, fixé d'après des expériences, 1786, II, 203.
*Productions* agraires de la France et de l'Angleterre, 1794, I, 28-32.

*Produits* chymiques en vente à Montpellier, 1786, I, 385.
*Prolifère*, 1795, II, 289.
*Pronostics* : instrument qui indique le temps qu'il fera, 1783, I, 188.
--*idem*, 1785, I, 200.
--des saisons et du temps prochain, 1792, I, 368 *et suiv.*
*Propriétaires* : leurs profits comparés à ceux des fermiers, 1791, I, 227.
--soins qu'ils doivent avoir de tenir des registres de leur exploitation, 1791, II, 4.
*Propriété* : puissant aiguillon pour l'industrie, 1794, I, 151.
*Provence* : ses montagnes couvertes de troupeaux, 1794, I, 19.
--sa culture, 1794, I, 19-43.
*Proverbes* économiques, 1791, II, 227-239.
*Provin*, voyez *Marcotte*, 1795, II.
*Provins* : agriculture de ses environs, 1790, I, 70.
--*idem*, 1792, II, 134.
*Prune*, 1795, II, 246.
*Prunes* de monsieur : détail du procédé pour teindre en couleur Prune de monsieur, 1782, I, 362.
--sorbet fait avec différentes Prunes, 1784, I, 371.
--de brignolles séchées, 1787, II, 241.
*Pruneau*, voyez *Prune*, 1795, II.
*Prunier*, voyez *Prune*, 1795, II.
--moyen de le conserver verd avec ses fruits en hiver, 1794, I, 194.
*Prunus-padus* : sa différence avec le mahaleb, 1794, I, 143.

*Phthisie* pulmonaire : observation sur cette maladie, 1783, I, 294.
--guérison de cette maladie, 1784, I, 299-304.
*Puberté* des filles : inconvéniens de les tenir au couvent dans ce temps-là, 1786, II, 321.
*Puce* dans l'oreille : accidens qui en ont été la suite, 1786, II, 319.
*Pucerons* : moyen de les détruire, 1787, I, 165.
--moyen de les éloigner des orangers, 1787, II, 176.
--tort qu'ils font aux arbres, 1792, I, 337-341.
*Puces* de terre qui détruisent les semis, 1787, I, 45.
*Puisards* non pavés, sont préférables, 1790, I, 328.
--danger d'en approcher des lumières, 1787, I, 254.
*Puits* (moyen de détruire le méphitisme des), 1783, I, 256.
*Pulmonaire*, 1795, II, 120.
*Pulmonie* : cas où elle devient contagieuse, 1786, II, 373.
*Punaises* : moyen de les écarter et de les détruire, 1782, I, 367.
--*idem*, avec la feuille d'yeble, 1782, I, 411.
--des nids d'hirondelle, 1786, I, 250.
--moyen de les éloigner, 1789, II, 276.
*Punch* : manière de faire cette boisson, 1784, I, 373.
--composition ; son sirop, 1789, I, 231.
*Purgatifs* : soins et précautions dans leur usage, 1790, II, 393.

*Purgations* des chevaux, 1791, II, 208.
*Pustules* : maligne à laquelle sont sujets les bergers et les bouchers, 1792, II, 373.
*Pyrite*, 1795, II, 289.
*Pyromètre* amélioré, 1788, I, 372.

## Q.

*Quantité* proportionnelle de grains pour les semailles, 1793, I, 235 *et suiv.*
*Quartz*, voyez *Granit*, 1795, II.
*Queue* de cheval : plante qui détériore les foins, 1787, I, 75.

## R.

*Rabioule*, voyez *Turneps*, 1795, II.
--grosse rave donnée aux bestiaux, 1786, II, 107.
--sa culture, 1786, II, 108 *et suiv.*
*Racines* : machines employées à les couper pour les bestiaux, 1787, I, 88.
--machine pour les couper en terre, 1787, II, 14.
--de disette, 1787, II, 58.
--dures : moulin pour les couper pour les bestiaux, 1787, II, 109.
--peuvent servir à multiplier les arbres et arbustes, 1787, II, 175.
--potagères : moyen de les conserver, 1790, II, 306.
--données aux moutons pour les engraisser, 1791, I, 85.
--bonnes à cultiver pour nourrir les bestiaux, 1791, II, 70 *et suiv.*

*Racines* : manière de les greffer pour multiplier les arbres fruitiers, 1792, II, 333.
--remarques sur les Racines des arbres étrangers, 1794, I, 155.
--employées pour l'engrais des moutons, 1794, I, 291.
*Radis*, 1795, II, 156.
--noir : son emploi comme assaisonnement, 1795, I, 289.
*Raffineries* de sucre, 1786, II, 415.
*Rafraîchissans* : leur abus dans la petite-vérole, 1786, II, 362.
*Rage* : traitement de cette maladie, 1795, I, 347.
--avis sur le traitement de cette maladie, 1782, I, 265.
--(remède contre la), 1782, I, 271.
--des animaux (remède contre la), 1782, I, 288.
--guérison de la rage d'après Tissot, 1783, I, 291.
--*idem*, d'après Leroux, 1784, I, 237.
--lettre sur la Rage des chiens, 1785, I, 332.
--son traitement par la cautérisation, 1785, I, 327.
--des animaux : réflexions à ce sujet, 1786, I, 327.
--traitement de cette maladie, 1787, I, 309.
--forte et douce : traitement particulier de ces maladies, 1788, I, 189.
--(remède contre la), 1793, I, 408 *et suiv.*
--peut tarder à se manifester, 1793, I, 412.

*Rage* donnée à un homme par un animal non enragé, 1793, I, 411.
*Raifort*, 1795, II, 67.
--de la Chine, 1792, I, 105.
*Raiponce*, 1795, II, 60.
*Raisin*, 1795, II, 21.
--*des bois*, voyez *Myrtille*, 1795, II.
*Raisins* : machine hydraulique pour les faire fermenter sans danger, 1782, I, 234.
--(machine pour exprimer le suc des), 1784, I, 215.
--*idem*, 1786, II, 401.
--secs : procédé pour les préparer, 1788, II, 207.
--son marc mêlé avec le charbon de terre pour combustible, 1788, II, 214.
--moyen de les conserver, 1789, I, 238.
--*idem*, 1789, II, 202.
*Ramier*, voyez *Pigeon*, 1795, II.
*Rampante* (plante), 1795, II, 290.
*Rapontic*, voyez *Rhubarbe*, 1795, II.
*Ratafias* : méthode pour faire celui d'anis, 1783, I, 425.
--recette pour en faire d'excellens, 1784, I, 372.
--de citron et de noix, 1785, I, 365.
--de brou de noix, 1794, I, 345.
--sans sucre, 1794, I, 346.
*Rateau*, 1795, II, 168.
*Rateliers* : leurs inconvéniens, 1786, II, 133.
--*idem*, 1787, II, 106.
--supprimés mal-à-propos dans les étables, 1792, II, 238.
*Ration* de nourriture des chevaux, 1791, I, 195.

*Rats* : moyen de les éloigner, 1786, I, 224.
--recette de la mort aux Rats, 1786, II, 291.
--moyen de les détruire, 1787, II, 180.
--*idem*, 1790, I, 195.
--*idem*, 1793, I, 438.
*Rave*, voyez *Turneps*, 1795, II.
*Raves* dites rabioules, 1786, II, 117.
*Ray-grass* donné en fourrage aux chevaux, les rend aveugles, 1790, II, 116.
--employé en gazon, 1790, II, 122.
--*idem*, voyez *Fromental*, 1795, II.
*Recherches* et démonstrations curieuses des causes qui produisent la fumée dans les appartemens, 1790, I, 271.
*Rechûtes* de maladies, 1789, I, 300.
*Récolte* des grains, 1786, II, 63 *et suiv.*
--mauvaises ou médiocres : leur cause, 1790, I, 27.
*Reconnoître* : manière de Reconnoître sur terre les vaisseaux qui sont en mer, 1786, I, 386.
*Recuites* : espèce de fromage, 1789, II, 99.
*Régime* : règles de Régime suivant les tempéramens, 1783, I, 238.
*Régisseurs* de biens de campagne, mal choisis, 1789, II, 170.
*Registres* de culture des prés, 1790, I, 1 et 4.
--d'exploitation des terres, 1791, II, 1 *et suiv.*
*Réglisse*, 1795, II, 253.
*Reliure* sans fil, 1788, II, 396.
*Remèdes* : avis concernant les Remèdes pour

lesquels on demande des brevets, 1784, I, 217 *et suiv.*
*Remèdes* distribués en province sans permission, 1784, I, 233.
--anti-laiteux, 1786, II, 376.
--contre les maladies des bestiaux, 1787, I, 175 *et suiv.*
--contre les obstructions, 1788, II, 359.
--contre les indigestions des animaux, 1789, II, 168.
--populaires : leurs effets, 1789, II, 275.
*Renoncule* des champs : ses dangers pour les bestiaux, 1793, I, 387.
*Renouée*, voyez *Traînasse*, 1795, II.
*Reproductions* végétales : avantages de ces reproductions, 1790, I, 226.
*Requin* : observations sur ce poisson, 1788, II, 324.
*Réséda*, 1795, II, 31.
--sa culture, 1795, I, 122.
*Réservoirs* : forme qu'il convient de leur donner, 1790, II, 357.
--moyen pour que l'eau y soit souvent agitée, 1790, II, 360.
--à eau : manière de les bien faire, 1791, II, ...
*Résine*, 1795, II, 290.
*Résines* rendues miscibles à l'eau, 1788, II, 397.
*Rétentions* d'urine : précautions pour les prévenir et les guérir, 1786, I, 336.
--traitée avec la glace, 1786, II, 374.
--secours à administrer dans cette maladie, 1789, I, 307.
*Réunion* des petites fermes, est préjudiciable au public, 1790, I, 25.

*Rêves* possibles et salutaires, 1789, II, 304.
*Rhubarbe*, 1795, II, 169.
*Rhumatismes* (remède contre les), 1782, I, 273.
--*idem*, 1783, I, 302 et 305.
--*idem*, 1784, I, 323.
--*idem*, 1788, I, 251.
*Rhume* avec consomption (remède contre le), 1785, I, 330.
*Rigoles* conseillées pour égoutter les terres, 1790, I, 121.
*Riz d'Allemagne*, voyez *Orge*, 1795, II.
--en grains préférable à la farine, 1795, I, 262.
--soupe au Riz et pommes de terre, 1787, I, 212.
--préparation de Riz économique pour les pauvres, 1790, I, 248.
--employé avec la farine de froment pour faire du pain, 1791, I, 248.
--économique pour les pauvres, 1794, I, 357 *et suiv.*
*Rivières* (observations sur les crues et les débordemens des), 1782, I, 101.
*Robinets* : moyen pour que les Robinets de fontaines ferment bien, 1784, I, 211.
*Roche-Corbon*, voyez *Prune*, 1795, II.
*Romaine*, 1795, II, 157.
*Romarin*, 1795, II, 201.
*Roquette*, 1795, II, 158.
*Rose*, 1795, II, 161.
--*de-chien*, voyez *Eglantier*, 1795, II.
*Roses* : procédé pour en obtenir l'huile essentielle, 1784, I, 356.
--moyen de conserver des Roses fraîches, 1789, II, 290.

*Roseau*, 1795, II, 73.
*Rosée*: sert à prévoir le temps prochain, 1792, I, 371.
*Rossignol*, 1795, II, 165.
*Rotation*: terme pour exprimer la succession de culture des champs, 1790, I, 118.
--de quatre ans, préférable à celle de trois pour le profit, 1791, II, 68.
*Rouet*: description d'un Rouet particulier, 1785, I, 188.
--*idem*, 1788, I, 388.
*Rouge* végétal pour les dames, 1789, II, 289.
*Rougeole* gagnée par un singe, 1792, I, 358.
*Rouille*, voyez *Fer*, 1795, II.
*Rouille*: maladie des bleds, 1786, II, 400 *et suiv.*
--incertitude sur la cause de cette maladie, 1787, I, 391.
--de l'acier: manière de l'empêcher, 1787, II, 307 et 309.
--maladie des arbres fruitiers, 1790, I, 152.
--de l'acier: moyen de l'empêcher, 1790, II, 382.
--des grains: sa cause, ses préservatifs, 1793, I, 161-180 *et suiv.*
*Rouir*, voyez *Chanvre*, 1795, II.
*Rouissage*: moyen de le rendre plus prompt et plus parfait, 1790, I, 159.
--du chanvre (observations relatives au), 1792, II, 172-195 *et suiv.*
*Rouleau*, 1795, II, 59.
--instrument d'agriculture, 1787, II, 1.
--manière d'employer cet instrument, 1787, II, 53-54.

*Rouvre*, voyez *Chêne*, 1795, II.
*Roux-vieux* : affection de la peau chez les animaux, 1790, II, 230.
*Rozoy* : agriculture de ses environs, 1790, I, 166.
--*idem*, 1792, II, 130.
*Rubis* factices : procédé pour les faire, 1787, I, 364.
*Ruche* nouvelle : 1783, I, 203.
--*idem*, 1785, I, 107 *et suiv.*
--manière de les gouverner pour les conserver l'hiver, 1792, I, 290.
--de nouvelle forme, 1792, II, 312 *et suiv.*
*Ruche*, 1795, II, 156.
*Ruisseaux* : instrument pour les jauger, 1786, I, 360.
*Ruse* de petits marchands, 1788, II, 290.

## S.

*Sabine*, 1795, II, 70.
*Sable* employé à démoucheter le bled, 1786, II, 195.
--de bruyère, employé pour les semis, 1791, II, 174.
--de mer, employé comme amendement, 1792, II, 7.
*Sabot* des chevaux, 1791, I, 189.
*Safran*, 1795, II, 23.
--ses maladies et remèdes, 1787, II, 342.
--en balle qui a pris feu, 1790, I, 291.
*Sagamite* : espèce de bouillie bonne à manger, 1787, II, 212.
*Sagri*, voyez *Ane*, 1795, II.
*Saignées* faites aux moutons, 1787, I, 145.
--*idem*, 1787, II, 192.

*Saignées* utiles dans les inflammations internes causées par la goutte, 1788, I, 346.
--soins à donner aux malades qu'on doit saigner, 1790, II, 414.
--à faire aux chevaux : précautions dans ce cas, 1791, II, 204.
--aux chevaux : quand sont-elles nécessaires? 1792, I, 350.
*Saillies* en plâtre, sont dangereuses, 1792, I, 421.
*Sainfoin* : sa récolte, 1788, II, 76.
--indigestion causée aux bestiaux par ce fourrage, 1789, II, 168.
--sa culture, 1789, II, 42.
--semé avec l'avoine : inconvénient de cette pratique, 1791, I, 44.
--noirci, rendu mangeable par les chevaux, 1791, I, 80.
--avantage de le semer en automne, 1792, I, 47.
--profit de sa culture dans certaines terres, 1792, II, 111-147-156.
--observations sur sa culture, 1794, I, 48 *et suiv.*
--observations sur cette plante, 1795, I, 114.
--d'Espagne, *idem.*
--en arbrisseau, *idem.*
--*idem*, 1795, II, 169.
*Saintes* : son agriculture, 1791, I, 56.
*Saint-Florentin* : son agriculture, 1790, I, 77.
--*idem*, 1792, II, 142.
*Saint-Sever* : cours de ses moissons, 1794, I, 14.

*Saisons* : quelles doivent être leur température pour donner de bons grains, 1793, I, 254.
*Salaison* de la chair de bœuf, 1786, II, 209.
*Salamandres* : observation sur cet animal, 1789, II, 342.
*Salep* : comment on peut s'en procurer d'indigène, 1794, I, 359.
*Salicor*, 1795, II, 225.
*Salin*, voyez *Potasse*, 1795, II.
*Salpêtre*, 1795, II, 86.
--natif, 1788, II, 311.
*Salpêtrier* révolutionnaire, 1795, I, 422.
*Salsifis*, 1795, II, 52.
--*noir*, voyez *Scorsonère*, 1795, II.
*Salubrité* des camps : questions relatives à cet objet, 1795, I, 318.
*Sane*, voyez *Macjon*, 1795, II.
*Sang* employé comme engrais, 1788, I, 12.
*Sangles* des selles de chevaux : avis sur leur serrement, 1791, I, 216.
*Sanglier*, voyez *Cochon*, 1795, II.
*Sanguin des bois*, voyez *Cornouiller*, 1795, II.
*Santal* rouge, propre à la teinture, 1791, II, 413.
*Saphirs* factices, 1787, I, 357.
*Sapin*, 1795, II, 68.
--méthode de donner à son bois la dureté du chêne, 1785, I, 119.
--ses feuilles donnent un fumier, 1791, II, 37.
--culture de cet arbre dans les landes et bruyères, 1792, II, 295.

*Saponaire* : plante qui peut suppléer le savon, 1794, I, 350.
*Sarrasin*, 1795, II, 33.
--laquelle des espèces doit on préférer, 1790, I, 204.
--diverses espèces de Sarrasin bonnes à cultiver, 1794, I, 55 *et suiv.*
*Sarcloir*, 1795, II, 176.
*Sarmenteuse* (plante), 1795, II, 290.
*Sassafras* : observations sur cet arbre, 1784, I, 76 et 78.
*Sauge*, 1795, II, 211.
*Saule* : leurs feuilles données comme fourrage, 1790, I, 88.
--*idem*, 1794, I, 137.
*Saumon*, 1795, II, 250.
*Saumure* pour conserver les criardes, 1792, II, 410.
*Saur craute*, voyez *Turneps*, 1795, II.
*Sausse* blanche : moyen d'en faire une bonne sans beurre, 1786, II, 213.
*Sauvages* : observations sur ces peuples, 1788, II, 319.
*Savon*, 1795, II, 290.
--ne doit pas être employé pour blanchir les étoffes de soie où il y a de l'or, 1787, II, 310.
--fait avec des graisses animales, 1791, I, 373.
--eau de Savon conseillée pour arroser les arbres, 1792, I, 306.
--procédé pour le faire, 1795, I, 414.
--moyen de reconnoître s'il est falsifié, 1795, I, 417.
*Scarabées* : moyen de les détruire, 1787, I, 167.
*Scarole*, voyez *Endive*, 1795, II.

*Schorl*, voyez *Granit*, 1795, II.
*Sciatique* : remède employé contre cette maladie, 1783, I, 302.
--*idem*, 1788, I, 251.
*Scorbut*, 1782, I, 246.
--des moutons, 1787, I, 185.
--des gencives, 1788, II, 353.
*Scories* : peuvent servir pour amender les terres humides, 1790, II, 21.
*Scorsonère*, 1795, II, 50.
*Secrets* de toute espèce, 1786, I, 411.
--merveilleux pour féconder les terres, 1788, I, 430.
*Sidération* des grains, 1793, I, 164.
*Seigle*, 1795, II, 196.
*Seigles* ravagés par la grêle, 1789, I, 133.
--sa culture dans le Hainault, 1791, I, 59.
--avantage de le mêler avec du froment pour faire du pain, 1792, II, 406.
--vient dans toutes les espèces de terres, 1793, I, 238.
--de Lombardie : cause de leur insalubrité, 1793, I, 94.
*Sel*, 1795, II, 97.
--employé en engrais, 1791, II, 431.
--sont-ils nécessaires pour fertiliser les terres? 1791, I, 166.
--marin, peut servir à préparer les semences, 1786, II, 30.
--ammoniac et de glauber : moyens de les faire, 1786, II, 390-389.
--végétal acéteux : moyen de le faire, 1783, I, 378.

*Sel* de glauber retiré du vieux bois, 1785, I, 386.
--alkali, empêche le lait de s'aigrir, 1786, I, 189.
--d'epsom retiré d'une terre, 1786, I, 243.
--marin donné aux moutons : ses inconvéniens, 1786, II, 158.
--sedelitz naturel et natif, 1786, II, 333.
--sédatif : son analyse, 1787, I, 338.
--utile aux moutons, 1788, II, 112.
--mêlange conseillé pour économiser le sel, 1788, II, 117.
--froid et glace produits par le mêlange de Sels, 1789, II, 375.
*Sélénite*, voyez *Pierre à plâtre*, 1795, II.
*Selle* de cheval : remarques sur son emploi, 1791, I, 205 *et suiv.*
*Sellier-carrossier* (tromperie de), 1788, I, 274.
*Semailles* : utilité de les hâter en automne, 1795, I, 18.
--leur temps convenable indiqué par l'arrivée des oiseaux, 1792, I, 34.
--avis sur les Semailles, 1793, I, 227-252 *et suiv.*
*Semences* (instruction sur la juste proportion des), 1795, I, 8.
--préparation simple des Semences, 1782, I, 367.
--manière de l'économiser, 1786, I, 10.
--différentes manières pour les préparer, 1786, I, 24 *et suiv.*
--quelle quantité de grains on doit semer suivant les terres, 1786, II, 58 *et suiv.*

*Semences* : expériences sur la quantité de Semences à employer par arpent, 1787, I, 24 *et suiv.*
--*idem*, 1787, II, 41 *et suiv.*
--moyen d'empêcher celles qu'on sème d'être détruites par les insectes, 1788, I, 173.
--quantité qu'il convient d'en répandre, 1788, II, 117.
--répandues en trop grande quantité en Dauphiné, 1788, II, 20.
--moyen de distinguer les bonnes avec de l'eau, 1789, II, 31.
--quantité qu'il faut employer par arpent, 1790, I, 35.
--*idem*, 1791, II, 56-58.
--détails sur différentes qualités de grains, 1791, II, 54.
--détails sur la manière de semer les grains et leurs produits, 1792, II, 70-55-95-61.
--renouvellement des Semences, 1793, I, 251.
*Semer*: différentes observations sur cette opération, 1786, I, 2 *et suiv.*
--clair : inconvénient, 1787, II, 45 et 47.
--manière particulière de Semer, 1788, I, 14.
*Semis*: attention pour les faire réussir, 1786, I, 90 *et suiv.*
--de glands, 1793, I, 382.
--de pommes de terre : manière de les faire, 1787, I, 52.
--de navets détruits par les tiquets : moyen de les préserver, 1790, II, 196.
--en terrines, 1791, II, 174 *et suiv.*
*Semoir* nouveau, 1788, I, 1.

*Seneçon*, voyez *Bacchante*, 1795, II.
*Senevé*, 1795, II, 178.
*Senlis* : agriculture de ses environs, 1790, I, 60.
--*idem*, 1792, II, 125.
*Sens* : agriculture de ses environs, 1790, I, 73.
--culture des terres de ses environs, 1792, II, 137.
*Sensations* différentes de l'état physique des corps, 1788, I, 327.
*Sentences* économiques, 1791, II, 227-239.
*Sep* ou talon de charrue en fer : ses avantages, 1792, II, 8.
*Seransage* du chanvre : observations sur les moyens de prévenir les maladies auxquelles sont exposés les seranseurs, 1795, I, 313.
*Seré* : espèce de vinaigre fait avec le lait, 1786, I, 194.
*Seringues* à lavement pour les chevaux, 1791, II, 199.
*Sarment* de la vigne, employé pour nourrir les bestiaux, 1788, I, 49.
*Serpette*, 1795, II, 121.
*Serpolet*, 1795, II, 183.
*Serres* : moyen de les chauffer sans combustibles, 1787, II, 266.
--remarques sur leur position, 1794, I, 195.
*Serrures* de comparaison, 1786, I, 396.
--à secret, 1786, II, 418.
*Sersifis*, voyez *Salsifis*, 1795, II.
*Sève* : ce que c'est, 1793, I, 110.
--quand elle cesse de monter dans les plantes, la gelée leur fait peu de tort, 1793, I, 221.

*Sexes* des plantes, 1787, II, 332.
*Silex*, 1795, II, 93.
*Sillons* larges et profonds appellés maîtres, 1791, I, 23.
—— quelle direction il faut leur donner, 1792, I, 20.
*Silvie*, 1795, II, 140.
*Similor*, voyez *Cuivre*, 1795, II.
*Singes* attaqués de gale et de dartres, 1788, I, 327.
—sujets à la petite-vérole et à la rougeole, 1792, I, 368 *et suiv.*
*Soc* à deux pointes, 1793, I, 87.
*Soie* : conduite pour se procurer deux récoltes par an, 1786, I, 130.
—*idem*, 1786, II, 172.
—retirée de l'écorce du mûrier, 1786, II, 174.
—inférieures, employées à faire de belles étoffes, 1786, II, 417.
—manière de la décreuser, 1787, I, 390.
—on en peut faire deux récoltes dans une année, 1791, I, 134.
*Soins* économiques : proverbes sur ces objets, 1791, II, 227.
*Sol* : moyen de déterminer son élévation, 1788, I, 333.
—glaiseux : comment on doit le fumer pour être ensemencé, 1790, II, 11.
—de France préférable à celui d'Angleterre, 1794, I, 47.
*Soldats* : avis sur les moyens de s'assurer de leur sort, 1788, II, 400.
*Soleil* : son action sur les bleds mouillés les rouille, 1787, I, 39.

*Soleil* préjudiciable à la germination, 1787, II, 331.
—effet d'un coup de Soleil, 1787, II, 368.
—son cours doit être considéré relativement à la culture, 1793, I, 3.
*Sologne* : cours de ses moissons, 1794, I, 20.
*Son* employé à démoucheter le bled, 1786, II, 195-198.
—peut être mis dans le pain en petite quantité, 1792, II, 406.
*Sondes* flexibles, 1786, I, 334.
—*idem*, leur usage, 1789, II, 434.
*Songes* : leurs causes et effets, 1789, II, 304.
*Sons* : servent à prévoir le temps, 1792, I, 384.
*Sorbier*, voyez *Cormier*, 1795, II.
*Sorgho*, 1795, II, 262.
*Soude* : rapport sur sa fabrication, 1795, I, 395.
—manière de l'employer dans le blanchissage, 1795, I, 411.
—*idem*, 1795, II, 290.
—peut se substituer à la cendre pour laver les grains, 1786, II, 24.
—d'Alicante : moyen d'en obtenir beaucoup de crystaux, 1791, I, 393.
*Soufflet* conseillé pour rétablir la respiration, 1790, I, 294.
*Soufre*, 1795, II, 81.
—*idem*, voyez *Rhubarbe*, *Oignon*, *Ail*, 1795, II.
—contenu dans la racine de patience, 1782, I, 368 *et suiv.*

*Soufre* : ses effets sur le corps humain, 1784, I, 273-276.
—employé pour éteindre le feu d'une cheminée, 1786, I, 229.
—végétal ou lycopodium : ses effets contre la sueur, 1786, I, 223.
—doré d'antimoine, 1786, II, 389.
—employé pour préserver les grains d'être mangés par les insectes, 1792, II, 351.
—*végétal*, voyez *Mousse*, 1795, II.
*Soufrer* les vins, 1785, I, 138.
*Souliers* faciles à faire et peu coûteux, 1788, II, 241.
—différens avis et observations sur les Souliers, 1792, I, 411 *et suiv.*
—leurs défauts et les maux qu'ils occasionnent, 1792, II, 417.
*Soupape* hydraulique, 1782, I, 234.
*Soupe* économique, 1795, I, 270.
—au riz et aux pommes de terre, 1787, I, 212.
—pour les pauvres, 1787, II, 197.
—*idem*, 1790, I, 245.
*Sources* d'eau : moyen de les découvrir, 1794, I, 268 *et suiv.*
*Souris* : recette pour les faire périr, 1786, II, 291.
—*idem*, 1787, II, 180.
*Soye* ou soyon : maladie des cochons, 1792, II, 375.
*Spergules* : sa culture, 1791, I, 68.
—donné comme fourrage, 1794, I, 137.
*Squelettes* de poissons et de plantes dans les ardoises, 1787, I, 297.
*Statice*, 1795, II, 176.
*Stigmate*, 1795, II, 291.

*Sublimé-corrosif* employé dans le traitement du farcin des chevaux, 1790, II, 221.
*Suc* de raisin épaissi, conseillé pour faire du vin, 1789, II, 190.
*Suc* gastrique, annoncé comme remède, 1787, I, 319.
*Succès* des fermes, dépend de la manière dont on tient registre de leur culture, 1790, I, 1.
*Successions* : avis sur les Successions non-réclamées, 1788, II, 399.
—de culture, 1790, II, 89 *et suiv.*
*Succin* : son origine, 1787, I, 295.
—*idem*, voyez *Ambre jaune*, 1795, II.
*Sucre* (analyse du), 1787, I, 339.
—ajouté au vin pour qu'il rende de l'eau-de-vie, 1787, II, 196.
—employé comme remède sur les blessures, 1791, I, 225.
—*idem*, voyez *Erable*, 1795, II.
—*noir*, voyez *Réglisse*, 1795, II.
*Sucreries* : méthode nouvelle pour traiter les cannes à sucre, 1786, II, 415.
*Sucrion*, 1795, II, 252.
*Suédoises* : loi qui impose une amende à celui qui sème de mauvaises graines, 1793, I, 95.
*Sueur* des mains : moyen de l'empêcher de gâter les ouvrages, 1786, I, 223.
—moyen de la provoquer, 1793, I, 435.
*Suisse* : culture de ce pays, 1791, II, 66.
*Sulla* ou scil'a : sainfoin d'Espagne comme fourrage, 1794, I, 136.
*Sumac* : sa culture et la préparation de ses feuilles, 1791, I, 115.

*Sumac* : observations sur sa culture, 1795, I, 135.
*Suppositoires* : soins de leur application, 1790, II, 410.
*Sureau*, 1795, II, 189.
*Surelle*, voyez *Oseille*, 1795, II.
*Surgeon*, voyez *Marcotte*, 1795, II.
*Surpeau* des arbres, doit être enlevée, 1794, I, 191.
*Suie* : manière de la faire tomber des cheminées, 1784, I, 384.
—employée pour le mêlange des terres, 1793, I, 49.
*Sympathie*, 1789, II, 269.
*Symphise* (lettre sur l'opération de la), 1785, I, 281.
*Syphilitique* (remède éprouvé contre le vice), 1785, I, 312.
*Syphons* à l'usage de l'agriculture, 1782, I, 205.
*Syrops* magistral ou de Calabre, 1783, I, 310.
—excellent, 1785, I, 364.
—purgatif, 1788, II, 359.
—de fruits : manière de les faire, 1792, I, 460.

## T.

*Tabac*, 1795, II, 206.
—sa culture en Virginie ; sa récolte, 1791, I, 412-423.
—danger de conserver le Tabac dans le plomb, 1783, I, 266.
—sa culture et sa récolte, 1792, I, 107.

*Table* de santé : continuer les moyens de servir soi-même en santé et en maladie, 1786, I, 370.
*Tableaux* : moyens de les garantir des injures du temps, 1785, I, 379.
—représentant de beaux enfans, doivent être regardés par les mères qui veulent avoir de beaux enfans, 1786, I, 224.
—vieux : procédé pour les enlever de dessus les vieilles toiles, 1787, I, 379.
—procédé pour en multiplier les copies, 1790, I, ....
—qui donne l'idée d'un journal des travaux d'une ferme, 1791, II, ....
—de velours, 1791, II, ....
*Tac* : maladie des moutons, 1788, II, 172.
*Taches* : recette pour ôter les Taches de boue sur les draps écarlates, 1785, I, 391.
—de fruits sur le linge : moyen de les enlever, 1787, I, 226.
—moyen d'enlever les taches, 1789, II, 285.
—d'encre : moyen de les enlever, 1790, I, 325.
—mobiles dans les yeux, 1791, I, 362.
*Tacon* : maladie du safran, 1787, II, 342.
*Tagette*, 1795, II, 260.
*Taille* de mûriers blancs, 1787, I, 161.
—observations sur la Taille des arbres, 1789, II, 131 *et suiv.*
—prétendu moyen de la redresser, 1791, II, 428.
*Taillis* : moyen d'accélérer leurs recrues, 1791, I, 109.

*Taillis* :

*Taillis* : moyen de connoître le plus haut point de son accroissement, 1792, I, 257.
*Talc* (faux), voyez *Pierre à plâtre*, 1795, II.
—à substituer au savon pour faciliter les frottemens, 1786, II, 406.
*Talons* de souliers : comment ils doivent être faits, 1792, I, 412.
*Tambours* aux portes des maisons et des appartemens pour les tenir chauds, 1786, II, 230.
*Tan*, voyez *Chêne*, *Bruyère*, *Marseau*, *Grenade*, *Cormier*, *Bouleau*, *Aulne*, *Mélèse*, *Myrte*, 1795, II.
—des arbres cariés : procédé pour le convertir en alkali fixe, 1783, I, 377.
*Tanche*, 1795, II, 192.
*Tannage*, 1795, II, 291.
*Tanneries* : décoction de différentes plantes employée pour tanner les peaux d'animaux, 1789, I, 337.
—l'air des Tanneries n'est pas malfaisant, 1789, II, 292.
*Tapisseries* fines : procédé pour faire revivre leurs couleurs, 1788, I, 264.
*Tapissiers* (tromperies des), 1788, I, 277.
*Tarare*, voyez *Crible*, 1795, II.
—ou tatare : nouvelle espèce de crible, 1788, I, 26.
*Taraspi*, voyez *Thlaspi*, 1795, II.
*Tarentule* : observation sur le venin de cet animal, 1789, II, 344.
*Tartre*, voyez *Raisin*, 1795, II.
—stibié ou émétique : procédé pour le faire, 1785, I, 384.

*Tartre* stibié ou émétique entre les mains des gens de l'art, est employé avec succès, 1788, I, 272.
—vitriolé : méthode pour extraire celui qui se trouve dans l'alkali végétal, 1784, I, 390.
*Taupes* : histoire de cet animal, 1791, I, 109.
—moyen pour les détruire, 1783, I, 174.
—*idem*, 1787, I, 165.
—*idem*, 1788, I, 174.
—*idem*, 1790, I, 193.
—*idem*, 1791, I, 183.
—art du taupier, 1791, I, 153.
—moyen de les détruire, 1794, I, 220.
*Taureau* venant sur l'homme : moyen de l'éloigner, 1788, I, 282.
—à l'engrais : ce qu'il dépense, et produit, 1792, II, 241.
*Tazette*, voyez *Narcisse*, 1795, II.
*Teigne* : remède contre cette maladie, 1782, I, 273.
—*idem*, 1783, I, 295.
*Télescopes* perfectionnés par Herschel, 1786, I, 352.
—composition propre à faire les vernis de cet instrument, 1790, II, 422.
*Teinture* de gayac contre la goutte, est quelquefois nuisible, 1788, II, 282.
—de cantharides : ses bons effets, 1788, II, 348.
—écarlate : nouvelle préparation, 1786, II, 417.
—fruits de la christophariane substitués à la cochenille, 1786, II, 388.
—en gris sur soie, 1787, I, 382.

*Teinture* en violet sur coton, 1787, I, 389.
—d'étoffes avec le santal, 1791, II, 413.
*Tempéramens* (régime selon les divers), 1783, I, 238.
—fort : avis à ceux qui ont ce tempérament, 1786, I, 302.
*Température* froide après les brouillards, cause la rouille des bleds, 1787, I, 39.
—de l'athmosphère : ses causes, 1787, I, 272.
*Temps* de l'année, et lieux où l'air est le plus sain, 1787, I, 266 *et suiv.*
—instrument pour indiquer le Temps qu'il fera, 1783, I, 188.
—moyen de le prévoir, 1792, I, 368.
—ses changemens annoncés par les animaux, 1793, I, 323-330.
*Termes* ou termites : insectes destructeurs ; observations sur leur manière de vivre, 1783, I, 314.
*Termonde* : canton de Flandre ; son agricul-. ture, 1791, I, 58.
*Terre à foulon*, voyez *Argille*, 1795, II.
—*à touffe*, voyez *Topinambour*, 1795, II.
—*grasse*, voyez *Argille*, 1795, II.
—*sigillée*, *idem*, 1795, II.
—végétale, 1795, II, 85.
—qu'on vient de semer : utilité de la battre, 1786, I, 97.
—dont on peut retirer du sel d'epsom, 1786, I, 243.
—reconnue en mer à 250 lieues d'elle, 1786, I, 386.
—mauvaise : moyen d'en tirer parti, 1786, I, 71.

*Terre* argilleuse pour nettoyer le bled, 1786, II, 194.
—foliée de tartre, 1786, II, 389.
—peut servir à faire des bâtimens solides : manière de l'employer, 1787, I, 237.
—fortes : diverses réflexions sur ces sortes de Terres, 1787, I, 3-62 *et suiv.*
—humides : manière de les cultiver, 1788, II, 6.
—très-arides : manière de les cultiver, 1788, II, 11.
—voyage pour la connoissance du globe de la Terre, 1789, I, 256.
—glaise, conseillée comme amendement, 1789, II, 33.
—couvertes de neige : doit-on passer dessus le rouleau lorsqu'elles sont ensemencées ? 1790, I, 202.
—en labour : avantage de les diminuer, 1790, I, 215.
—observations sur l'exploitation des Terres, 1790, II, 246 *et suiv.*
—sa fertilité est-elle due à des sels ? 1791, I, 166.
—améliorées en y brûlant des fougères, 1794, I, 81.
—ferrugineuses, propres à l'agriculture, 1793, I, 11.
—diverses Terres employées comme amendemens, 1791, I, 18.
—de bruyère : moyens de les mettre en rapport, 1791, I, 100.
—de bruyère : préférence qu'elle mérite dans quelques cas, 1791, II, 166.
—nature, propriétés et usage de la Terre de bruyère, 1791, II, 167 *et suiv.*

*Terre* franche, désigne une Terre marneuse, 1791, II, 60.
—il faut tirer profit de celles qu'on a, 1791, II, 14.
—de différentes espèces, employées comme amendemens, 1791, II, 25 *et suiv.*
—observations sur diverses espèces de Terres, 1791, II, 44-52-246-250.
—*idem*, 1792, II, 111-118-331-398-395-329.
—observations sur l'emploi de la Terre enlevée par l'eau d'un fossé, 1793, I, 55.
—rouge mêlée d'argille, 1793, I, 31.
—ses qualités pour être bonne, 1793, I, 16 et 17.
—époques auxquelles il faut les ensemencer, 1793, I, 330 *et suiv.*
—imprégnées d'acides, 1793, I, 11 *et suiv.*
—factices proposées pour engrais, 1793, I, 115.
—propres à mettre en labour, 1793, I, 3.
—leur bonne culture rend le campagnard heureux, 1793, I, 9.
—de moyen rapport, 1793, I, 26.
—de joncs, 1793, I, 29.
*Terreau* de voiries : ses effets, 1783, II, 126.
—ou humus, 1793, I, 16.
*Terrein* : moyens de dessécher les Terreins inondés, 1789, II, 70.
—*idem*, 1790, I, 121.
—mort : mauvaise terre ; moyen de l'améliorer, 1786, II, 13.
—en pente : leur meilleur emploi, 1788, II, 160.
—mauvais, planté en sumac, 1791, I, 115.

*Terreins* bas humides : nécessité de les égoutter, 1792, I, 326.
—avis sur le choix des Terreins, 1793, I, 2 et 5.
*Terreurs* paniques, 1789, II, 276.
—répandues sans fondement, 1790, II, 307-367-269.
*Terroirs* : diverses observations sur les espèces de Terroirs, 1793, I, 16-19 *et suiv.*
—observations sur leurs qualités, 1794, I, 33-48.
*Tetanos* : remède contre cette maladie, 1788, I, 356.
*Thé d'Europe*, voyez *Véronique*, 1795, II.
*Thermomètre*, 1795, II, 292.
—pour les plus hauts degrés de chaleur, 1788, I, 372.
—n'indique pas toujours la température exactement, 1788, I, 327.
*Thlaspi*, 1795, II, 121.
*Thon*, 1795, II, 138.
*Thrips* : insecte qui attaque les œillets, 1792, II, 469.
*Thym*, 1795, II, 193.
*Thymélée*, 1795, II, 121.
*Tigres* : insecte qui ravage les prairies; manière de les détruire, 1782, I, 370.
*Tilleul*, 1795, II, 190.
*Tiquets* : insecte qui attaque les navets; moyen de les détruire, 1786, II, 109 *et suiv.*
—*idem*, 1787, I, 45.
—moyen de les éloigner des semis de navets, 1790, II, 106.
*Tisanne* dépuratoire, 1789, I, 301.

*Taenia* ou ver solitaire (traitement contre le), 1785, I, 314.
—*idem*, 1786, I, 314.
*Toiles* (blanchissement des), 1788, I, 413.
—huilées, prennent feu, 1786, I, 231.
—imbibe moins l'humidité que la laine, 1789, II, 209.
—d'araignées qu'on croit voir dans ses yeux, 1791, I, 362.
—manière de les blanchir avec l'acide muriatique, 1792, I, 465.
—d'araignées, conservées mal-à-propos dans les écuries, 1792, II, 236.
*Toise* invariable, 1793, I, 455.
*Toits* en briques creuses, 1788, I, 260.
*Tôle*, voyez *Fer*, 1795, II.
*Tomate*, 1795, II, 43.
*Tonneau*, 1795, II, 44.
*Tonneaux* : précautions à prendre en les remplissant et les bondonnant, 1787, II, 157.
—dans quelles circonstances il faut les laisser débondonnés, 1789, II, 123-127.
*Tonnerre* : moyen d'en préserver les bâtimens, 1786, I, 233.
*Tonnerre* : agriculture de ses environs, 1790, I, 78.
—*idem*, 1792, II, 143.
*Tonte* : voyez *Belier*, 1795, II.
*Tonture* des arbres employés à nourrir les bestiaux, 1786, II, 81.
*Topazes* factices, 1787, I, 364.
*Topinambour*, 1795, II, 52.
—conseils pour sa culture, 1789, I, 59.
*Tortelle*, voyez *Velar*, 1795, II.
*Tortue* de terre, ne mange pas l'hiver, 1787, I, 283.

*Tortue* de mer, 1789, II, 338.
*Toucher* (le) ne fait pas toujours juger de la température d'un corps, 1788, I, 327.
*Tour* nouveau pour les ouvrages profilés, 1794, I, 417.
*Tourailles* : étuves pour sécher le houblon, 1792, II, 200.
*Tourbe*, 1795, II, 78.
*Tourbes* à brûler : manière de s'en servir pour échauffer les appartemens, 1786, I, 204.
—avantage de l'employer dans les travaux des arts, 1786, I, 205.
—sujette à prendre feu par la fermentation, 1786, I, 241.
—réduites en charbon, 1786, I, 395.
—employées à différens usages, 1786, II, 282 *et suiv.*
—ses usages et ses avantages, 1787, II, 258 *et suiv.*
—ses avantages comme engrais, 1788, I, 6.
—employée comme engrais, 1789, I, 12.
*Tourbes* (amas de) s'enflamment spontanément, 1789, II, 249.
—en poudre, éloigne les vers blancs, 1790, II, 209.
—employée à augmenter le fumier, 1791, II, 44.
—utile dans les fumiers, 1792, I, 115.
*Toureau*, 1795, II, 113.
*Tournesol*, 1795, II, 34.
—divers usages de cette plante, 1785, I, 129.
—sa culture et ses produits, 1790, I, 114-117.

*Tournı* : maladie des moutons; remède contre, 1787, I, 185.
*Touroir*, 1795, II, 292.
*Tourraine* : qualité de son sol, 1794, I, 40.
*Tourzelle*, voyez *Bled*, 1795, II.
*Toux* : observations sur les Toux sèches; moyen de les guérir, 1784, I, 295.
—convulsive, guérie par l'eau de Luce, 1786, II, 373.
*Toxicodendron* : plante dont le suc est vénéneux, 1786, II, 314.
*Tracante* (plante), 1795, II, 293.
*Traînasse*, 1795, II, 122.
*Traîneau*, 1795, II, 125.
—pour exempter d'enrayer à la manière ordinaire, 1788, II, 348.
*Traîner* la herse sur les bleds levés, 1789, II, 20 et 21.
*Traitemens* nouveaux ou renouvellés : remarques à ce sujet, 1786, II, 369.
*Tranchées* couvertes conseillées pour égoutter les terres, 1790, I, 121.
*Tranchées* : maladie des moutons; remède contre, 1787, I, 181.
—des chevaux : remède contre, 1782, I, 290.
*Transfusion* du sang : essai nouveau, 1786, I, 299.
*Transpiration* (observations sur la), 1792, I, 403.
*Transplanter* : moyen de le faire sans démotter les plantes, 1792, I, 304.
*Transplantoir* : instrument de jardinage, 1792, I, 304.

*Trèfle*, 1795, II, 180.
*Trèfles* : sa culture, 1787, II, 99.
—sa récolte, 1788, II, 76.
—différentes observations sur cette plante et sur sa culture, 1789, I, 71 *et suiv.*
—sa culture : manière de faire sécher cette plante, 1790, I, 47-84.
—avantage d'en semer avec tous les grains, 1790, I, 124.
—ne contient pas de sel qui améliore les terres, 1790, I, 205.
sa graine propre à la teinture, 1790, II, 419
—semé avec l'orge pour préparer une terre, 1794, I, 22.
—observations sur sa culture et ses produits, 1792, II, 148 *et suiv.*
—semé avec l'avoine : inconvénient de cette pratique, 1791, I, 44.
—sa culture dans le Hainault, 1791, I, 60.
—observations et avis sur l'usage et la culture de cette plante, 1790, II, 55 *et suiv.*
*Treillages* vieux, peints en blanc et en verd, ne doivent pas être brûlés dans les fours où l'on cuit les alimens, 1787, I, 257.
*Tremblemens* de terre de Bourgogne, n'ont pas altéré la santé des hommes, 1786, I, 298.
—leur analogie avec les phénomènes électriques, 1789, II, 379.
*Tremmeine* : trèfle de Hollande, 1789, I, 71.

*Trépan* : opération du Trépan peut être remplacée par une autre, 1786, I, 333.
*Tricot* pluché anglois, convient aux goutteux, 1792, I, 483.
*Troêne*, 1795, II, 127.
*Tromperie*, 1788, II, 290.
—*idem*, 1790, II, 380 *et suiv.*
*Troupeaux* (mémoire sur le régime nécessaire aux), 1782, I, 21.
—aux champs : conduite que doit tenir le berger, 1794, I, 257.
*Truffe*, 1795, II, 75.
*Truie*, voyez *Cochon*, 1795, II.
*Truite*, 1795, II, 257.
*Tschutski* : nation asiatique ; sa description, 1789, II, 327.
*Tubéreuse*, 1795, II, 251.
*Tubercule*, 1795, II, 293.
*Tue-chien* : plante vénéneuse appellée aussi colchique, 1791, I, 164.
—*idem*, voyez *Colchique*, 1795, II.
*Tuf*, 1793, I, 18.
*Tuiles* : nouvelle tuile pour couvrir les maisons, 1787, II, 292.
*Tulipe*, 1795, II, 143.
*Tull* : absurdité de son principe sur les labours, 1793, I, 82.
*Tumeurs* enkistées : procédé pour les guérir, 1783, I, 301.
*Turcs* : espèce de hanneton, 1786, I, 104.
*Turlibé* ou betterave, 1787, II, 58.
*Turneps*, 1795, II, 60.
—différentes observations et avis sur la culture de cette plante, 1786, II, 92 *et suiv.*

*Turneps* : avantages qu'on en retire en Poitou, 1786, II, 124.
—leur culture dans des terres où on a récolté des maïs, 1787, II, 56 *et suiv.*
—observations sur leur culture, 1787, I, 45-52.
—*idem*, 1789, I, 66.
*Tussilage*, 1795, II, 126.

## U.

*Ulcères* (remède contre les), 1783, I, 276-281.
—au sein : remède contre, 1784, I, 315.
—aux jambes : remède, 1786, I, 329.
—remède contre, 1788, I, 367.
—aux yeux des bêtes à cornes : remède, 1790, I, 210.
—chez les animaux : remède, 1790, II, 237.
—putrides : leur traitement, 1787, I, 325.
*Urines* employées comme engrais, 1784, I, 90.
—secours contre la rétention, 1789, I, 307.
—de vache, employées comme engrais, 1790, I, 15 *et suiv.*
*Ustensiles* de cuisine : étamage propre à les enduire, 1784, I, 383.
—plaqués d'or ou d'argent : cas où ils sont dangereux, 1792, I, 398.

## V.

*Vache*, 1795, II, 117.
*Vaches* : observations sur la manière de les nourrir, 1786, II, 137 *et suiv.*
—harnois pour les empêcher de dévaster les bois, 1786, II, 140.
—manière de les gouverner, 1787, I, 99 *et suiv.*
—détails sur les endroits où elles doivent être nourries, 1788, I, 75.
—dont le veau est mort : moyen de l'engager à cesser de terrer, 1788, II, 126.
—blessée : sa guérison, 1788, II, 173.
—dans quels cas elles sont plus profitables ; soins à leur donner, 1789, II, 83-89 *et suiv.*
—soins que les Anglois ont de ces animaux, 1790, I, 134.
—à l'engrais : quantité de nourriture qu'il leur faut, 1790, I, 138.
—qui vèlent : soins à leur donner, 1790, II, 105.
—diverses observations sur les Vaches, 1790, II, 108 *et suiv.*
—manière d'élever des genisses, 1790, II, 107 *et suiv.*
—avantages de l'usage de leur fumier, 1791, I, 9.
—à lait : manière de les nourrir, 1791, I, 91-92.
—profits de les châtrer, 1791, I, 94.
—à l'engrais : dépenses qu'elles occasionnent ; leurs produits, 1792, II, 241.

*Vaisseaux* d'étain : observations sur leur usage, 1789, I, 204 *et suiv.*
—de cuivre : danger de les employer pour y conserver des alimens, 1790, II, 294 *et suiv.*
—*idem*, 1791, I, 315.
—moyen pour les empêcher de couler à fond, 1784, I, 397.
—reconnus en mer à 250 lieues de l'observateur, 1785, I, 386.
—moyen pour retarder leurs mouvemens, 1788, II, 368.
—air des Vaisseaux de l'entre-pont cause l'asphixie, 1792, I, 436.
*Vaisselle* d'étain : précautions à prendre pour son usage, 1784, I, 382.
—plaquée d'argent, 1789, I, 334.
*Vallées* du district de Montagne : leur culture, 1794, I, 18.
*Valériane*, 1795, II, 177.
*Valenciennes* : cours de ses moissons, 1794, I, 3.
*Van*, 1795, II, 96.
*Vapeurs* des cuves en fermentation, 1784, I, 215.
—affections vaporeuses guéries sans retour, 1786, I, 318.
—état vaporeux dans l'âge de retour, 1786, I, 307.
—topique pour les guérir, 1786, I, 397.
—de l'eau bouillante : moyen de connoître sa chaleur, 1787, II, 351.
—qui causent l'asphixie, 1791, I, 326.
—des femmes, 1791, I, 295.
*Variété*, voyez *Espèce*, 1795, II.

*Vase* d'étang : excellent engrais, 1791, I, 18.
—*idem*, 1791, II, 27-28.
—de la mer, 1793, I, 29.
*Veaux* : moyen de les élever sans lait, 1795, I, 342.
—*idem*, 1794, I, 309.
—manière de les élever sans lait, 1784, I, 348.
—attaqués de colique : traitement de la maladie, 1786, I, 156.
—manière de les gouverner, 1787, I, 114 *et suiv.*
—manière de les élever, 1787, II, 111.
—manière d'élever ceux qu'on estime à devenir genisse, 1788, I, 122.
—quels sont les meilleurs à élever : manière de les élever, 1790, II, 103-105.
—manière de les élever sans laitage, 1792, I, 199.
—pâtée pour les nourrir, 1792, II, 263.
*Végétation* : elle semble accompagnée de chaleur, 1786, I, 300.
—n'est point hâtée par l'électricité, 1787, II, 357.
—*idem*, 1788, I, 342.
—eau de Végétation : ses dangers dans le pain, 1793, I, 205.
*Végétaux*, rendent différentes espèces d'air, 1781, I, 263 *et suiv.*
—leur analogie avec les animaux, 1787, II, 332.
—l'homme peut vivre de Végétaux, 1789, I, 293.
—propres au fumier, 1793, I, 111.
—essai pour naturaliser plusieurs Végétaux, 1795, I, 143.

*Velar*, 1795, II, 133.
*Velay* : sa culture, 1794, I, 18.
*Vendanges* : temps où il faut les faire, 1794, I, 312.
*Venel* : sa machine hydraulique, 1793, I, 443.
*Vents* : sa vitesse, 1787, I, 276.
—d'ouest, régulier à Paris, 1789, II, 321.
—servent à prévoir le temps prochain, 1792, I, 377.
—leurs effets utiles sur les arbres, 1793, I, 361.
—considérés relativement aux terreins cultivés, 1793, I, 3.
*Vers* : remède contre les Vers des moutons, 1782, I, 284.
—appellés mocres : moyen de les détruire, 1784, I, 97.
—dans les pois, 1785, I, 141.
—solitaire (remède contre le), 1785, I, 314.
—*idem*, 1785, I, 321 *et suiv.*
—*idem*, 1786, I, 314.
—solitaire dans une chenille, 1786, I, 253.
—du corps humain : remède contre, 1786, I, 314.
—du hanneton, 1786, I, 104 *et suiv.*
—moyen d'en garantir les lits de plume et matelas, 1786, II, 292.
—préjudiciable aux prairies, 1786, II, 186.
—du hanneton : moyen de les détruire, 1787, I, 167.
—de terre : moyen de les détruire, 1788, I, 174.

*Vers* qui attaquent l'avoine, 1788, II, 325.
—du terreau : moyen de le détruire, 1789, II, 159.
—blanc : ses dégâts ; manière de les arrêter, 1790, II, 200 *et suiv.*
—de charogne : nourriture des perdreaux, 1791, II, 131.
—luisant : histoire de cet insecte, 1786, I, 254.
*Ver-à-soie*, 1795, II, 171.
*Vers-à-soie* (expériences et observations sur les), 1791, I, 134 *et suiv.*
—moyen de les nourrir avec des feuilles sèches, 1790, II, 140-145-152.
—moyen d'étouffer les chrysalides, 1790, I, 166.
—manuel pour leur éducation, 1782, I, 91.
—moyen d'étouffer la chrysalide, 1784, I, 368.
—manière de tirer parti de la coque, 1784, I, 369.
—manière pour en obtenir deux récoltes, 1786, I, 130.
—manière de travailler leurs cocons, 1786, II, 417.
—moyen de diminuer leur mortalité, 1787, I, 166.
—moyen de faire périr sa chrysalide, 1787, II, 179.
—leur éducation, 1788, I, 131 - 140 *et suiv.*
—(chaulage des), 1788, II, 133.
—qui donne deux récoltes par an, 1789, II, 108.

*Verd* : procédé pour avoir une belle couleur verte, 1785, I, 388.
—pour la peinture et l'impression, 1786, I, 349.
—*idem*, 1786, II, 386.
—distillé : procédé pour le faire, 1787, II, 372.
—*de gris* : remède contre ses effets, 1785, I, 307.
—procédé pour le faire, 1787, II, 372.
—*idem*, voyez *Cuivre*, *Raisin*, 1795, II.
—*de-vessie*, voyez *Alaterne*, *Nerprun*, 1795, II.
*Verdelets* : raisins qui ne sont pas mûrs, 1786, II, 163.
*Verge-d'or*, 1795, II, 264.
*Verjus* : son usage, 1786, II, 163.
—manière de préparer un extrait pour remplacer le suc de Verjus, 1795, I, 284.
*Vermichelle*, voyez *Bled*, 1795, II.
*Verne*, voyez *Aulne*, 1795, II.
*Vernis* : recette d'un Vernis pour dorer le bois et le plâtre, 1785, I, 373 *et suiv.*
—pour le fer, 1787, I, 392.
*Véronique*, 1795, II, 199.
*Verrat*, voyez *Cochon*, 1795, II.
*Verre* (moyen de graver sur), 1790, II, 421.
—pour souder les métaux, 1787, II, 370.
—procédé pour en faire un parfait, 1788, I, 371.
—peinture sur Verre, 1788, I, 424.
—où il n'entre point de substances salines, 1788, II, 361.
—manière de le couper avec des ciseaux, 1788, II, 255.

*Verre* cassé spontanément, 1789, II, 382.
—pour la conservation de la vue, 1791, II, 397.
—colorés employés en lunettes, 1792, I, 448.
*Verrues* (remède contre les), 1783, I, 302.
*Vertige* de chevaux : traitement de cette maladie, 1795, I, 340.
—des moutons : sa cause, 1786, I, 151 *et suiv.*
—*idem*, remède, 1787, I, 185.
*Verveine*, 1795, II, 193.
*Vesce*, 1705, II, 212.
—moyen de préserver cette graine des insectes, 1787, I, 220.
—de Sibérie : sa culture, 1789, II, 38-41.
—sa culture en Angleterre, 1791, I, 37.
—sa culture, 1792, I, 41.
*Vesse-de-loup*, voyez *Lycoperde*, 1795, II.
*Vessicatoire*, fait cesser l'incontinence d'urine, 1788, I, 355.
—manière de les appliquer et de les panser, 1790, II, 410.
*Vessie* à la langue des bestiaux, 1790, II, 220.
—pour se soutenir sur l'eau, 1786, II, 312.
*Vétérinaire* (connoissance que doit avoir un), 1786, I, 143.
—peuvent être utiles dans les campagnes, 1786, II, 331.
*Vevay* : culture qui y est usitée, 1791, II, 66.

*Vézelai* : agriculture de ses environs, 1790, I, 79.
—qualités de ses terres, 1792, II, 143.
*Vexin-Normand* : son agriculture, 1790, II, 33.
*Viande* : procédé pour conserver long-temps la Viande fraîche, 1783, I, 415 *et suiv.*
—gâtée : moyen de la rétablir, 1787, I, 218-256 *et suiv.*
—liqueur qui la conserve, 1787, II, 246.
—procédé pour la rendre tendre, 1788, I, 221.
—cuite dans les fourneaux économiques, 1790, II, 307.
—glacée : moyen de la rétablir, 1790, II, 321.
—moyen de la conserver ; préparation pour cet objet, 1791, II, 270-271.
—quelle quantité il faut pour faire du bon bouillon, 1792, II, 408.
—saumure pour la conserver, 1792, II, 410.
*Vie* : sa durée dépend de différentes causes, 1787, I, 269.
—de l'homme : sa durée, 1788, II, 323.
—sédentaire : préjudiciable aux femmes grosses, 1788, II, 269.
—durée de la Vie de l'homme dans divers états, 1789, II, 321 *et suiv.*
—observations sur les soins à donner aux derniers momens de la Vie, 1790, I, 302.
*Vigne* (observations sur la taille de la), 1795, I, 103.
—manière de la greffer, 1785, I, 100 et 101.

*Vigne* : manière de la greffer, 1786, I, 93.
—*idem*, 1786, II, 160 *et suiv.*
—sa culture, 1787, I, 147.
—son sarment donné en fourrage, 1788, I, 49.
—observation sur sa culture, 1789, II, 111 *et suiv.*
—amendée avec de la chaux, 1790, I, 141.
—terreins et engrais convenables aux Vignes, 1790, I, 142.
—ses pelures écartent les vers du fromage blanc, 1790, II, 323.
—moyen de les garantir de la gelée, 1792, I, 285.
—divers conseils sur sa culture, 1792, II, 302-309-410.
—ses travaux dans le cours de l'année, 1793, I, 310-322.
*Vignobles* : moyen pour les engraisser, 1784, I, 95.
*Vin* (procédé pour faire du bon), 1794, I, 310.
—de sorbes et de prunelles sauvages, 1794, I, 340-341.
—foible : moyen de le conserver, 1792, II, 412.
—moyen de l'améliorer et de le conserver, 1787, I, 147-152.
—manière de le rétablir et de découvrir s'il est frelaté, 1787, I, 200 *et suiv.*
—cuve pour le faire et conserver, 1787, I, 375.
—aigre : moyen de le rétablir, 1787, II, 174.

*Vin* aigre : parti qu'on peut en tirer, 1787, II, 96-135 *et suiv.*
—diverses observations sur les Vins, 1787, II, 166 *et suiv.*
—moyen de reconnoître s'il contient de la litharge, 1787, II, 305.
—éventé : moyen de le rétablir, 1788, II, 189.
—de sucre, 1789, I, 228.
—rétabli dans certaines bouteilles de verre, 1789, I, 216.
—examen des dépôts trouvés dans les bouteilles, 1789, I, 213.
—qui a le goût de fust : moyen d'y remédier, 1789, II, 115-120.
—nouveau, peut être bondonné sans risque, 1789, II, 123-127.
—factice, 1789, II, 191.
—détérioré par de mauvaises bouteilles, 1789, II, 184-186.
—altéré : moyen de le corriger, 1789, II, 187-188.
—*idem*, 1790, I, 252.
—moyen de le rendre plus facile à digérer, 1790, I, 253.
—de cabaret, mal-sain, 1791, I, 249-251.
—altéré par le plomb : moyen de le reconnoître, 1791, I, 251.
—artificiel : son second marc, Vin de son, 1791, II, 302-309-312.
—muté, n'est pas un poison, 1791, II, 432.
—en fermentation : ses effets funestes, 1791, II, 344.

*Vin* : moyen de découvrir si l'on a mis quelques substances métalliques, 1792, I, 397.
de paille : procédé pour le faire bon, 1792, I, 287.
—*idem*, voyez *Raisin*, 1795, II.
— nit, 1795, I, 274.
*Vins* : mélange pour améliorer les Vins viciés, 1782, I, 382.
— méthode pour les clarifier, 1782, I, 373.
— procédé pour corriger ceux qui ont le goût de moisi, 1782, I, 380.
— procédé pour bonifier le vin le plus commun, 1782, I, 378 *et suiv.*
— de santé, 1782, I, 377.
— méthode pour rendre le Vin le plus mauvais agréable, 1782, I, 376.
— moyen pour donner au Vin différens goûts, 1782, I, 383.
— œnomètre, ou instrument pour juger de la fermentation du Vin, 1782, I, 237.
— moyen de les conserver dans les citernes, 1783, I, 89.
— indication pour le décuvage, 1783, I, 115.
— recette pour ôter le goût de moisi, 1783, I, 420.
— sa conservation dans les citernes, 1784, I, 1.
vin des Dieux, 1784, I, 375.
— méthode pour obtenir du bon Vin de toute espèce de raisins, 1785, I, 63.
— moyen pour le dégraisser, 1785, I, 360.
— avis sur le soutirage, 1785, I, 135.
— moyen de le clarifier, 1785, I, 137.
— pour le soufrer, 1785, I, 138.
— de cerises, 1786, II, 216.

*Vinaigre* : moyen de le conserver bon, 1784, I, 364.
—de lait, 1786, I, 193.
—de vin : moyen pour l'empêcher de se gâter, 1786, I, 192 *et suiv.*
—procédé pour en faire du bon, 1786, II, 163.
—sa vapeur employée dans les chambres où l'on élève les vers-à-soie, 1787, I, 166.
—radical : procédé pour le faire, 1787, II, 372.
—*idem*, voyez *Raisin*, *Mûre*, *Pomme*, *Orge*, 1795, II.
*Violette*, 1795, II, 129.
*Violier*, 1795, II, 127.
*Viorne*, voyez *Laurier-thym*, 1795, II.
*Vipères* : remède contre les effets de son venin, 1783, I, 284.
—observations sur les effets de son venin, 1784, I, 327.
—guérison de morsures à la langue, 1785, I, 325.
—observations sur son venin, 1786, I, 248 *et suiv.*
—morsure de la Vipère proposée contre la rage, 1786, I, 323.
—traitement de sa morsure, 1787, I, 317.
*Virginale*, voyez *Prune*, 1795, II.
*Virus* variolique, 1782, II, 365.
*Visage* (moyen de diminuer les boutons de petite-vérole au), 1786, I, 313.
*Vitres* : manière de les enduire d'un vernis transparent, 1784, I, 88.
*Vivace*, 1795, II, 293.
*Vivarais* : sa culture, 1794, I, 18.

*Voiture* dont les chevaux s'emportent, 1786, II, 308.
*Vol* des oiseaux : son mécanisme, 1786, II, 360.
*Volailles* : moyen pour les garantir des belettes, etc. 1786, II, 292.
—procédé pour l'engraisser, 1792, I, 203.
—machine pour l'engraisser, 1794, I, 423.
—phthisie des Volailles; remède, 1794, I, 276.
*Volcans* découverts dans la lune, 1788, I, 375.
—*idem*, 1788, II, 344.
*Vomitif* : soins dans leur usage, 1790, II, 396.
*Vomitive*, voyez *Champignon*, 1795, II.
*Vouède*, voyez *Guède*, 1795, II.
*Voueras* : fourrage, 1790, II, 54.
*Voûtes* en briques creuses, 1788, I, 259.
*Voyage* aérostatique, 1787, II, 349.
—précautions à prendre en Voyage, 1791, I, 204.
—pour la connoissance du globe, 1789, I, 256.
—sur mer : précautions à prendre, 1789, I, 325-332.
*Vue* : instrument pour les Vues foibles, 1784, I, 190.
—*idem*, 1784, I, 292.
—altération de la Vue : moyen d'y remédier, 1791, II, 391.
—courte, Vue longue, 1791, II, 392-393.
—lunettes pour ces diverses Vues, 1791, II, 396-377.
—cas où leur usage est avantageux, 1791, II, 403.

*Vue* (soins à prendre pour la conservation de la), 1791, II, 397.
—*idem*, 1792, I, 442.
—longue, Vue courte, Vue basse; lunettes diverses, 1792, I, 446-448-450.
*Vulpin* : espèce de foin, 1791, I, 72.

## Y.

*Yeux* (remède contre la maladie des), 1782, I, 273.
—*idem*, 1783, I, 31.
—*idem*, 1786, I, 313.
—*idem*, 1784, I, 306.
—taches et filamens dans les Yeux, 1791, I, 363.
—moyen de les conserver en bon état, 1791, II, 391 *et suiv.* 403.
*Ypréau*, voyez *Peuplier*, 1795, II.
*Ysard*, voyez *Chamois*, 1795, II.
*Yvraie* : manière d'en purger le froment, 1790, II, 29-31.

## Z.

*Zeste* de noix annoncé comme anti-putride, 1786, II, 372.
*Zinc*, 1795, II, 107.
*Zone* de chaleur et de froid dans les champs, 1793, I, 267.
*Zoophite*, 1787, I, 292.

*Fin de la Table générale des Matières des 22 premiers volumes.*